









MUSEO NACIONAL.

CATÁLOGO

DE



PLANTAS MEXICANAS

(FANERÓGAMAS)

ARREGLADO

POR EL DR. MANUEL URBINA.



MÉXICO
IMPRENTA DEL MUSEO NACIONAL
1897

DONACION

ABR 2013 Various

9K211 H482 923 [-22168 Ur 2.P

ADVERTENCIA.

RA ya urgente é indispensable que el Museo Nacional tuviese una colección de plantas mexicanas clasificadas, que sirviese de consulta á las personas que se dedican al estudio de la Botánica, y diese á conocer de una manera palpable la riqueza y variedad de especies que encierra nuestro suelo.

Cierto es que nuestras plantas han sido estudiadas y descritas en numerosas obras extranjeras por naturalistas competentes, y también lo es, que estas descripciones, por buenas que sean, no son suficientes el mayor número de veces para identificarlas y es preciso recurrir á los herbarios para adquirir, después de mucho tiempo y una larga práctica, la perspieacia y el acierto necesarios para tener seguridad en la clasificación.

Tarea tan penosa y difícil me ha ocupado desde el año de 1881, haciendo mis primeras clasificaciones en plantas colectadas por mí en el Valle de Méxieo y otros lugares, dedicándome por entonces exclusivamente al estudio de

las Compuestas, de las cuales llegué á reunir más de trescientas especies; en seguida me propuse arreglar las colecciones que sin clasificar existían ya en el Museo, y las que por compra ó donación ingresaron después, y que según el orden cronológico, son las siguientes:

Colección del Dr. Antonio Peñafiel, de 1872. (Est. de Hidalgo.)

" del Prof. Guillermo Schaffner, de 1876-77. (Est. de S. Luis Potosí.)

,, del Ing. Mariano de la Bárcena, 1886-87. (Est. de Jalisco.)

del Dr. Manuel Urbina, de 1881-97. (Valle de México, &.)

" del Sr. C. G. Pringle, de 1885–97. (Varios Estados de la República.)

A las mencionadas colecciones deben agregarse otros ejemplares que han sido regalados por varias personas constando sus nombres en el ejemplar respectivo.

El número de especies hasta hoy arregladas y contenidas en el presente Catálogo, es de 3,000, y en cada una de ellas ha sido señalado: 1.º, localidad y Estado á que pertenece; 2.º, época en que florece; 3.º, nombre del colector; 4.º, sinonimia vulgar y científica; 5.º y último, obra ú obras en que han sido descritas.

De estas plantas la mayor parte han sido identificadas por mí, menos las del Sr. C. G. Pringle, que lo han sido por especialistas extranjeros como los Sres. A. Gray, S. Wat-

son, Robinson, J. N. Rose, Scribner, etc.

Me han servido de guía para las especies, el *Prodromus Candollianus* y sus Monografías; para el arreglo y citas de obras, la magnífica obra de Botánica de Hemsley de la Biología Central Americana; para los géneros, la obra clásica del *Genera Plantarum* de G. Bentham y J. D. Hooker, y por último, para las familias, el *Index* de T. H. Durand, aprobado por Hooker.

No han sido indicados los usos y aplicaciones de las plantas, por no dilatar más la publicación del presente Catálogo, y porque ese propósito está reservado para

el del Salón de aplicaciones botánicas que existe ya en el Museo, y cuyo Catálogo será publicado más adelante.

Conforme vayan aumentando nuestras colecciones, iremos publicando los suplementos que sean necesarios; pero de pronto, con este Catálogo queda cubierta una necesidad que exigía el servicio público.

México, Octubre de 1897,

Dr. Manuel Urbina.

ADDENDA.

Acmella hirta	154
Anisophyllum hyssopifolium	315
Arctostaphyllos polifolia	205
Barbudilla	167
Bidens escandens	325
Biscutella wislizeni	9
BURSERACEÆ	38
Camote de chayote	99
Caucaline	107
Ceniza	291
Chætocalyx wislizenii	58
Chamæsaracha coronopus	249
Chechen	46
Chicapashi	147
Daphnidostaphyllis pungens	205
Ferula tolucensis	107
Girasol	162
Hamalium alatum	164
Jarilla	127
Jussiwa swartsiana	90
Mala muger	327
Machæranthera setigera	141
Pashcuane	174
Pega ropa de pared	67
Vara de cohete	400

ERRATAS.

Pág.	Lin.	DICE.	DEBE DECIRSE.
-			_
2	-32	humillis	humilis,
4	1	Midex	Michx.
4	ī	814	314
8	1	Nut1	Nutt.
9	31	Thlaspidare	Thlaspideæ,
24	19	Centr	Contrib.
30	1	Mutingia .	Muntingia
31	7	Erythroxilon	Erythroxylon
33	14 y 18	Tetrapteris	Tetrapterys
85	14	circutarium	cicutarium,
37	5 y 13	Monterey	Monterrey
41	2	gregii	greggii.
41	9	Rhamneæ	Rhamnacere.
45	18	Mönch	Moench.
55	21	Lindhelmeri	lindheimeriana,
56	3 y 4	oxyphylta	oxyphylla,
66	21	Glicine	Glycine
78	21	Spiræcæ	Spiræac.
93	28	Pasiflora	Passiflora.
114	4	caribeum	carlbœum
120	25	Velcriana	Valeriana
154	30	Axiniphillum	Axinlphyllum
161	15	escelsus	excelsa,
168	13	petrophyla	pctrophylla,
170	24	sulphurens	sulphureus,
176	12	Perityle	Perytile
176	22	scorzoneræfolia	scorzoneræfolium.
189	28	radulæfolia	radulæfolius,
201	2	Lobeliæ	Lobelieæ,
212	21	phillyreoides	phyllyreoides,
226	11	calicosa	calycosa,
230	29	Pelemonium	Polemonium
245	1	Tribus I.	Tribus II.
259	22	mycrophyllum	microphyllum,

Pág.	Lin.	DICE.	DEBE DECIRSE.
_	-		
271	22	calicosa	calycosa,
330	2	Betulæ	Betuleæ.
331	13	fremonti	fremontii,
339	1	aurantiacus	aurantiaca,
339	11	cinnabarinus	cinnabarina.
341	8	Cipripedium	Cypripedium
345	8	Nenasty1is	Nemastylis
358	29	alisinoides	alismoides,
364	17	polyrhiza	polyrrhiza,
364	19	polyrhiza	polyrrhiza,
370	25	Linmochloa	Limnochloa
372	36	subsquarrosus	subsquarrosa,
412	30	Chaseolytrum	Chascolytrum
413	35	hephæstophila	hephæstophylla,
416	22	huisquilucænsis	huisquilucanensis.
417	19	michoacaensis	michoacanensis.



PHANEROGAMIA.

DICOTILEDONES POLYPETALÆ.

SERIES I. THALAMIFLORÆ.

ORDO I. RANUNCULACEÆ.

TRIBUS I. CLEMATIDEÆ.

Clematis dioica, Linn. Amœn. v. p. 398; Sloane, Hist. Jam. i. p. 199, t. 128, fig. 1.

N. V. Chilillo, Barbas de gato.

S. Juan de Xico (LAGO DE CHALCO), Agosto 12 de 1888 (M. Urbina).

Clematis grossa, Benth. Pl. Hartw. p. 33.

Est. de Hidalgo, 1872 (A. Peñafiel); Las Canoas (S. Luis Potosf), Noviembre 4 de 1891 (C. G. Pringle, 4065). En los arroyos, cerca de Guadalajara, Diciembre 7 de 1889 (C. G. Pringle, 2368).

Clematis pitcheri, Torr. et Gray. in Proc. Am. Acad. vol. xvII, p. 317.

En los arroyos. Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3648).

Clematis sericea, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 37. N. V. Barbas de chivo.

Вот.-1.

Atlixco (Est. de Puebla), Noviembre de 1886 (J. Velasco). Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1887 (M. Barcena).

Clematis sp.

N. V. Sacamecate:

Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Pehafiel).

TRIBUS II. ANEMONEÆ.

Thalictrum mexicanum, DC. Syst. 1. p. 187.

N. V. Costipatli, s. Hernández.

Barranca del Salto, Amecameca (Est. De México), Julio de 1881 (M. Urbina). Cerro de S. Juan de Xico (Lago de Chalco), Agosto de 1884 (M. Urbina).

Thalictrum tomentellum, Rob. et Sea. Nov. Sp. in hb. Pringle.
En las pequeñas laderas, cerca del Lago de Pátzcuaro (Est.
DE MICHOACÁN), Julio 15 de 1892 (C. G. Pringle, 4143).

Thalictrum sp.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Ranunculus circinatus, Sibtu. in hb. Pringle.

En el agua (Еst. De Синианиа), Mayo 28 de 1888 (С. G. Pringle).

Ranunculus delphinifolius, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 48.

Ajusco (Valle de México), Julio 20 de 1878 (M. Bárcena).

Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4486).

Ranunculus dichotomus, Moc. et Sessé in DC. Syst. Veg. 1. p. 288; Calques des Dess. Fl. Mex. 1.

N. V. Ranninculo.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1881 (D. Cano y Alcacio). En las praderas bajas que rodean el 1ago de Pátzcuaro (Est. DE MICHOACÁN), Julio 17 de 1892 (C. G. Pringle, 4153).

Ranunculus donianus, Pritzel, in Walp. Rep. 11, 740.

Ranunculus humillis, D. Don in G. Don's Gen. Syst. 1. p. 34.

nec Collie in Hook. Bot. Beechey's Voy.

Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 25 de 1892 (C. G. Pringle, 5255).

Ranunculus geoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 47. t. 429. S. Angel (Valle de México), Abril 12 de 1882 (M. Urbina).

Ranunculus hookeri, Schl. in Linnæ ix p. 610.

Una especie muy común en México. Montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 183).

N. V. Pata de León.

Liano del Carrizal (Orizaba), Marzo de 1891 (P. Toro).

En los cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacáx), Julio 28 de 1892 (C. G. Pringle, 4133).

En las praderas frescas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Julio 9 de 1890 (C. G. Pringle, 3065); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bárcena).

Ranunculus petiolaris, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 45. t. 428. N. V. Ranúnculo, Pata de León.

Escuela de Agricultura (Valle de México), Mayo de 1881 (M. Urbina).

Ranunculus stolonifer, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars altera p. 17, Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 7.

Cerca de Morales (Est. de S. Luis Potosí) 1877 (G. Schaff-ner).

En los pequeños arroyos cerca de S. Luis Potosí, Noviembre 8 de 1891 (C. G. Pringle, 3922).

Ranunculus tridentatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 42 var. β. mayor.

S. Juan de Xico (LAGO DE CHALCO), Agosto 12 de 1888 (M. Urbina).

Ranunculus vagans, Watsox. Nov. Sp. in hb. Pringle.

En los pantanos arenosos. Flor de María (Est. de México), Agosto 1º de 1890 (C. G. Pringle, 3177).

TRIBUS III. HELLEBOREÆ

Delphinium azagræanum, Schaffner in hb. Schaffner S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 758). Delphinium azureum, Midex. Fl. Bor. Am. i. p. 814, var. vimineum, Gray? in hb. Pringle.

En las praderas frías de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3862),

Anual, Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bárcena).

Delphinium madrensis, Warson, nov. sp. in hb. Pringle. Cerca de Monterrey (Esr. de Nuevo León), Mayo 29 de 1889 (C. G. Pringle, 3014).

ORDO IV. ANONACEÆ.

TRIBUS IV. XILOPIEÆ.

Anona cherimolia, Mill. Dict. ed. 9, num. 5; Bot. Mag. t. 2011. Anona tripetala, Ait.

N. V. Chirimolla,

Barranca de Río Grande en Atotonileo el Grande (Est. de HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

Anona globiflora, Schlech. in Linnæa x. p. 235.

Terrenos calizos. Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 22 de 1891 (C. G. Pringle, 3796).

ORDO V. MENISPERMACEÆ.

TRIBUS V. CISSAMPELIDEÆ.

Cissampelos pareira, Lamark III. t. 380.

Cissampelos canescens, Miq.

Cissampelos acuminata, Benth.

Tamasopo (Est. de Sn. Luis Potosi) Junio 13 de 1890 (C. G. Pringle, 3576).

En los bancos de lava cerca de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo de 1893 (C. G. Pringle 4367).

ORDO VII. BERBERIDEÆ.

TRIBUS II. BERBEREÆ.

Berberis gracilis, Hartw. in Benth. Pl. Hartw. p. 34. var. Montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosf), I877 (G. Schaffner, 711).

Berberis pinnata, Lac. Elench. Hort. Madr., 1803, p. 6. DC. Syst. II. p. 19; Calques des Dess. Fl. Mex. 13; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 71. t. 434.

Berberis fasciculata, Sims. Bot. Mag. t. 2396.

Mahonia fascicularis, DC.

N. V. Retamilla, Palo amarillo, Mex. Xoxoco.

Cerro del Telapón (Valle de México), Noviembre 2 de 1888 (M. Urbina).

Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

ORDO VIII. NYMPHÆACEÆ.

SUB ORDO II. NYMPHÆÆ.

Nymphæa gracilis, Zucc. Pl. Nov. fasc. 1. p. 362, et in Flora, 1832, 11. Beibl. p. 74.

En pantanos arenosos, cerca de Guadalajara (Est. DE JALISco), Octubre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3891).

Nymphæa mexicana, Zucc. in Flora, I832, n Beibl. p. 75. Lago de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3379).

ORDO X. PAPAVERACEÆ.

TRIBUS II. EUPAPAVEREÆ.

Argemone mexicana, Linn. Sp. Pl. p. 727; Lamk. Ill.t. 452. N. V. Chicalote, Mex. Chicalotl.

Atotonilco el Grande (Est. pe Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

S. Juan de Xico (LAGO DE CHALCO), Agosto de 1888 (M. Urbina).

Tlalmanalco, á 2400 metros (Est. de México), Mayo 4 de 1891 (F. Altamirano).

Bocconia arborea, Watson in hb. Pringle.

En las cañadas, cerca de Guadalajara. Noviembre 21 de 1892 (C. G. Pringle, 5244).

Bocconia frutescens, Linn. Sp. Pl. p. 634; Lam. Ill. t. 394. β. cernua, Moc. et Sesse, DC. Prodr. 1. p. 71 y Calques des Dess. Fl. Mex. 14.

Un arbusto de 5 á 15 pies de altura. Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosí), Noviembre 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3374).

Bocconia latisepala, Warson in hb. Pringle.

Faldas de la Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2705).

TRIBUS III. HUNNEMANNIEÆ.

Hunnemannia fumariæfolia, Swelt. Brit. Fl. Gard. ser. 1. iii. t. 276; Bot. Mag. t. 3061.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

ORDO XI. FUMARIACEÆ.

Fumaria parviflora, Lam. Dict. 11 p. 567.

N. V. Palomitas, naturalizada.

En diversos lugares del Valle de México, Abril de 1886 (M. Urbina).

ORDO XII. CRUCIFERÆ.

TRIBUS I. ARABIDEÆ.

Nasturtium tanacetifolium, Hook et Arn. in Hook. Journ. Bot. I. p. 190.

Nasturtium micropetalum, Fisch, et Mey.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 148).

Thelypodium longifolium, Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 321.

Streptanthus longifolius, Benth.

Montes de S. Miguelito (S. Luis Potosi), 1877 (G. Schaffner, 156, in part).

TRIBUS II. ALYSSINEÆ.

- Vesicaria schaffneri, Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 320. En lugares húmedos cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 150).
- Draba jorullensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 78.
 Última hierba á 4275 metros. Nevado de Colima, Marzo de 1887 (M. Bárcena. 468).

En lugares estériles, cerca del cráter del Nevado de Toluca, a 13,000 pies. Septiembre 1º de 1892 (C. G. Pringle, 4235).

Draba jorullensis, H. B. K. var.

En lugares muy fríos, dentro del cráter del Nevado de Toluca, á 13,600 pies. Septiembre 1º de 1892 (C. G. Pringle, 4248).

Draba myosotidoides, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars, altera p. 18. Sierra de las Cruces (Est. de México), Septiembre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 5260).

Draba tolucensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 78.
En la arena porfidítica del cráter del Nevado de Toluca. Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4231).

TRIBUS III. SYSYMBRIEÆ.

Sysymbrium canescens, Nutl. Gen. II p. 68. Paso del Norte, Abril 20 de 1893 (C. G. Pringle).

Sysymbrium palmeri, HEMSL. Diag. Pl Nov. pars. alt. p. 19.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 154).

Synthlipsis greggii, A. Grav in Torr. Bot. Emoryy's. Exp. p. 34.

Montes de S. Miguelito (S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 129).

Greggia camporum, A. Gray Pl. Wright. 1. p. 9. t. 1. Llanos de Jiménez (Est. de Синианиа), Septiembre 20 de 1892 (C. G. Pringle, 5284).

TRIBUS V. BRASSICEÆ.

Brassica napus, Linn. Sp. Pl. 931.

N. V. Flor de nabo, naturalizada.

Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Brassica oleracea, Linn. Sp. Pl. 932.

Naturalizada, Chapultepee (Valle de México), Agosto 15 de 1881 (M. Urbina).

Tribus VI. LEPIDINEÆ.

Capsella mexicana, Hemsl. Díag. Pl. Nov. pars. alt. p. 19; Biol. Centr. Am. Bot. I. p. 39.

Cerca de Morales (S. Luis Potosi), 1877 (G. Schaffner, 147).

Capsella (?) schaffneri, Watson in Proc. Am. Acad. xvii, p. 322.

Montes de S. Miguelito (S. Luis Potosf), 1877 (G. Schaffner, 151).

En terrenos calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Septiembre 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3271).

Capsella stellata, Watson n. sp. in hb. Pringle.

En terrenos calizos, Paso de Carneros (Est. de Coanulla), Agosto 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3195). Lepidium alyssoides, Gray Pl. Fendl. p. 10.

Llanuras arenosas, Samalayuca (Est. DE Chinuahua), Julio 27 de 1886 (C. G. Pringle, 873).

Lepidium lasiocarpum, Nutt. s. Watson in Proc. Am. Acad. xvii p. 322.

Paso del Norte (Est. de Синианиа), Abril 25 de 1893 (С. G. Pringle.....)

Lepidium latifolium, LINN. Sp. Pl. 899.

N. V. Mostacilla.

Chapultepec (Valle de México), Marzo 22 de 1882 (M. Urbina).

Lepidium menziesii, DC. Prodr. 1. p. 205.

(Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 146).

Lepidium sordidum, Gray in hb. Pringle.

En los cerros, cerca de Chihuahua. Septiembre 18 de 1888 (C. G. Pringle, 3049).

Lepidium virginicum, Linn. Sp. Pl. 900.

Senebiera mexicana, Hook. et Arn.

N. V. Lentejilla, Comida de pajarito.

S. Angel (Valle de México), Abril de 1881 (M. Urbina). Alameda de Guadalajara, Marzo de 1887 (M. Bárcena, 239). S. Luis Potosí (G. Schaffner, 145).

TRIBUS X. RAPHANEÆ.

Raphanus raphanistrum, Linn. Sp. Pl. 953 var. 8. flore albo. N. V. Jaramago, Flor de Nabo, Nabo cimarrón.

Planta naturalizada.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).
Faldas del cerro del Tepeyac (Valle de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina). Cerro de Ayotla (Est. de México), Agosto de 1888 (M. Urbina).

TRIBUS VII. THLASPIDAÆ.

Biscutella wislizeni, Engelm. Bot. Wisliz. Exped. p. 11. Adnot. Lugares arenosos, cerca de Salamayuca (Est. de Chihuahua), Septiembre 13 de 1888 (C. G. Pringle, 3048).

ORDO XIII. CAPPARIDEÆ.

TRIBUS I. CLEOMEÆ.

Cleome longipes, Torr. in hb. Pringle.

En terrenos salinos, Salinas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 30 de 1890 (C. G. Pringle, 3089).

Cleome potosina, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosi), Agosto 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3538).

Cleomella mexicana, DC. Prodr. in p. 237; Calques des Dess. Fl. Mex. 19 y xxxi A; Hooker's, Ic. Pl. t. 28.

En el camino de S. Juan Bautista á Atasta (Est. DE TABASCO), Marzo 14 de 1888 (J. N. Rovirosa).

Polanisia uniglandulosa, CAV. DC. Prodr. 1. p. 243.

Cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de 1881 (M. Urbina). Atotonileo el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

Gynandropsis speciosa, DC. Prodr. 1. p. 238.

Cleome speciosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 84, t. 436. Barranca de Metlac (Est. de Veracruz), Abril de 1881 (J. M. Velasco).

Wislizenia refracta, Encelm. in Bot. Wisliz. Rep. 14; A. Gray Pl. Wright. I. p. 11. t. 2.

Arenal, El Paso (Est. de Chihuahua), (C. G. Pringle.....), Septiembre 19 de 1893.

ORDO XIV. RESEDACEÆ.

Reseda luteola, Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 448.

N. V. Gualda, naturalizada, s. Hemsley.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel). Chapultepec (Valle de México), Agosto de 1881 (M. Urbina).

ORDO XV. CISTINEÆ.

Helianthemum argenteum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. 1. p. 47.

Montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 606).

Helianthemum coulteri, Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 323.

Cerros de los Morales (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 608).

Helianthemum glomeratum, Lag. DC. Prodr. 1. p. 269.

Cistus glomeratus, LAG. Gen. et Sp. p. 16.

Helianthemum polyfolium, Hook. et Arn. non. A. Gray.

Heteromeris mexicana, Spach.

Lechea mexicana, WALP.

Tæniostema micranthum, Spach.

Barranca de Sta. Cruz, cerca de Ayotla (Est. de México), Noviembre 2 de 1888 (M. Urbina).

Helianthemum glomeratum, Lac. var. laxiflorum, Watson in hb. Pringle.

Cerca de Guadalajara, Noviembre 14 de 1892 (C. G. Pringle, 5291).

Helianthemum patens, Hensl. Biol. Centr. Amer. Bot. I. p. 48. Montes de S. Rafael (Est. de S. Luis Porosí), 1877 (G. Schaffner, 605).

Helianthemum pringlei, Watson n. sp. in. hb. Pringle. En las llanuras, base de la Sierra Madre (Еst. de Синианиа), Septiembre 20 de 1887 (С. G. Pringle, 1186).

Lechea major ? Michx.

Montes de S. Rafael (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 602).

Lechea skinneri, Benth. Bot. Voy. Sulph. p. 66.

En suelo arenoso y delgado, cerca de Guadalajara (Est. de Ialisco), Agosto 18 de 1893 (C. G. Pringle, 4496). Mesas (Est. de Jalisco), Octubre 7 de 1891 (C. G. Pringle, 5171).

ORDO XVI. VIOLARIEÆ.

TRIBUS I. VIOLEÆ.

Viola barroetana, Schaffner, MSS. in hb. Parry; Hemsl. Diagn. Pl. Nov. pars. alt. p. 20.

Montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 181).

Viola flagelliformis, Henst. Diagn. Pl. Nov. pars. alt. p. 20.
Montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 182). Forma lampiña, bajo los Abetos. Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 20 de 1872 (C. G. Pringle, 4193).

Viola grahami, Benth. Pl. Hartw. p. 35.

- En lugares fríos. Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4177).
- Viola hookeriana, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 369, t. 492, fig. 2.

Montes de S. Miguelito (Est. DE S. Luis Porosí), 1877 (G. Schaffner, 180).

Viola reptans, Rob. in hb. Pringle.

En los cerros, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 13 y Agosto 14 de 1892 (C. G. Pringle, 4148).

Ionidium polygalæfolium, Vent. Malm. p. 27. t. 27; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 376, t. 496. fig. 1.

Cárdenas (Est. DE S. Luis Potosf), Noviembre 3 de 1891 (C. G. Pringle, 5318).

TRIBUS III. ALSODEIEÆ.

Alsodeia parvifolia, Watson n. sp. in hb. Pringle.

En terrenos calizos. Cerro de las Canoas (Est. de S. Luis Porosf), Julio 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3063).

Alsodeia sp.

Motzorongo (Est. de Veracruz), Mayo de 1891 (F. Altamirano).

ORDO XVIII. BIXINEÆ.

Tribus I. BIXEÆ.

Amoreuxia wrightii, A. Gray. Pl. Wright. II. p. 26. En la Barranca, Guadalajara, Junio 20 de 1893 (C. G. Pringle,)

TRIBUS III. FLACOURTIEÆ.

Xilosma pringlei, Rob., n. sp. in hb. Pringle.
Sub-arbusto de 3 á 10 pies de altura. Cerro de las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 19 y Julio 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3727).

Xilosma velutinum, Fr. et Plancii. ex char. in hb. Pringle.
El fruto es negro cuando madura. Cañada del Río Grande de Santiago (Est. de Jalisco), Mayo 23 de 1891 (C. G. Pringle, 3711).

ORDO XXI. POLYGALEÆ.

Polygala acicularis, Warson n. sp. in hb. Pringle.

En terrenos y bancos calizos; Montes de Sta. Eulalia (Est. de Сшнианиа), Mayo 1º de 1895 (С. G. Pringle, 223).

Polygala americana, Mill. Dict. ed. 8 núm. 7; DC. Prodr. 1. p. 330.

Polygala caracasana, H. B. K. y P. rivinæfolia, H. B. K. En lugares frios de La Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre y Octubre de 1891 (C. G. Pringle, 3876).

Polygala aparinoides, H. &. A., ex char. in hb. Pringle. En terrenos alcalinos, Hacienda de la Angostura (Est. de S. Luis Potosf), Julio 14 de 1891 (C. G. Pringle, 3792).

Bor.-4.

Polygala berlandieri, Watson in Proc. Amer. Acad. xiv p. 398. Llano de Mexicalcingo (Est. de Jalisco), Octubre 7 de 1880 (M. Bárcena, 166). Llanos de Guadalajara, Noviembre 27 de 1888 (C. G. Pringle, 1809).

Polygala conferta, Bennett. Hemst. Diagn. Pl. Nov. pars. altera p. 2. En lugares secos, cerros de Patzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4267).

Polygala glochidiata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 400. Llanos de Guadalajara, Noviembre 19 de 1889 (C. G. Prin-

gle, 2842).

Polygala gracillima, WATSON in Proc. Amer. Acad. vol. XXII. p. 398.

Colinas rocallosas, cerca de Guadalajara, Octubre 28 de 1889 (C. G. Pringle, 2740).

Polygala greggii, Watson in Proc. Amer. Acad. vol. xvii. p. 325.

Cerros, Micos (Est. de S. Luis Potosf), Agosto 1º de 1881 (C. G. Pringle, 4006).

Polygala longicaulis, H. B. K., var. ? in hb. Pringle.

Colinas rocallosas, cerca de Guadalajara, Octubre 26 de 1889 (C. G. Pringle, 2721).

Polygala michoacana, Rob. et Sea. n. sp. in hb. Pringle.

Entre los pinos, colinas de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Agosto 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4151).

Polygala obscura, Benth. Pl. Hartw. p. 58.

(Est. de S. Luis Potosi), 1876 (G. Schaffner, 2).

Polygala ovalifolia, DC. Prodr. 1. p. 331.

Polygala ovatifolia, A. GRAY.

(Est. de S. Luis Potosf), 1876 (G. Schaffner, 7).

Polygala pringlei, Watson n. sp. in hb. Pringle.

En el suelo húmedo, llanos de Guadalajara, Septiembre 11 de 1891 (C. G. Pringle, 4040).

Polygala puberula, Gray. var. ovalis, Rob. et Greenm. in hb. Pringle.

En las colinas, cerca de Guadalajara, Julio 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4472).

Polygala scoparia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 399.

Polygala wrightii, A. GRAY.

Polygala mexicana, DC.

(Est. DE S. Luis Potosf), 1876 (G. Schaffner, 2).

Polygala sub-alata, Warson in hb. Pringle.

(Est. de S. Luis Potosí), 1876 (G. Schaffner, 4); Flor de María (Est. de México), Septiembre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3240).

Monnina wrightii, GRAY. in hb. Pringle.

Cerros, en la sombra (Est. DE CIRHUAHUA), Septiembre 18 de 1885 (C. G. Pringle, 1054).

Monnina xalapensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 414. N. V. Yerba de la mula.

Monte de Pozo, Tenancingo (Est. de México), Enero de 1886 (M. Villada); Volcán del Nevado (Est. de Colima), 1887 (M. Bârcena, 432); Colinas de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre de 1890 (C. G. Pringle, 3338).

Monnina sp.

Montes de Zavaleta (Est. de México), Febrero 16 de 1790 (M. Villada).

Krameria cytisoides, Cav. Ic. IV. p. 60, t. 390.

Colinas pedregosas, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Mayo 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3107).

ORDO XXIV. CARYOPHYLLEÆ.

TRIBUS I. SILENEÆ.

Silene antirrhina, Linn. Sp. PI. p. 600; Dill. Hort. Elth. p. 442, t. 313; Mart. FI. Bras. xiv pars. ii t. 66.
Paso del Norte (Est. De Chihuahua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle......)

Silene laciniata, Cav. Ic. vi. p. 44, t. 564; Bot. Reg. t. 1444.

Silene greggi, A. Gray; Silene allamani, Otth; Silene mexicana, Otth. (Calq. des Dess. Fl. Mex. 56); Silene moçiniana, Otth. (Calq. des Dess. Fl. Mex. 57); Lychnis pulchra, Ch. et Schlecht.

N. V. Marmota, Mex. Pipiloxochitl, Flor de arete. Huehuetoca y en todo el Valle de México; Septiembre 25 de 1888 (M. Urbina). En los montes de S. Miguelito (EST. DE S. Lus Potosí), 1877 (G. Schaffner, 609). Sierra de las Cruces (EST. DE MÉXICO), Agosto 28 de 1892 (C. G. Pringle. 5236).

Silene thurberi, Watson in hb. Pringle.

Cerros rocallosos, cerca de Chihuahua, Agosto 21 de 1885 (C. G. Pringle, 690)

TRIBUS II. ALSINEÆ.

- Cerastium molle, Bartl. in Presl. Reliq. Hænk. n. p. 16. Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre de 1892 (C. G. Pringle, 5328).
- Stellaria prostrata, Baldw. in Ell. Sketch, 1. p. 518. Volcán del Nevado de Colima, á 4220 metros (Bárcena, 446).
- Arenaria alsinoides, Willd. in Mag. Gesell. Naturf. Freunde Berl. vii. p. 196; Arenaria nemorosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 35; Arenaria diffusa, Elliott; Mæhringia nemorosa, Fenzl; Stellaria lanuginosa, Torr. & Gray. Micropetalon lanuginosum, Pursu.

Cerca de S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 135).

Arenaria decussata, Willip. in H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 35.

En lugares arenosos y húmedos, cerca de Morales (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 138); Ajusco (Valle De México), Julio de 1878 (M. Urbina).

Arenaria mæhringioides, B. & H. in hb. Pringle.

En las pendientes secas, Cañada de Río Hondo (Est. de México), Agosto 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3142).

Arenaria reptans, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. altera p. 22; Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 70.

En los campos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 13 de 1892 (C. G. Pringle, 4135).

Arenaria sp.

Lago de Chalco (Valle de México), Agosto de 1882 (M. Urbina).

Spergularia mexicana, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars altera, p. 22; Biol. Cent. Am. Bot. I. p. 72.

En lugares arenosos, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 137).

TRIBUS III. POLYCARPEÆ.

Drymaria anomala, Watson n. sp. in hb. Pringle.

En las montañas calizas. Paso de Carneros (Est. de Coanul-LA), Septiembre 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3278).

Drymaria arenarioides, Willd. Roem. et Schultz. Syst. v. p. 406.

Drymaria frankenioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 21 t. 515.

Cerea de Morales (Est. de S. Luis Porosi), 1877 (G. Schaffner, 139); Cerros y llanuras, cerca de Chihuahua, Septiembre de 1885 (C. G. Pringle, 518).

Drymaria fendleri, Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 328. Cerca de S. Luis Potosí (G. Schaffner, 130, in part.), 1876; Barranca de Río Grande, cerca de Atotonileo (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

Drymaria gracilis, CH. et Sent. in Linnæa, v. p. 232.

S. Luis Potosí, 1875 (G. Schaffner, 130, in part.); Ajusco (Valle de México), Julio 20 de 1878 (M. Urbina). En terrenos calizos. Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Septiembre 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3265); Bancos, cerca de Toluca (Est. de México), Agosto 15 de 1892 (C. G. Pringle, 4175).

Drymaria longepedunculata, Watson in hb. Pringle.

Rastrera sobre las rocas húmedas, cerca de Guadalajara, Noviembre de 1892 (C. G. Pringle, 4348); Barranca del Salto, cerca de Amecameca (Est. de México), Noviembre de 1885 (M. Urbina).

Drymaria nodosa, Engelm. in A. Gray. Pl. Fendl. 1. p. 12, in adnot.

var. angustifolia, Hemsl. ex Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 329.

Cerca de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosi), 1877 (G. Schaffner, 140); En los cerros (Est. de Chihuahua), Octubre 2 de 1885 (C. G. Pringle, 581).

Drymaria tenuis, Watson n. sp. in hb. Pringle.

En los bancos arenosos, cerca de Guadalajara, Septiembre 28.718 de 1891 (C. G. Pringle, 4095).

Drymaria villosa, Ch. et Schlecht in Linnæa v. p. 232.

En lugares húmedos. Guadalajara, Mayo 6 de 1893 (C. G.

Drymaria xerophylla, A. Gray Pl. Wright. II. p. 11, in adnot. Hemsl. Diag. Pl. Nov. I. p. 2; Biol. Cent. Am. Bot. I. p. 75 (t. III. fig. 7-18).

Cerca de los Morales (Est. de S. Luis Potosí), 1876 (G. Schaffner, 131).

Cerdia congestiflora, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. pars altera, p. 23 (t. iv. fig. 1-9); Biol; Cent. Am. Bot. i. p. 75.

Montañas cercanas á S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 128).

Cerdia glauca, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. pars altera, p. 22 (t. IV. fig. 10-13); Biol. Centr. Am. Bot. I. p. 77.

En los montes Escabrillos (Est. DE S. Luis Potosf), 1877 (G. Schaffner, 129).

Cerdia purpurascens, Moc. et Sesse in DC. Prodr. III. p. 377; Calques des Dess. Fl. Mex. 1092.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 128).

ORDO XXV. PORTULACEÆ.

Portulaca parvula, A. Gray in hb. Pringle.

En terrenos secos y arenosos, cerca de Chihuahua, Septiembre 8 de 1888 (C. G. Pringle, 3056).

Portulaca pilosa, Linn. Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 57, Bot. Reg. t. 792.

?Portulaca foliosa, DC. Calques des Dess. Fl. Mex. 389 nec Sindley Bot. Reg. t. 793.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 771).

Calandrinia acaulis, H. B. K. in hb. Pringle.

Suelo arenoso y húmedo, cerca de los lagos del cráter del

Nevado de Toluca, á 13,500 pies (Est. de México), Septiembre 1º de 1892 (C. G. Pringle, 4256).

Claytonia perfoliata, DONN. Cat. ed. 4. p. 50. Bot. Mag. t. 1336. Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 5268).

ORDO XXVII, ELATINEÆ.

Elatine americana, Nutt.

En terrenos pantanosos, cerca de Morales (Est. de S. Luis Potosi), 1877 (G. Schaffner, 122),

Ordo XXVIII. HYPERYCINEÆ.

Tribus I. HYPERICEÆ.

Hypericum denticulatum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 191, t. 458.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 607 in part.)

Hypericum pauciflorum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 192.
En las cuestas cespitosas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potost), Julio 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3784).

Hypericum schaffneri, Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 330.

Montañas próximas á S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 607 in part.)

En terrenos cespitosos y húmedos, cerca de Guadalajara, Septiembre 14 de 1891 (C. G. Pringle, 3851).

ORDO XXX. TERNSTRŒMIACEÆ.

TRIBUS III. TERNSTRŒMIEÆ,

Ternstræmia tepezapote, Ch. et Schl. in Linnæa, vl. p. 420. ?T. lineata, DC. Monogr. Ternstr. p. 17 t. 1. N. V. Yerba del cura.

Entre Tetecala y Miacatlán (Est. DE Morelos), Septiembre de 1884 (F. Altamirano).

ORDO XXXIII. MALVACEÆ.

TRIBUS I. MALVEÆ.

Malvastrum coccineum, GRAY Pl. Fendl. p. 24.

Paso del Norte (Est. DE Cinhuanua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,)

Malvastrum leprosum, Ort. Dec. 8. p. 95; DC. Prodr. 1. p. 435. N. V. Yerba de las almorranas.

Alameda de Querétaro, Abril 20 de 1886 (M. Urbina).

Malvastrum peruvianum, A. Gray in Bot. Amer. Explor. Exped. I. p. 146.

Malva peruviana, Linn. Sp. Pl. p. 968; Jacq. Hort. Vindob. t. 156.

En los campos. Flor de María (Est. de México), Oetubre 18 de 1890 (C. G. Pringle, 3324).

Malvastrum roseum, DC. Prodr. 1. p. 435; Calq. des Dcss. Fl. Mex. 58.

Flores color de rosa, con venas purpúreas. Tacubaya (VALLE DE MÉXICO), Agosto de 1883 (M. Urbina).

Malvastrum schaffneri, Watson n. sp. in hb. Pringle.

Cañadas de cerros calizos. Paso de Carneros (Est. de Coa-HULA), Septiembre 6 de 1889 (C. G. Pringle, 2849).

Malvastrum spicatum, A. Gray in Bot. Amer. Explor. Exped. L. p. 147.

Malva spicata, LINN.

var. a. ovata, CAV. Diss. n. t. 20, fig. 2.

var. β. spicata, CAv. Diss. n. t. 20, fig. 4.

Atotonilco el grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 4 de 1889 (C. G. Pringle, 2643).

Malvastrum vitifolium, Hensl. Biol. Cent. Am. Bot. I. p. 100.

Malva vitifolia, Cav. Ic. I. t. 30.

Malva lactea, Art.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Angel (Valle de México), Diciembre de 1881 (M. Urbina); Cañada de Tultenango (Est. de México), Octubre 17 de 1890 (C. G. Pringle, 3323).

Anoda cronatiflora, Ort. Dec. 8, p. 99.

Anoda parviflora, CAV. Ic. v. p. 19, t. 431.

Sida crenatiflora, WILLD.

Cerca de Morales, S. Luis Potosi (G. Schaffner, 158); En lugares sombríos, Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 13 de 1893 (C. G. Pringle, 4575); En el campo, Cárdenas (S. Luis Porosi), Noviembre 3 de 1891 (C. G. Pringle, 4054).

Anoda cristata, Schl. in Linnaa xi. p. 210.

Sida cristata, Linn. excl. var. \(\beta \). Bot. Mag. t. 330.

Anoda dilleniana, CAV.

. Anoda triloba, CAV.

Querétaro, Noviembre 22 de 1886 (M. Urbina).

Anoda hastata, Cav. Diss. r. p. 38; t. n. f. 2; Gray Gen. III. n. t. 124.

Sida cristata, var. \(\beta \).

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 159); Barranca, Tequila (Esr. de Jalisco), Octubre 6 de 1893 (C. G. Pringle, 5454).

Anoda incarnata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 255.

Cañadas. Montañas cerca del Lago de Chapala (Est. DE JALISCO), Noviembre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4356).

Anoda lanceolata, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 411.

S. Joaquín (Valle de Mexico), Agosto 15 de 1881 (M. Urbina). Anoda triangularis, D. C. Prodr. 1, p. 459.

Sida triangularis, WillD.

Anoda brachyantha, Reiche. Hort. Bot. t. 34.

N. V. Violeta del país, Amapolita morada.

S. Joaquín (Valle de México), y en todo el Valle. Agosto 15 de 1881 (M. Urbina); Agua azul (Valle de Guadalajara), Octubre de 1885 (M. Bárcena, 171).

Anoda wrightii, GRAY. in hb. Pringle.

Cañadas sombrías y rocallosas, montañas cerca del Lago de Chapala (Est. DE JALISCO), Noviembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4352). Gaya subtriloba, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 270, t. 476.

Sida occidentalis, Linn. Sp. Pl. p. 964; Dill. Hort. Elth. 1. t. 6.
Cerros cerca de Oaxaca, á 5,500 pies. Septiembre de 1894 (C. G. Pringle, 4858).

Sida alamosana, Watson, in hb. Pringle.

En lugares sombríos, Barranca de Tequila (Est. de Jalisco). Octubre 10 de 1893 (C. G. Pringle, 4590 y 4560).

Sida carpinifolia, LINN. Pl. Suppl. p. 307.

Sida spiræfolia, WILLD.

Sida planicaulis, CAV. Diss. 1. p. 24, t. 3.

Sida stipulata, CAV. loc. cit. t. 3, fig. 10.

Sida acuta, CAV.

Sida brachypetala, DC.

Atotonilco el grande (Esr. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

Sida caudatifolia, Rob. et Greenm, n. sp.

Barranca, Tequila (Est. De Jalisco), Octubre 13 de 1893 (C. G. Pringle, 5445).

Sida ciliaris, LINN.

Flores de un color rojo cobrizo.

En suelo delgado de las montañas rocallosas, cerca de Guadalajara, Agosto 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4497).

Sida cordifolia, Linn. Sp. Pl. p. 961; Cav. Diss. 1. t. 3, fig. 2; Dill. Hort. Elth. t. 171.

Sida altheifolia, Sw.

Sida multiflora, CAV.

Sida micans, CAV.

Sida rotundifolia, CAV.

Sida herbacea, CAV.

En colinas secas, cerca de Tequila (Est. DE JALISCO). Septiembre 24 de 1893 (C. G. Pringle, 4600).

Sida diffusa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 237.

Montes de S. Miguelito, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 167); Llano de Mexicalcingo (Est. de Jalisco), Octubre de 1877 (M. Bárcena, 165); Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Sida linifolia, Juss. Cav. Diss. 1. p. 14, t. 2, fig. 1.

Cerros, Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 15 de 1893 (C. G. Pringle, 5440).

Sida lepidota, GRAY, Pl. Wright. II. p. 18.

Llamos, Escalón (Est. de Chincanua), Abril 27 de 1893 (C. G. Pringle.....).

Sida rhombifolia, Linn. Sp. Pl. p. 951.

Sida hondensis, H. B. K.

N. V. Huinari, usada como té en Michoacán, y como desayuno entre la gente pobre; en Guadalajara es conocida con el mismo nombre.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1877 (M. Büreena, 536); Huirambo (Est. de Michoacán), Junio de 1891 (M. Martinez); Río Hondo (Est. de México), Septiembre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4291).

Bastardia berlandieri, Gray, in hb. Pringle.

Forma hirsuta de 6 á 8 pies; en cerros volcánicos. Monte León (Est. de Michoacán), Noviembre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4344).

Wissadula mucronulata, Gray, Reliq. Berland. Bot. Mex. Bound. p. 39.

En laderas. Tequila (Est. DE Jalisco), Septiembre 29 de 1893 (C. G. Pringle, 4603).

Wissadula pringlei, Rose n. sp.

De 3 á 4 pies de altura; Monte Albán, cerca de Oaxaca. Septiembre 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4872.)

Wissadula scabra, Prest. Reliq. Hænk. H. p. 117, t. 69, fig. 1–14.
Barranca. Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 2 de 1893 (C. G., Pringle,.....)

Wissadula tricarpellata, Rob. et Greenm, n. sp.

En laderas húmedas. Tequila (Est. DE JALISCO), Octubre 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4578 y 4610).

Sphæralcea angustifolia, St. Hill.

Malva angustifolia, Cav. Diss. 1. p. 64, t. 20; Bot. Mag. t. 2839. Sphwroma angustifolium, Schl. in Linnæa xi. p. 353. N. V. Yerba del negro.

En todo el Valle de México, Agosto 15 de 1881 (M. Urbina). Sphæralcea vitifolia, Benth et Hook, Gen. Pl. 1, p. 205.

Meliphlea vitifolia, Zucc. Pl. Nov. fasc. 11. p. 52, t. 9.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porosí), Octubre 4 de 1891 (C. G. Pringle, 3965).

Abutilon amplexifolium, Hemst. Diag. Pl. Nov. pars. alt. p. 23; Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 108.

Cerros. Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 24 de 1893 (C. G. Pringle, 5448).

Abutilon attenuatum, Rob. et Sea., n. sp. in hb. Pringle.

En las pendientes de las montañas, eerca del Lago de Chapala, creciendo entre los arbustos (Est. DE Jalisco), Noviembre 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4354).

Abutilon crispum, Dov. Gen. Syst. 1. p. 503.

Cerros, cerca de Oaxaca, á 5,800 pies. Octubre de 1894 (C. G. Pringle,....)

Abutilon jacquini, Don. in hb. Pringle.

Valle de Monterrey (Est. DE Nuevo León), Julio 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2675); Campos, cerca de la Magdalena (Est. DE JALISCO), Octubre 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4582).

Abutilon sidoides, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars altera, p. 24.

Cerca de la Magdalena (Est. de Jalisco), Octubre 12 de 1893.

(C. G. Pringle, 4583).

Abutilon sonoræ, GRAY, in Smithson. Centr. v. p. 23.

Cerros de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 15 de 1893 (C. G. Pringle,)

Abutilon triquetrum, A. RICH? in hb. Pringle.

Campos, cerca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4591).

Modiola caroliniana, G. Don. Gen. Syst. 1. p. 466.

Modiola multifida, Mœnch, Meth. 620; A. Gray, Gen. III. t. 128; Sr. Hill. Fl. Bras. Merid. 1. t. 43.

Malva caroliniana, Linn.

S. Joaquín (Valle de México), Agosto 15 de 1881 (M. Urbina); Guadalajara, Marzo de 1887 (M. Bárcena, 238).

TRIBUS II. URENEÆ.

Pavonia Iasiopetala, Scheele, in hb. Pringle.

En los cerros, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Mayo 27 y Junio 9 de 1889 (C. G. Pringle, 2686).

Pavonia melanommata, Rob. et Sea. n. sp. in hb. Pringle.

Arbusto de 5 à 8 piés. Colinas volcánicas, Monte León (Est. DE MICHOACÁN), Noviembre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4343).

Pavonia rosea, Schl. in Linnæa xi. p. 355. Micos (Est. de S. Luis Porosi), Julio 29 de 1891 (C. G. Pringle, 5035.)

Malvaviseus acerifolius, Prest. Reliq. Hænk. it. p. 135.

De 10-20 piés. Colinas rocallosas que rodean el Lago de Cuitzeo (Est. de Michordán), Julio 20 y Octubre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4132); Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 22

de 1893 (C. G. Pringle, 5447).

Malvaviscus arboreus, Cav. Diss. III. p. 131, t. 48, fig. 1.
De 10-15 piés de altura, floreciendo todo el año.
En los surcos de labor, valle de Oaxaca, á 5,000 piés. Noviembre de 1894 (C. G. Pringle, 4923).

Malvaviscus drummondii, Gray, Fl. N. Am. I. p. 230. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), Junio 6 de 1891 (C. G. Pringle, 5070).

TRIBUS III. HIBISCEÆ.

Kosteletzkia digitata, Grav, in hb. Pringle.

Tamasopo (Esr. de S. Luis Porosi), Junio 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3622).

Hibisous fasciculatus? DC. Prodr. 1. p. 454; Calq. des Dess. F1. Mex. 85.

Matorral pequeño de flor amarilla.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Barcena, 637).

Hibiscus pedunculatus, Cav. Diss. m. p. 163, t. 66, fig. 2. N. V. Monacillo.

Cultivado en los jardines, Originaria de Cabo de Buena Esperanza.

Hibiseus phœniceus, Willin. Sp. Pl. III. p. 813; Jacq. Hort. Schænb. III. t. 14.

Hibiscus betulifolius, Benth.

Hibiscus betulinus, H. B. K.

Barranca, Tequila (Est. DE JALISCO), Octubre 14 de 1893 (C. G. Pringle, 5449).

Hibiscus rosa sinensis, Linn.

Cultivado en los jardines; aclimatado en México.

N. V Tulipan, Bis.

Uno de los ejemplares colectado en la Barranca de Metlac. Abril de 1881 (J. M. Velasco).

Hibiscus tiliaceus, Linn. Sp. Pl. p. 976; Cav. Diss. III. t. 55, fig. 1. M. V. Maiagua.

Se usa la corteza para atar maderas.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 539); Margenes húmedas del Río Grijalva (Est. de Tabasco). Agosto de 1889 (J. N. Rovirosa).

Hibiseus tubiflorus, DC. Prodr. 1. p. 447; Calq. des Dess. Fl. Mex. 83.

N. V. Monacillo del Río.

Chapultepec (Valle de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina).

Hibiscus sp.

Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

TRIBUS IV. BOMBACEÆ.

Bombax palmeri, Watson, in hb. Pringle.

En lugares rocallosos de la Barranca (Est. de Jalisco), produce hojas en Septiembre y fructifica en Junio. 1891 (C. G. Pringle, 3840).

Eriodendron tomentosum, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

En la Barranca, cerca de Guadalajara, á 4,000 pies. Arbol de tamaño mediano. Florece en Mayo y da hojas en Julio (C. G. Pringle, 5300, 4733).

Ordo XXXIV. STERCULIACEÆ.

TRIBUS IV. FREMONTIEÆ.

Cheirostemon platanoides, Humb. et. Bonne. Pl. Æquin. 1 p. 82, t. 24; Bot. Mag. t. 5135.

N. V. Flor de la manita. N. Mex. Macpacxochitl.

Coatepec, cerca de Chalco (Est. DE México), Noviembre 2 de 1888 (M. Urbina).

TRIBUS VI. HERMANNIEÆ.

Hermannia inflata, Link et Otto.

De 3 á 6 piés: bancos calizos, Monte Albán, á 5,800 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4798).

Hermannia texana, Gray, Gen. Ill. II. p. 88, t. 135.

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 3 de 1889 (C. G. Pringle, 2649).

Physodium dubium, Hemsl. Diag. Pl. Nov. 1, p. 4; Biol. Cent. Am. Bot. 1, p. 130.

Cañada de Tomellín, á 2,500 piés (Est. de Oaxaca), Julio de 1894 (C. G. Pringle, 4751).

Melochia hirsuta, CAV. Diss. vi. p. 323, t. 175, fig. 1.

Riedleia serrata, Vent. Choix, t. 37.

Ricdleia heterotricha, Turcz.

var. serrata, Schaffner, in hb. Pringle.

Cerca de Guadalajara, Julio 27 de 1893 (C. G. Pringle, 4452).

Melochia pyramidata, Linn. Syst. p. 510.

Melochia domingensis, JACQ. Hort. Vindb. 1. t. 30.

Atotonileo el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel), Sta. Cruz, Valle de Túxpan (Est. de Jalisco), 1886 (M. Bár-

cena, 361).
Melochia tomentosa. Linn.

De 3 á 8 piés. Cañada de Tomellín, á 2,500 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 17 de 1894 (C. G. Pringle, 4631).

Waltheria americana, Linn. Sp. Pl. p. 941.

Waltheria indica, LINN. Cav. Diss. vi. p. 170.

Cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2701); Cerros secos, cerca de Onxaca, á 5,500 piés, Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4754).

TRIBUS VII. BUETTNERIEÆ

Guazuma ulmifolia, Lamk. Diet. Hr. p. 52; A. St. Hil. Pl. Us. Bras. t. 17.

Barranca cerca de Guadalajara, Mayo 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2571).

Ayenia berlandieri, Watson, in hb. Pringle.

De 4 á 6 piés. En las pequeñas llanuras. Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3309).

Ayenia glabra, Watson, in hb. Pringle.

De 10 á 15 piés. Barranca de Tequila (Est. DE JALISCO), Octubre 2 y 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4576).

Ayenia pussilla, Linn. Sp. Pl. p. 1354; Cav. Diss. v. p. 147. Cerros Villar (Est. de S. Luis Potosf), Septiembre 14 de 1893

(C. G. Pringle,)

Buettneria carthagenensis, Jacq. Am. p. 41.

Tallos de 5 á 8 piés. Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3780).

ORDO XXXV. TILIACEÆ.

TRIBUS II. GREWIEÆ.

Triumfetta brevipes, Warson, in hb. Pringle.

Colinas rocallosas, bajo los Robles, cerca de Guadalajara. Agosto 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4502).

Triumfetta insignis, Watson, in hb. Pringle.

En los declives de la Barranca, cerca de Guadalajara.

Florece en Julio. Agosto 15 de 1891 (C. G. Pringle, 4469 y 5330).

Triumfotta palmeri, Warson, in hb. Pringle.

Barraneas, cerea de Guadalajara. Agosto 24 y Noviembre 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 4493).

Triumfetta semitriloba, Linn. ex A. Rich. Fl. Cub. p. 80.

Triumfetta habanensis, H. B. K.

N. V. Huizapotillo.

Sub-arbusto de 2 á 3 piés. Sta. Cruz, Valle de Ahualuleo (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1887 (M. Bârcena, 640); Pendientes sombrías de la Barranca, cerca de Guadalajara. Noviembre de 1888 (C. G. Priugle, 1756).

Triumfetta sp.

N. V. Güizapol de borrego. El fruto se pega á la lana de los borregos. Planta herbácea. Valle de Ahualulco (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1886 (M. Bárcena).

Heliocarpus americanus, Linn. Sp. Pl. p. 643; Hort. Cliff. p. 211, t. 16.

N V. Cuaulote, Jonote. Mex. Quauhlahuac. Xolotzin.

Entre Tejupilco y Luvianos (Est. de México), Febrero de 1886 (M. Villada).

Heliocarpus arborescens, Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 86.

N. V. Jolocíu.

S. Sebastián (Est. de Tabasco), Febrero 27 de 1889 (J. N. Rovirosa, 387).

Heliocarpus tomentosus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1858, I. p. 226.

De 15 á 20 piés de altura. Cerca de Orizaba, á 4,000 piés (Est. DE Veracruz), Enero 17 de 1895 (C. G. Pringle, 6106).

TRIBUS III. TILIEÆ.

Corchorus siliquosus, Linn. Sp. Pl. p. 746.

Tamasopo (Est. de S. Luis Potost), Diciembre 15 de 1891 (C. G. Pringle,....)

Mutingia calabura, Linn. Sp. Pl. p. 728; Jaeq. Am. p. 166, t. 107.

N. V. Capulín, Un pequeño árbol.

Entre S. Juan Bautista y Mayito (Est. DE TABASCO), Noviembre 2 de 1887 (J. N. Rovirosa); Micos (Est. de S. Luis Poтоsí), Agosto 1º de 1891 (С. G. Pringle, 3793).

Tilia mexicana, Scul. in Linnæa xi, p. 377.

Tilia americana, L?

Montañas, eerea de Pátzeuaro (Est. de Michoacán), Julio 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4126).

Ordo XXXVI. LINEÆ

TRIBUS I. EULINEÆ.

Linum mexicanum, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. vi. p. 39; Bot. Reg. t. 1326.

Cañadas fértiles y boscosas, en las montañas ecrea del Lago de Chapala (Est. de Jaliseo), Noviembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4347); Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de OAXAGA), Julio 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4730).

Linum neo-mexicanum, GREENE, in hb. Pringle.

Sierra Madre (Est. de Chinuanua), Septiembre 21 de 1888 (C. . G. Pringle,....)

Linum orizabæ, Planen. in Hooker's Lond. Journ. Bot. vii. p. 482. En bancos húmedos y fríos. Sierra de las Cruees (Esr. de México), Agosto 16 de 1892 (C. G. Pringle, 4181).

Linum pringlei, Watson, n. sp. in hb. Pringle.

Altitud, 7,000-9,000 piés. Sierra Madre (Est. DE CIIIIUAHUA), Septiembre de 1887 (C. G. Pringle, 1200).

Linum rupestre, Engelm. Pl. Lindh. H. p. 232.

Suelo delgado de capa ealiza. Monte Albán, eerea de Oaxaca, á 5,500 piés. Agosto 14 de 1894 (C. G. Pringle, 4787).

Linum scabrellum, Planch. in Hooker's Lond. Journ. Bot. vii. p. 507.

Montes de S. Miguelito (Est. DE S. Luis Potosi), 1877 (G. Schaffner, 603).

Linum schiedeanum, CH. et. SCHL. in Linnæa v. p. 234.

Montes de los Morales (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 601); En las cuestas cespitosas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio y Agosto de 1891 (C. G. Pringle, 3807).

TRIBUS III. ERYTHROXYLEÆ.

Erythroxilon macrophyllum, Cav. Diss. t. 227.

Motzorongo (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (F. Altamirano).

ORDO XXXVIII. MALPIGHIACEÆ.

TRIBUS I. MALPIGHIEÆ.

Byrsonima crassifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 149.

Byrsonima cumingiana, Ad. Juss.

S. Márcos (Est. de Jalisco), Junio 5 de 1893 (C. G. Pringle, 5523).

Malpighia glabra, Linn. Sp. Pl. p. 609; Cav. Diss. t. 234.

Cerros calizos. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Agosto 22 de 1891 (C. G. Pringle, 5014). De 6 á 10 piés en cerros pedregosos. Las Canoas, Julio 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3225).

Bunchosia bilocellata, Schl. in Linnæa x. p. 241.

Bunchosia discolor, Turcz.

De 5 á 10 piés de altura. Cerros cerca de Oaxaca, á 5,500 piés. Septiembre 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4658).

Bunchosia palmeri, Watson, in hb. Pringle.

Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3888).

Bunchosia pringlei, Watson, n. sp. in hb. Pringle.

Tamasopo, cañón (Est. de S. Luis Potosí), Junio 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3736).

Galphimia angustifolia, Kunth. in hb. Pringle.

Montes cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 17 de 1889 (C. G. Pringle, 2708).

Galphimia gracilis, Bartl. in Linnæa xiii. p. 552.

Galphimia glauca, Hortul., nec. Cav.

En terrenos bajos, á la sombra de las palmeras. Estación de Rascón (Est. de S. Luis Potosí), Junio 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3099).

Galphimia hirsuta, Cav. Ic. v. p. 62.

De 10 á 15 piés. Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 5,800 piés. Septiembre 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4873).

Galphimia humboldtiana, Bartl. in Linnæa xiii. p. 555.

Galphimia glandulosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 172, t. 452, nec. Cay.

N. V. Palo del muerto.

Valle de Ahualulco y la Barranca (Est. de Jalisco), 1886 (M. Bárcena, 121, 503, y 569); Barranca de S. Jerónimo, cerca de Tenancingo (Est. de México), Enero 8 de 1886 (M. Villada); en las cuestas, cerca de Guadalajara, Noviembre 16 de 1889 (C. G. Pringle, 2757).

Galphimia multicaulis, Ad. Juss. Monogr. p. 68.

Cuesta de S. Juan del Estado, á 7,500 pies (Est. de Oaxaca), Agosto 21 de 1894 (C. G. Pringle, 4828).

Galphimia sessilifolia, Rose, n. sp.

De 1 á 3 piés. Bancos de las Barrancas; cerros de Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 1º de 1894 (C. G. Pringle, 4901).

Echinopterys lappula, Juss. Monogr. p. 88, t. 9.

Arbusto delgado. Barranca, cerca de Guadalajara, Mayo 20 de 1891 (C. G. Pringle, 5129).

TRIBUS II. BANISTERIEÆ.

Heteropterys gayana, Ad. Juss. Monogr. p. 185.

Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. DE Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro).

Heteropterys portillana, Watson, in hb. Pringle. Un bejuco trepador sobre arbustos y árboles. Barranca, cerca de Guadalajara, Noviembre 10 de 1892 (C. G. Pringle, 4345).

Heteropterys beecheyana, Ap. Juss. Monogr. p. 221.

Heteropterys tomentosa, Hook, et Arx, nec. Juss.

Banisteria? paniculata, DC. Prodr. 1. p. 591; Calq. des. Dess. Fl. Mex. 131.

De 3 á 10 piés de altura, en capas calizas.

Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Agosto 22 de 1891 (C. G. Pringle, 3909).

Stigmaphyllon lupulus, Warson, in hb. Pringle.

En terrenos calizos, montañas de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 14 de 1892 (C. G. Pringle, 4102).

TRIBUS III, HIRÆEÆ.

Tetrapteris mexicana, Ноок. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 281. Cañón de Tamasopo (Евт. DE S. Luis Potosi), Agosto 6 de 1890 (С. G. Pringle, 3636); Barranca, cerca de Guadalajara, á 4,000 piés. Mayo 3 de 1894 (С. G. Pringle, 4731).

Tetrapteris schiedeana, Schl. et Ch. in Linnæn, v. p. 218.
Trepadora de 10 á 20 piés. Barrancas sombreadas, Monte
Albán, á 5,800 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 14 de 1894
(C. G. Pringle, 4885).

Hiræa macroptera, DC. Prodr. 1, p. 586.

Valle de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 2 y Agosto 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2684).

TRIBUS IV. GAUDICHAUDIEÆ.

Gaudichaudia acuminata, Ap. Juss. Monogr. p. 343.

Hiræa acuminata, DC. Prodr. 1. p. 586; Calq. des Dess. Fl. Mex. 128.

Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro).

Gaudichaudia cynanchoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 158, t. 445.

Teoloyucan (Est. de México), Agosto de 1886 (M. Villada); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 587).

Gaudichaudia filipendula, Ad. Juss. p. 340.

· Gaudichaudia mucronata, AD. Juss.

Hiræa mucronata, DC. Prodr. 1. p. 580; Calq. des Dess. Fl. Mex. 124.

Planta trepadora. Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 566); Barranca, cerca de Guadalajara, Noviembre 8 de 1888 (C. G. Pringle, 2116).

Aspicarpa sp.

N. V. Coamecate de cerro.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 745).

ORDO XXXIX. ZYGOPHYLLEÆ.

Tribulus grandiflorus, Bentil. et Hook. Gen. Pl. 1. p. 264.

Kallstræmia grandiflora, Torr. in A. Gray Pl. Wright. 1. p. 28.

Cerros cerca de Samalayuca (Еsт. DE Сипианиа), Septiembre 18 de 1888 (С. G. Pringle, 3045).

Tribulus sp.

S. Luis Potosi 1877 (G. Schaffner, 193); Atemajac (Est. DE Jalisco), Septiembre 21 de 1886 (M. Bárcena, 33).

Larrea mexicana, Moric. Pl. Nouv. d'Am. p. 71, t. 48; Gray. Gen. Ill. n. t. 147.

Zygophyllum tridentatum, DC. Prodr. 1. p. 706; Calq. des Dess. Fl. Mex. 159.

N. V. Gobernadora de México.

Cerros criazos y llanuras, Bocas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 21 de 1890 (C. G. Pringle, 3469).

ORDO XL. GERANIACEÆ.

Tribus I. GERANIEÆ.

Geranium mexicanum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 230. N. V. Pata de León.

Montes de S. Rafael (Est. de S. Luis Potosf), 1877 (G. Schaffner, 188); Barranca del Salto, Amecameca (Est. de México), Agosto de 1881 (M. Urbina); Tlalmanaleo (Est. de México), Agosto de 1890 (M. Villada); Cerros de Pátzcuaro (Еst. de Michoacáx), Noviembre 21 de 1890 (С. G. Pringle, 3350).

Geranium schiedeanum, Scut. in Linnæa, x. p. 253, var. Montes Escabrillos? cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 189).

Erodium circutarium, Leman. in DC. Fl. Fr. IV. p. 840.

N. V. Alfilerillo, Aguia del Pastor.

Valle de México, Abril de 1881 (M. Urbina); Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Erodium moranense, Willd. in H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 228.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Tribus II. PELARGONIEÆ.

Tropæolum majus, L.

N. V. Mastuerzo. Cultivada.

Huchuetoca (Est. de México), Noviembre 23 de 1888 (F. Altamirano).

Tropæolum peregrinum, Linn. Sp. Pl. ed. 2, i. p. 490, nec. hb. Linn; Jacq. Hort. Schoenb. t. 98; Bot. Mag. t. 1351.

Tropæolum aduncum, Sm. Tour. 1. p. 158.

N. V. Pajaritos, Palomillas. Cultivada.

Huehuetoca (Est. de México), Septiembre 23 de 1888 (F. Altamirano).

TRIBUS VI. OXALIDEÆ.

Oxalis berlandieri, Torr. in hb. Pringle.

Colinas arenosas, Peña (Texas), Agosto 10 de 1894 (C. G. Pringle, 2407).

Oxalis decaphylla, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 238, t. 468. Oxalis hernandezii, DC? Benth. Pl. Hartw.

En el eampo. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 17 de 1891 (С. G. Pringle, 3748).

Oxalis divergens, Benth. Pl. Hartw. p. 9; Bot. Reg. t. 1620.

En lugares eespitosos y húmedos, eerca del Lago de Pátzeuaro (Est. de Michoacán), Junio 16 de 1892 (C. G. Pringle, 4118).

Oxalis hernandezii, DC. Prodr. 1. p. 695; Calq. des Dess. Fl. Mex. 149.

En las montañas boseosas, eerca de Pátzeuaro (Est. DE MICHOACÁN), Julio 30 de 1892 (C. G. Pringle, 4159).

Oxalis sp.

N. V. Xocoyolli.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel). Oxalis sp.

N. V. Xocoyolli.

Huirambo (Est. de Michoacán), Junio de 1891 (M. Martinez). Oxalis sp.

Querétaro, Abril 20 de 1884 (M. Urbina).

ORDO XLI. RUTACEÆ.

TRIBUS II. RUTEÆ.

Ruta graveolens. L.

N. V. Ruda. Cultivada.

Valle de México, Abril de 1881 (M. Urbina).

Thamnosma texana, Benth. et Hook. Gen. Pl. 1. p. 288. Suelo ealizo. Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Septiembre 3 de 1889 (C. G. Pringle.....)

TRIBUS V. ZANTHOXYLEÆ.

Zanthoxylum limoncillo, Planch et Erst, MSS, in hb. Kew. Zanthoxylum pterota, Seem. Bot. Voy. "Herald" nec. H. B. K. Motzorongo (Est. de Veracruz), Junio de 1891 (F. Altamirano); Cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Agosto 27 de 1889 (C. G. Pringle,)

Zanthoxylum pringlei, Watsox, n. sp. in hb. Pringle.

Árbol de 40 piés de altura.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 25 y Octubre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3102).

Decatropis coulteri, Hook. fil. in Benth. et Hook. Gen. Pl. 1. p. 289; Biol. Centr. Am. Bot. 1. p. 169.

Cerros calizos, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Julio 19 y Agosto 28 de 1888 (C. G. Pringle, 2558). En capas calizas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosi), Octubre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3251).

Tribus VI. TODDALIEÆ.

Ptelea angustifolia, Bentu. Pl. Hartw. p. 9.

var. parvifolia, Gray. in hb. Pringle.

Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Mayo 29 de 1890 (C. G. Pringle, 3114).

Casimiroa edulis, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. II. p. 2; Seen. Bot. Voy. "Herald," p. 273, t. 51 & 52.

Zanthoxylon araliaceum, Turcz.

N. V. Zapote blanco, fruto dulce y comestible.

S. Ángel, Chimalixtac (VALLE DE MÉXICO), Abril 8 de 1882 (M. Urbina); cerca de Guadalajara, Septiembre 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3861).

TRIBUS VII, AURANTIEÆ.

Amyris madrensis, Watson, n. sp. in hb. Pringle.

Sierras (Est. de Nuevo León), Mayo 27 y Julio 17 de 1888 (C. G. Pringle, 2540).

Amyris parvifolia, GRAY, in hb. Pringle.

Cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Mayo 25 de 1889 (C. G. Pringle, 2527).

ORDO XLII. SIMARRUBACEÆ.

TRIBUS II. PICRAMNIEÆ.

Pieramnia filipetala, Turcz. Th. Durand. Ind. Gen. Ph. p. 82. Alvaradoa amorphoides, Liebm. in Vidensk. Meddel. 1853, p.

100; Walpers Ann. iv. p. 382.

Serranía de Cacahuamilpa (Est. de Guerrero), Encro de 1886 (M. Villada).

ORDO XLIV. BURSERACEÆ.

Bursera bipinnata, Engl. DC. Monog. Ph. iv. p. 49. N. V. Copal chino.

Cotija (Est. de Michoacán), Agosto 12 de 1890 (C. García).

Bursera cuneata, Engl. DC. Monog. Ph. iv. p. 56.

Con la madera blanca de esta planta se fabrican cubos para el pulque.

Tulpetlac (Esr. de México), Julio 15 de 1890 (A. Barragán). Bursera fagaroides, Engler.

var. \(\beta \). crenulata, in DC. Monog. Ph. IV. p. 48.

N. V. Cuajiote amarillo.

Cuernavaca (Est. de Morelos), Julio 29 de 1892 (Silverio Gómes).

var. 8.

S. Cristóbal Ecatepec, Tulpetlac (Est. DE Mèxico), Mayo 22 de 1889 (F. Altamirano).

Bursera galeottiana, ENGLER.

Un pequeño árbol. Monte Albán, cerca de Oaxaca, a 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 27 de 1894 (C. G. Pringle, 6071).

Bursera kerberi, Exgl. DC. Monog. Ph. iv. p. 41.

En cerros pedregosos y secos. Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4531). Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 17 de 1889 (C. G. Pringle, 2337).

Bursera lancifolia, Exgl. DC. Monog. Ph. Iv. p. 42.

Un pequeño árbol. Bancos de lava, cerca de Zapotlán (Esr. pe Jalisco), Mayo 27 de 1893 (C. G. Pringle, 4372).

Bursera lanuginosa, Engl. DC. Monog. Ph. Iv. p. 58. N. V. Copal.

Cuernavaca (Est. de Morelos), Julio 29 de 1892 (Silverio Gómez).

Bursera mexicana, Engl. DC. Monog. Ph. iv. p. 51.

N. V. Copal de santo.

Cotija (Est. de Michoacán), Agosto 12 de 1890 (Crescencio García).

Bursera palmeri, Watson, in hb. Pringle.

var. glabrescens, Watson.

En lugares agrestes de la Barranca, cerca de Guadalajara, Mayo 13 de 1891 (C. G. Pringle, 3707). En rocas agrestes de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 30 de 1891 (C. G. Pringle, 4032).

Bursera pringlei, Watson, in hb. Pringle.

Bancos de lava, cerca de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 27 de 1893 (C. G. Pringle, 4381).

ORDO XLV. MELIACEÆ.

TRIBUS II. TRICHILIEÆ.

Trichilia spondioides, Swartz. Fl. Ind. Occ. p. 730; Refug. Bot. t. 293.

En terrenos bajos de boscaje. Hacienda de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Diciembre 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3967).

Trichilia havanensis, JACQ. Am. p. 129, t. 175, fig. 38.

· Moschoxylon cuneatun, Turcz.

Moschoxylon veraguense, Seem.

Árbol pequeño. Bordes de la cañada, Orizaba (Est. de Ve-RACRUZ), Enero 22 de 1895 (C. G. Pringle, 6091).

ORDO XLVII, OLACINEÆ.

TRIBUS I. OLACEÆ.

Ximenia parviflora, Bentu. Pl. Hartw. p. 7.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Mayo 26 de 1891 (C. G. Pringle, 3729).

Scheepfia schreberi, Lam. in hb. Pringle.

(Schæpfia arborescens, R. & S.)

De 10 piés de altura, en capas calizas. Las Canoas (Est. de S. Luis Porosí), Octubre 30 y Diciembre 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3929).

ORDO L. CELASTRINEÆ.

- Mortonia gregii, Gray, Pl. Wright. 1. p. 35, in adnot. t. 4 Montañas calizas. Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Mayo 29 de 1890 (C. G. Pringle, 3115).
- Wimmeria concolor, Ch. et Schl. in Linnæa, vi. p. 428; nec. Hook, Ic. Pl. iv. t. 356.

Un arbusto ó pequeño árbol. Las Canoas (Est. de S. Luis Poroso, Junio 19 y Agosto 7 de 1891 (C. G. Pringle, 3706).

ORDO LIII. RHAMNEÆ.

TRIBUS II. ZIZYPHEÆ.

Zizyphus obtusifolius, Gray, in hb. Pringle. Cerca de Monterey, Junio 14 de 1889 (C. G. Pringle, 2897).

TRIBUS III. RHAMNEÆ.

- Rhamnus humboldtianus, Roem. et Schultz, Syst. Veg. v. p. 295; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vii. t. 608.
 - N. V. Capulin cimarrón, Tullidora.
 - Querétaro, Abril 20 de 1886 (M. Urbina).
- Rhamnus palmeri, Watson, in hb. Pringle.

De 5 á 6 piés de altura. Cerros pedregosos, cerca de Tequila (Est. De Jalisco), Julio 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4427).

- Rhamnus serratus, Willd. R. et S. Syst. Veg. v. p. 295.

 Rhamnus serrulatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vii. p. 51, t. 607.
 - N. V. Tlalcapollin.
 - Tlalmanalco, á 2,400 m. (Est. de México), Mayo 4 de 1890 (F. Allamirano).

Ceanothus azureus, Desf. DC. Prodr. II. p. 31; Bot. Reg. t 291. N. V. Chaquira.

Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel); S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 101).

Volcán del Nevado (Est. de Colima), 1886 (M. Bárcena); Hac. de Acuautla (Est. de México), a 2,500 m. Mayo 1º de 1890 (F. Altamirano); Cerros pedregosos y secos de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3378).

Ceanothus buxifolius, Willd. ex. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vii. p. 62, t. 615.

Colubrina buxifolia, Schl.

Montañas cerca del Lago de Chapala (Est. DE Jalisco), Diciembre 13 de 1889 (C. G. Pringle, 2418).

Ceanothus greggii, A. GRAY. Pl. Wright. H. p. 28.

Montañas de los Morales, cerca de S. Luis Potosí, 1870 (G. Schaffner, 102).

Sageretia elegans, Brongn. in Ann. Sc. Nat. x. p. 359.

Rhamnus elegans, H. B. K.

De 10 á 15 piés. Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 5,800 piés. Septiembre 14 de 1894 (C. G. Pringle, 4856).

Sageretia wrightii, WATSON, in hb. Pringle.

De 10 piés de altura.

Bancos pedregosos del río, Salto de Juanacatlán (Est. DE JALISCO), Octubre 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3881).

Barcenia guanaxuatensis, A. Dugés. Revist. Científic. Mexic. I. nº 5, p. 8 (1880).

Colubrina glomerata, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 200. Rhamnus glomeratus, Hook. in Benth. Pl. Hartw. p. 9. Guanajuato (A. Dugés).

Colubrina ehrenbergii, Scul. in Linnæa, xv. p. 469.

Montañas. Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3189). Octubre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3249).

Colubrina greggii, Watson, in hb. Pringle.

Valle de Monterey (Est. de Nuevo León), Mayo 28 y Julio 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2695).

TRIBUS IV. COLLETIEÆ.

Adolphia infesta, Meissy, Gen. Pl. p. 70.

Ceanothus infestus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vn. p. 63, t. 614. Colubrina infesta, Schl.

Huauchinango (Est. DE Puebla), Abril 22 de 1889 (F. Allamirano); Cerros cerca de Chihuahua, Septiembre 6 de 1888 (C. G. Pringle, 3043).

TRIBUS V. GOUANIEÆ.

Gouania domingensis, Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 1663.

Gouania glabra, JACQ. Am. t. 179, fig. 40.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porosí). Florece en Agosto y fructifica en Noviembre; 1890 (C. G. Pringle, 3210 y 3375).

ORDO LIV. AMPELIDACEÆ.

TRIBUS I. AMPELIDEÆ.

Vitis quinquefolia, Michx. Fl. Bor.-Am. i. p. 159 (sub. Ampelopside).

N. V. Guan.

Mineral de Guadaleázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

Vitis tiliæfolia, Willd. in H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vn. p. 236. Vitis caribæa, DC. Prodr. i. p. 634.

N. V. Uvilla cimarrona.

Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 635).

Ampelopsis quinquefolia, Michix.

var. pubescens, Gray, in hb. Pringle.

Sierra Madre, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 17 y Agosto 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2505).

Cissus ampelopsis, Pers.

En capas calizas, Sierra de la Silla (Est. de Nuevo León), Mayo 30 y Agosto 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2795).

ORDO LV. SAPINDACEÆ.

TRIBUS I. PAULLINIEÆ.

Serjania racemosa, Schum. in Skrivt Nat. Selskab. nn. part. 2, p. 127, t. 12, fig. 3; Radlk. Monog. p. 264.

N. V. Nueve hojas; contra ranilla de bestias.

Cempoala (Esr. de Veracruz), Enero 12 de 1891 (M. Villada). Serjania schiedeana, Schl. in Linnaa xviii, p. 44.

Trepadora de 10 á 20 piés.

En los bosques. Cerros de Tequila (Est. DE JALISCO), Septiembre 22 de 1893 (C. G. Pringle, 4619).

Urvillea dissecta, Warson, in hb. Pringle.

En las cuestas bajo los robles, cerca de Chihuahua, Agosto 5 y Noviembre 5 de 1887 (C. G. Pringle, 1584).

Urvillea ulmacea, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. v. p. 105, t. 440.

Cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Mayo 31 de 1889

(C. G. Pringle, 3013).

Cardiospermum molle, Linn. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 103.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 100).

TRIBUS II. THOUINIEÆ.

Thouinia pringlei, WATSON, in hb. Pringle.

En sitios agrestes de la Barranca, cerca de Guadalajara. Floreció en Julio 20 y fructificó en Mayo 6 de 1893 (C. G. Pringle, 5384).

TRIBUS III. SAPINDEÆ.

Sapindus (Electra) galeottii, GRAY.

Barrancas de los cerros, cerca de Oaxaca, a 6,000 piés. Septiembre de 1894 (C. G. Pringle, 4896).

Sapindus marginatus, Willio. Enum. p. 432; Gray. Gen. Ill. II. t. 180.

Valle de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 17 de 1889 (C. G. Pringle, 2709).

TRIBUS XII. DODONÆEÆ.

Dodonæa viscosa, Linn. Mant. p. 238.

Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3461).

TRIBUS XIV. HARPULLIEÆ.

Alvaradoa amorphoides, Liebu.

Barranca, cerca de Guadalajara, a 5,000 piés. Mayo 1º de 1894 (C. G. Pringle, 4740).

ORDO LVII. ACERACEÆ.

Negundo aceroides, Mönch.

Arbol muy pequeño. En lugares cultivados (Est. de S. Luis Potosi), 1876 (G. Schaffner, 88).

ORDO LXI. ANACARDIACEÆ.

TRIBUS II. SPONDIEÆ.

Pistacia mexicana, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vu. p. 22, t. 608. Montes de S. Rafael, cerca de S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 90).

Вот.-12.

Schinus molle, Linn. Sp. Pl. p. 1467; Lam. Ill. t. 822.

N. V. Árbol del Perú.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 115).

Rhus filicina, DC. Prodr. n. p. 67; Calq. des Dess. Fl. Mex. 180. N. V. Tetlatia, Tetlate.

Cuernavaca (Est. de Morelos), Octubre de 1884.

Rhus microphylla, Engelm. in Gray. Pl. Wright. I. p. 31. N. V. Correosa.

Montes de S. Miguelito, cerca de S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 92).

Rhus mollis, H. B. K.

De 5 á 8 piés. Cerros cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4815).

Rhus potentillæfolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1858, i. p. 469.

De 15 á 20 piés. Cañón de Tomellín, á 2,500 piés (Est. de Oaxaca), Julio 31 de 1874 (C. G. Pringle, 4752).

Rhus sempervirens, Scheele, in Linnæa, xxIII (1850), p. 566. N. V. Lambrisco.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio, 1892 (M. Villada).

Rhus sempervirens, Scheele.

β. pachyrrhachis, Engl. DC. Monog. Ph. vol. Iv, p. 391.
 Rhus pachyrrhachis, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. I. p. 218.
 Rhus tercbinthifolia, Ch. et Schl. in Linnæa, v. p. 600.
 Barranca, cerca de Guadalajara, Noviembre 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2756).

Rhus toxicodendron, Linn. Sp. Pl. p. 381.

N. V. Mala muger, Guau, Zumaque; en Yucatán "Chechen."
Miacatlán y Tetecala (Est. de Morelos), Septiembre de 1884
(F. Altamirano); Barranca, cerca de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 25 de 1893 (C. G. Pringle,.....)

Rhus virens, Lindl. in A. Gray. Pl. Lindl. n. p. 159 (?=schie-deana, Schl.)

Sierra Madre, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Agosto 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2677).

Rhus sp.

Jojutla (Est. DE Morelos), Septiembre 15 de 1890 (F. Altamirano).

Rhus sp.

Hac. del Zoquital, Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

ORDO LXII. CORIARIEÆ.

Coriaria thymifolia, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. vn. p. 168, t. 636. Coriaria atropurpurea, DC.

Huisquilucan (Est. de México), Abril de 1886 (F. Altamirano); Nevado de Colima (Est. de Jalisco), Mayo 22 de 1893 (C. G. Pringle.....)

Ordo LXIV. CONNARACEÆ.

TRIBUS I. CONNAREÆ.

Rourea oblongifolia, Ноок. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 283. var. floribunda.

N. V. Chilillo, Planta venenosa,

Montes de Pánuco, Ozuluama (Est. de Veracruz), Noviembre de 1887.

ORDO LXV. LEGUMINOSÆ.

Sub-Ordo I. PAPILIONACEÆ.

Tribus II. GENISTEÆ.

Crotalaria eriocarpa, Benth. Bot. Voy. Sulphur. p. 80. Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 813). Crotalaria guatemalensis, Benth. in Vidensk. Meddel. 1853, p. 2. Campos cerca del Lago de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Agosto 7 y Octubre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 4144),

Crotalaria incana? Linn. Sp. Pl. p. 1005; Jacq. Obs. iv. p. 82.

Sta. Cruz, Valle de Tuxpan (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 358); Volcán del Nevado de Colima (M. Bárcena, 454).

Crotalaria maypurensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 403. Crotalaria acapulcensis, Hook. et Arn.

El Gachupín (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 422).

Crotalaria pumila, Ort. Déc. 11. p. 23.

Crotalaria lupidina, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 402, t. 590.Crotalaria triantha, DC. Prodr. n. p. 135; Calq. des Dess. Fl. Mex. 225.

N. V. Tronadora.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina); cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 814).

Crotalaria sagittalis, Linn. Sp. Pl. p. 1003.

N. V. Sonaja.

Llano de Belén (Valle de Guadalajara), Septiembre de 1880 (M. Bárcena, 35).

Crotalaria setifera, DC. Prodr. n. p. 131; Calques des Dess. Fl. Mex. 226.

De 1 á 3 piés. Sierra de S. Felipe, de 6,500-7,500 piés (Est. De Oaxaca), Agosto 23 de 1894 (C. G. Pringle, 4819).

Lupinus bilineatus, Benth? in hb. Pringle.

Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina); Cerca de Silao (Est. de Guanajuato), Mayo 19 de 1891 (C. G. Pringle, 3717).

Lupinus ehrenbergii, Schl. in Linnæa, m. p. 334; Bot. Reg. xxxm. t. 11.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada); Sierra Madre. De 7-9,000 piés de altura (Est. de Снінчанча), Octubre 5 de 1887 (С. G. Pringle, 1207).

Lupinus elegans, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 477; Bot. Reg. t. 1581. Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina). De 5 á 6 piés de tamaño. Montañas cerca de Pátz-

cuaro (Est. de Michoacáx), Diciembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3986).

Lupinus glabellus, Mart. et Gall. in Bull. Acad. Brux. x. 2, p. 37

Volcán del Nevado de Colima, á 3,960 m. Septiembre de 1887 (M. Barcena); Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4836).

Lupinus mexicanus, Cerv. in DC. Prodr. II. p. 408; Bot. Reg.

Tialmanalco (Est. de México), Agosto 20 de 1890 (M. Villada); Selvas de pinos, á 12,000 piés. Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4230); Faldas de las montañas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3064).

Lupinus montanus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 478.

Volcán del Nevado de Colima, á 3,960 m. Septiembre de 1887

(M. Bárcena); Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4779).

TRIBUS III. TRIFOLIEÆ.

Medicago denticulata, Willip.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 810).

Melilotus parviflora, Desf.

Chapultepee (Valle de México), Marzo de 1882 (M. Urbina).

Trifolium amabile, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. vi. p. 503, t. 593. N. V. Trébol.

Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel); San Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 806).

var. oblongifolium, HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 232.

Entre Huehuetoca y Hacienda de la Guiñada (Est. de México), Septiembre 24 de 1888 (M. Villada).

Trifolium involucratum, Willd. Sp. Pl. in. p. 1372; Kunth. Pl. Leg. t. 53.

Trifolium fimbriatum, LINDL. Bot. Reg. t. 1070.

Potrero de la Garceza en el Valle de Toluca, Marzo de 1886 (M. Villada); San Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 807).

Вот,-13.

Trifolium mexicanum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. 1. p. 233.
Barranea del Salto, cerca de Amecameca (Est. de México).
Agosto de 1881 (M. Urbina); en terrenos calizos y agrestes.
Flor de María (Est. de México), Septiembre 4 de 1890 | C.
G. Pringle, 3238).

TRIBUS IV. LOTEÆ.

Hosackia angustifolia, G. Don. Gen. Syst. II. p. 200.

Hosackia mexicana, Benth.

Cerca de los Morales (Est. de S. Luis Potosf), 1877 (G. Schaffner, 820); Sierra de S. Felipe, de 7,500 á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre de 1894 (C. G. Pringle, 4906).

Hosackia puberula, Benth. Pl. Hartw. p. 305.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 819).

Hosackia sp.

N. V. Coachipilin.

Soconusco (Est. de Chiapas), 1883 (R. Montes de Oca).

TRIBUS V. GALEGEÆ.

Psoralea pentaphylla, Linn. Sp. Pl. p. 1076; Juss. Act. Acad. París, 1744, p. 381, t. 17.

N. V. Raiz de contrayerba, usada para los fríos.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 833).

Eysenhardtia amorphoides, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. vi. p. 491, t. 592.

var. orthocarpa, GRAY.

N. V. Palo dulce.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 782); Cerros cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 20 de 1889 (C. G. Pringle, 2715).

Eysenhardtia orthocarpa, Watson, in Proc. of Am. Acad. vol. xvu, p. 339.

Sobre este arbusto crece el Viscum tomentosum. Teoloyucan (Est. de México), Agosto de 1886 (M. Urbina); Volcán del

Nevado Est. de Colima 1886 (M. Bárcena, 451); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 620). En esta última localidad le llaman "Coatli ó Caute"; Cerros pedregosos cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Octubre 22 de 1889 (C. G. Pringle, 2731).

Dalea albiflora, Gray Pl. Wright. H. p. 38.

Cerros cerca de Guerrero (Est. de Chinivaliua), Septiembre 9 de 1887 (C. G. Pringle, 1586).

Dalea alopecuroides, Nutt. Gen. Am. II. p. 101; CAV. lc. I. t. 86. Dalea leporina, Air.

Al pie de las montañas de la Sierra Madre (Est. DE Cinnualiua), Septiembre 19 de 1887 (C. G. Pringle, 1214).

Dalea calycosa, Gray Pl. Wright H. p. 40.

Mesas arenosas (Est. de Cimiuanua), Agosto de 1889 (C. G. Pringle, 3040).

Dalea citriodora, Willd. Sp. Pl. III. p. 1339.

Psoralea citriodora, CAV. Ic. III. p. 36, t. 271.

¿Dalea polyphylla, Mart. et Gal.

N. V Limoncillo.

Entre Huehuetoca y Hacienda de la Guiñada (VALLE DE MÉxico), Septiembre de 1888 (M. Villada).

Dalea cliffortiana, Willd. Sp. Pl. in p. 1336; Linn. Hort. Cliff. p. 363, t. 21.

En campos, Toluca (Est. DE México), Septiembre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 5256).

Dalea diffusa, Moric. in Mém. Genève, vi. p. 553.

Dalea gracilis, Hook. et Arn.

Dalea ramosissima, Mart. et Gal.

Carroa diffusa, Presl.

Carroa glandulosa, PRESL. Sym. Bot. II. t. 71.

N. V. Escoba colorada.

Belén, Guadalajara, Septiembre 24 de 1886 (M. Bárcena, 54); Lomas secas de la Barranca, cerca de Guadalajara. Arbusto de 4 á 6 piés, Noviembre 1.º de 1888 (C. G. Pringle, 1731).

Dalea domingensis, DC. Prodr. 11. p. 246.

Dalea vulneraria, var. a. brevidens, Œrsted.

Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Octubre 30 de 1891 (C. G. Pringle, 4061).

Dalea frutescens, GRAY. Pl. Lindh. u. p. 175. var.

Sierra Madre, cerca de Montercy (Est. de Nuevo León, Agosto 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2681).

Dalea gracillima, Watson in Proc. Am. Acad. xxII. p. 404. N. V. Escoba colorada,

Anual. Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Barcena, 624).

Dalea inconspicua, Schauer in Linæa xx. p. 744.

Cerros secos, arriba de Las Sedas, a 7,500 piés (Est. de Oa xaca), Octubre 30 de 1894 (C. G. Pringle, 6020).

Dalea lasiostachya, Bentu. Pl. Hartw. p. 11.

¿Dalea argyroslachys, Hook. et Arn.

S. Luis Potosí 1877 (G. Schaffner, 788); en terrenos secos del Cañón de Río Hondo (Est. de Mèxico), Agosto 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3158); Sierra de S. Felipe, & 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 6074).

Dalea lemmoni, Parry in Proc. Am. Acad. xxii. p. 404.

Llano de la Concepción (Est. de Jalisco), Octubre 15 de 1886 (M. Bárcena, 168); Llanuras de Guadalajara, Octubre 5 de 1889 (C. G. Pringle, 2725).

var. laxa Watson.

Cerros de Zacatecas, Octubre 25 de 1888 (C. G. Pringle, 1758).

Dalea leucostachya, GRAY, Pl. Fendl. 1. p. 32, Adnot.

En lugares fríos, montañas de Mapula, de 4 á 6 piés de altura (Еsт. DE Сишиания), Octubre de 1886 (С. G. Pringle, 721).

Dalea leucostoma, Schl. in Linnæa, xh. p. 294. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 789).

Dalea Iuisana, Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 341. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 808).

Dalea lutea, Willd. Sp. Pl. III. p. 1341.

Dalea ovatifolia, ORT. Dec. p. 30, t. 3.

Psoralea lutea, CAV. Ic. t. 325.

Tajo de Nochistongo (Valle de México), Septiembre 23 de 1888 (M. Urbina).

Dalea microphylla, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 482.

Al pié de las montañas. Sierra de las Cruces; Octubre 29 de 1892 (C. G. Pringle, 4325); Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 10 de 1894 (C. G. Pringle, 4945).

Dalea mollis, Benth. Pl. Hartw. p. 306; A. Gray. Pl. Wright. 1. p. 47. var.

Mesas, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 5294).

Dalea mucronata, DC. Prodr. 11. p. 246.

Cerros, cerca de Guadalajara, Noviembre 19 de 1892 (C. G. Pringle, 5290).

Dalea mutabilis, Willd. Sp. Pl. III. p. 1339; Bot. Mag. t. 2486. En las praderas, Flor de María (Est. de México), Agosto 1º de 1890 (C. G. Pringle, 3181).

Dalea naviculifolia, Hemst. Diag. Pl. Nov. pars. I. p. 7.

Arbusto postrado. Cerros, arriba de Las Sedas, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 30 de 1894 (C. G. Pringle, 6017).

Dalea nigra, Mart. et Gall. in Bull. Acad. Brux. x. pars. 2, p. 43.

Dalea clegans, Hook. et Arx.

Belén, Guadalajara, Septiembre 24 de 1886 (M. Bárcena, 53); La Barranca (Est. DE Jalisco), Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena, 6 y 170); Llanuras de Guadalajara, Octubre 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2494).

Dalea nutans, WILLD. Sp. Pl. III. p. 1338.

Dalea crenulata, Hook. et Arn.

Psoralea nutans, CAv. Ic. t. 201.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosf), Octubre 17 de 1891 (C. G. Pringle,.....)

Dalea pectinata, Kunth. Pl. Legum. p. 169, t. 49.

Caracteriza las praderas.

Valle de Ahualulco (Est. De Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bărcena.....); Llanuras, cerca de Guadalajara, Septiembre 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3835); S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 790).

Dalea plumosa, Warson in hb. Pringle.

Bajo 1as peñas, cerros cerca de Chihuahua, Octubre 7 de 1886 (C. G. Pringle, 1010).

Dalea pogonathera, GRAY Pl. Fendl. I. p. 31.

Llanuras y mesas, cerca de Chihuahua, Agosto 15 de 1887 (C. G. Pringle, 1568).

Dalea polycephala, BENTH. MSS. in hb. Kew; HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 244.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 786 y 787).

Dalea prostrata, ORT. Dec. p. 69.

Á la orilla del Tajo de Nochistongo (Valle de México), Septiembre 23 de 1888 (M. Urbina).

Dalea pyramidalis, Schl. in Linnæa, vn. p. 292.

Chapultepee (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Dalea ramosissima, Benth. Bot. Voy. Sulph. p. 11, t. 10.

S. Luis Potosi (G. Schaffner, 785), 1877; Hac. de la Guinada (Est. de México), Septiembre 23 de 1888 (M. Villada).

Dalea seemanni, Warson in hb. Pringle.

Cerros de Zacatecas, Oetubre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 4059).

Dalea sericea, Lag. Nov. Gen. ct Sp. p. 23.

En lugares agrestes, Flor de María (Est. de México), Julio 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3182).

Dalea tomentosa, Cav. Ic. v. III. p. 21 t. 240.

Matorral floribundo; flor violeta pálida.

Valle de Ahualuleo (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bărcena, 614).

Dalea trifoliolata, Moric. Pl. Nouv. d'Amér. m. t. 3.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 795).

Dalea triphylla, Pav. ex Schl. in Linnæa, xu. p. 289.

Suelo delgado, Cerro de Ixtapalapa (DISTRITO FEDERAL), Agosto 13 de 1893 (C. G. Pringle, 4483).

Dalea tuberculata, LAG. Nov. Gen. et Sp. p. 23.

Dalea thymoides, Schl. et Ch?

N. V. Engorda-cabras.

S. Diego (Sur de S. Luis Potosf), Diciembre de 1881 (J. 1) Cano y Alcacio).

var. flos albus.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 784).

var. flos purpureus.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 783).

Dalea uncifera, Cham. et Schl. in Linnæa v. p. 580.

De 3 á 4 piés de altura, cerros de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Septiembre de 1892 (C. G. Pringle, 4273).

Dalea unifoliolata, Rob. et Greenm. n. sp. in hb. Pringle.

Suelo delgado y seeo, barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4585); Suelo seco, Las Sedas, a 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4924).

Dalea verbenacea, Schl. in Linnæa v. p. 579.

Dalea tomentosa, WILLD.

Dalca psoraloides, Moric.

Tehuacán (Est. de Puebla), Julio de 1885 (J. Velasco).

Dalea wrightii, A. Gray Pl. Wright. 1. p. 49.

Los Médanos (Est. de Cumuanua), Septiembre 13 de 1888 (C. G. Pringle,).

Indigofera densiflora, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. pars. 2, p. 44.

De 2 á 3 pies, Cerros cerca de Sta. Ines del Monte, á 7,500 pies (Est. de Oaxaca), Octubre 15 de 1894 (C. G. Pringle, 4977).

Indigofera excelsa, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. pars. 2, p. 45.

De 10 piés de altura, Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Porosí), Septiembre 30 de 1890 (C. G. Pringle, 3303).

Indigofera leptosepala, Nutt. in Torr. et Gr. Fl. N. Amer. 1. p. 298.

var. brevipes, Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. p. 342.

Montañas de S. Rafael (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 818).

var. angustata, Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. p. 342.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 817); Faldas de la Sierra de S. Felipe, á 7,000 piés (Est. de Oaxaea), Julio 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4729).

Indigofera lindheimeri, Scheele in hb. Pringle.

En las arenas del río, Monterey (Est. DE Nuevo León), Junio 2 y Agosto 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2700).

Indigofera palmeri, Wars. in hb. Pringle.

La Barranca (Est. de Jalisco), Junio 27 y Octubre 1.º de 1888 (C. G. Pringle, 2550).

Brongniartia foliolosa, Benth. in Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. 1, p. 7.

Cerros calizos. Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3308).

Brongniartia inconstans, Watson in hb. Pringle.

En las euestas, eerca de Tequila (Est. DE Jalisco), Julio 2 de 1893 (C. G. Pringle, 4415).

Brongniartia mollis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 467, t. 587. Cerro de Ixtapalapa (Distrito Federal), Mayo 7 y Agosto 13 de 1893 (C. G. Pringle, 4410).

Brongniartia nudiflora, Watson n. sp. in hb. Pringle.

Mesas volcánicas, cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco).

Florece en 21 de Mayo y el follaje en 18 de Septiembre;

1891 (C. G. Pringle, 3719).

Brongniartia oxyphylta, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 254.

Peraltea oxyphylta, DC. Mem. Leg. xiii. p. 463; Prodr. ii. p. 475.

De 3 á 8 piés. Valle de Oaxaca, á 5,000 piés. Mayo 12 de 1894

(C. G. Pringle, 4632).

Brongniartia sericea, Schl. in Linnæa xn. p. 337.

S. Francisco Acuautla, 4 2,250 m. (Est. DE México), Abril 28 de 1890 (F. Altamirano).

Brongniartia thermoides, Spr. ex Steud. Nomen. Bot. 1. p. 230.

Perallea Iupinoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 471, t. 589. N. V. Janacahuate.

Valle de Tonila y Barranca del Platanar (Est. DE JALISCO), Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena, 372 y 384).

Brongniartia sp.

Arbusto de flor violada.

La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena, 102).

Peteria scoparia, A. Gray. Pl. Wright. I. p. 50.

var. glandulosa.

N. V. Camote del monte.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 834).

Tephrosia affinis, Watson in hb. Pringle.

En las lomas de La Barranca, cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Julio 20 de 1893 (C. G. Pringle, 4451).

Tephrosia lindheimeri, Gray in Boston, Journ. Nat. Hist. vi. p. 172.

Sierra Madre, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Mayo 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2796).

Tephrosia macrantha, Rob. et Greenm. n. sp. in hb. Pringle. De 10 a 12 piés, cerros de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4554).

Tephrosia toxicaria, Pers. Ench. n. p. 328; Plum. cd. Burm. t. 135.

Cerros rocallosos, cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Junio 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4396),

Diphysa floribunda, Peyr. in Linnæa, xxx. p. 78.

Árbol pequeño.

Sitios agrestes de las barrancas, arriba de Orizaba, á 4,000 piés (Est. de Veracruz), Enero 22 de 1895 (C. G. Pringle, 6086).

Diphysa sennoides, Bentil in Vidensk. Meddel, 1853, p. 11. Cerros. Río Blanco (Est. de Jalisco), Julio 12 de 1893 (C. G. Pringle, 5484).

Diphysa suberosa, Warson in hb. Pringle.

Cerros, cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Mayo 25 de 1891 (C. G. Pringle, 4013).

Sesbania cavanillesii, S. Wats. in Proc. Am. Aead. xvii. p. 342.

**Eschynomene longifolia, Cav. Ic. Ill. iv. p. 8, t. 315, non Ort.

Cerea de los ríos. Guadalajara (Est. de Jalisco), Julio 25 de

1893 (C. G. Pringle,...); Por las corrientes, cerca de Guadalajara, á 5,000 piés. Julio 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4738).

Sesbania picta, Pers. Ench. n. p. 316.

Æschynomene picta, CAv. Ie. t. 314.

Anual; de 2 m. de altura; flor amarilla jaspeada.

N. V. Zacate de agua.

Valle de Ahuaiulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárceua, 616).

Astragalus dispermus, GRAY in lib. Pringle.

Mesas del Norte (Baja California), Abril 6 de 1882 (C. G. Pringle,.....)

Astragalus humboldtii, GRAY in Proc. Am. Acad. vi. p. 195, in adnot.

Phaca mollis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. p. 496, t. 585.

En las llanuras. La Honda (Est. de Zacatecas), Agosto 18 de 1890 (C. G. Pringle, 3466).

Astragalus leptocarpus, Torr. et Gray, Fl. N. Am. 1. p. 334; Gray in Proc. Am. Acad. vi. p. 200.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner,....)

En Iomas frías. Sierra de Tequila (Est. DE Jalisco), Julio 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4430); Sierra Madre, cerca de Monterrey, var. (Est. De Nuevo León), Agosto 22 de 1889 (C. G. Pringle, 2887).

Astragalus nuttallianus, A. Gr. in Proc. Am. Acad. vi. p. 695, in adnot.

En las llanuras (Est. de Chinuanua), Abril 4 de 1885 (C. G. Pringle, 276).

Astragalus parvus, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 266. Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 815).

Astragalus pringlei, Watson in hb. Pringle.

Llanuras de Chihuahua, Mayo 5 de 1887 (C. G. Pringle, 1592.

Astragalus strigulosus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 494. Phaca elongata, Mart. et Gal.

var? gracilis, HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 266.

Montes de S. Miguelito, cerca de S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 821).

Astragalus tolucensis, Rob. et Sea, n. sp. in lib. Pringle. En lugares muy secos, bajo los pinos. Nevado de Toluca, á 12,000 piés, Septiembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4238).

Astragalus triflorus, A. Gray Pl. Wright. II. p. 45.

Phaca triflora. DC.

Phaca candolliana, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 495, t. 586. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 816).

TRIBUS VI. HEDYSAREÆ.

Nissolia confertiflora, Watson, var. laxior, Rob. n. var. in hb. Pringle.

Barranca de Beltrán (Est. de Jalisco), Junio 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4379 y 5421).

Nissolia fruticosa, Jaco. Amer. p. 198, t. 179, fig. 44.

Trepadora de 10 á 15 piés. Valle de Oaxaca, á 5,000 piés. Agosto 17 de 1894 (C. G. Pringle, 4640).

Nissolia multiflora, Rose n. sp.

Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 5,800 piés. Noviembre 23 de 1894 (C. G. Pringle, 6064).

Nissolia schottii, GRAY in hb. Pringle.

Cerca del Altar (Est. DE SONORA), Agosto 26 de 1884 (C. G. Pringle,....)

Nissolia wislizeni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. p. 334. S. Luís Potosí, 1877 (G. Schaffner, 793); Río Blanco (Est. de Jalisco), Julio 17 de 1893 (C. G. Pringle, 5482).

Chatocalyx wislizenii, A. Gr. Pl. Wright, I. p. 51, et n. p. 45; Torr. Bot. U. S. & Mex. Bound. Surv. p. 56, t. 18, figg. 5-7. Amicia zygomeris, DC. Prodr. II. p. 315; Calq. des Dess. Fl. Mex. 275; Bot. Mag. t. 4008.

Cañadas fértiles. Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 22 de 1889 (C. G. Pringle, 2411).

Æschynomene americana, Linn. Sp. Pl. p. 1016; Sloane Jamaica i. t. 118, fig. 3.

Pénjamo (Est. de Guanajuato), Septiembre 20 de 1889 (С. G. Pringle, 2815).

Æschynomene amorphoides, Rose in litt.

(=Brya (?) amorphoides, Warson) in hb. Pringle.

Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 4613).

Æschynomene fascicularis, Ch. et Schl. in Linnæa v. p. 584. Lugares arenosos, cerca de la Barranca (Est. de Jalisco), Septiembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3832).

Æschynomene glandulosa, Poir. Suppl. iv. p. 76.

Llano de Mexicalcingo (Est. de Jalisco), Octubre de 1876 (M. Bárcena, 153).

Æschynomene hispida, Willb. Sp. Pl. iii. p. 1163.

Æschynomene ciliata, Vog.

Llanuras húmedas, Magdalena (Est. de Jalisco), Octubre 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4556 y 5181).

Æschynomene hispidula, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 530.

N. V. *Ixqualuite*, usada para la mordedura de las víboras. Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro).

Æschynomene petræa, Rob. in hb. Pringle.

Cerros cerca de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 24 de 1893 (C. G. Pringle, 4386 y 5147).

Stylosanthes dissitiflora, Rob. et Sea, n. sp. in fib. Pringle. En la arena granftica de los cerros, cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Septiembre 19 de 1893 (C. G. Pringle, 4540 y 5172).

Stylosanthes mucronata, Willd. in Proc. Am. Acad. xvii. p. 344.

Montes de S. Miguelito, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 800).

Zornia diphylla, Pers. Syn. n. p. 318; Benth. in Mart. Fl. Bras. xv. p. 80, tt. 1, 2.

Zornia lævis, Cu. et Schl. in Linnæa v. p. 582.

Zornia thymifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 514.

Zornia pubescens, H. B. K. loc. cit. p. 515.

Zornia reticulata, SM. &. &.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 805); Atemajac, Valle de Guadalajara, Septiembre 21 de 1886 (M. Bárcena, 30; Llanos de Belén (Est. de Jalisco), Septiembre 24 de 1886 (M. Bárcena, 38); Llanuras arenosas, cerca de Chihuahua, Octubre de 1886 (C. G. Pringle, 726).

Desmodium amans, Warson, n. sp. in hb. Pringle.

Cerros, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Octubre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3291); Cerros, arriba de Oaxaca, a 5,500 piés, Septiembre de 1894 (C. G. Pringle, 4993).

Desmodium asperum, Desv. in hb. Pringle.

De 8-10 piés de altura, leñoso hacia abajo.

En las cuestas, Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 29 de 1893 (C. G. Pringle, 4609).

Desmodium guadalajaranum, Watson, n. sp. in bb. Pringle. De 3-6 piés de altura. En las laderas secas, cerca de Guadalajara (Est. De Jalisco), Septiembre 30 de 1891 (C. G. Pringle, 3875).

Desmodium gramineum, GRAY in hb. Pringle.

En bancos secos, cerca de Guadalajara, Septiembre 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3836).

Desmodium hartwegianum, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. r. p. 279.

Cerros calizos, Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4780).

Desmodium jaliscanum, WATSON.

var. obtusum, B. L. Rob. n. var.

De 5-10 piés. En Sitios pedregosos, Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosi), Octubre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3290); Cañadas cerca de Guadalajara, Octubre 8 de 1891 (C. G. Pringle, 3859); Sierra de S. Felipe, á 8,000 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4983).

Desmodium lindheimeri, A. Gray in hb. Pringle.

Volcán del Nevado (Est. DE Colima), Septiembre 24 de 1886

(M. Bárcena, 450); Montañas cerca de Cárdenas (Est. DE S. Luis Porosí), Agosto y Octubre de 1890 (C. G. Pringle, 3289).

Desmodium linearifolium, DC. Prodr. II. p. 327.

Barranca, Las Canoas (Esr. de S. Luis Porosf), Agosto 22 de 1891 (C. G. Pringle, 5013).

Desmodium macrostachyum, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. 3, p. 44.

En las laderas, Tequila (Est. DE Jalisco), Septiembre 29 de 1893 (C. G. Pringle, 4611).

Desmodium molliculum, DC. Prodr. II. p. 331. Hedysarum molliculum, H. B. K.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 798).

Desmodium orbiculare, Schl. in Linnæa xii. p. 311.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 799); Cañadas pedregosas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3139); Cuestas pedregosas, cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Octubre 1.º de 1891 (C. G. Pringle, 3877).

Desmodium plectocarpum, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. 3, p. 46. En los cerros, Las Canoas (Est. de S. Luis Porosi), Agosto 29 de 1891 (C. G. Pringle, 3903).

Desmodium psilophyllum, Schl. in Linnæa xii. p. 310.

De 2-3 piés, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porosí), Septiembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3561).

Desmodium scorpiurus, Desv. Journ. Bot. m. p. 122.

Cerros de Guadalajara (Est. de Jalisco), Mayo 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4737).

Desmodium spirale, DC. Prodr. II. p. 333.

Valle de Guadalajara, Octubre de 1886 (M. Bárcena, 182). var. transversum, Rob. et Greenm, n. sp. in hb. Pringle.

Cuestas, cerca de Guadalajara, Septiembre 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4522); Bancos húmedos, Barranca cerca de Guada lajara, Octubre 3 de 1891 (C. G. Pringle, 3882); Cerros calizos y secos, Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4867).

Desmodium strobilaceum, Schl. in Linnæa xh. p. 316. Las Canoas (Est. de S. Luis Porosf), Octubre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3673).

Desmodium subspicatum, Watson, n. sp. in hb. Pringle.

Cuestas cespitosas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 16 de 1890 (C. G. Pringle, 3211).

Desmodium tortuosum, DC. Prodr. n. p. 332; Sloane, Hist. Jamaica I. t. 116, fig. g.

(=D. stipulaceum, DC.)

Cerros secos, cerca de Guadalajara, Octubre 9 de 1891 (C. G. Pringle, 3878).

Desmodium sp.

Valle de Ahualulco (Est. De Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Barcena, 622).

TRIBUS VII. VICIEÆ.

Vicia americana, Linn. Sp. Pl.

Sierra Madre, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 16 de 1888 (C. G. Pringle,)

Vicia mexicana, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. 3, p. 47.

Campos de Toluca (Est. de México), Agosto 18 de 1892 (C. G. Pringle, 5321).

Vicia pulchella, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 499, t. 583.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 823); Barranca del Salto, Amecameca (Est. de México), Agosto de 1881 (M. Urbina).

Lathyrus parvifolius, Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. p. 343. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 812); Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 19 de 1892 (C. G. Pringle, 5280).

TRIBUS VIII. PHASEOLEÆ.

Clitoria? sericea, Watson in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara (Esr. de Jalisco), Junio y Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4449).

Clitoria triflora, WATSON in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4450).

Cologania hirta, Rose.

Planta voluble, de 4 piés, bajo los robles. Sierra de S. Felipe,

á 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4793).

Cologania jaliscana, Watson, n. sp. in hb. Pringle.

En las cuestas, cerca de Guadalajara, Julio 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2788).

Cologania procumbens, Humb. et Bonpl. Pl. Seg. t. 57; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 412.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Junio 21 de 1893 (C. G. Priugle, 4401).

Cologania pulchella, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 413.

Cologania ovalifolia, H. B. K.

Galuctia? purpurea, MART. et GAL.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 804); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M Bárcena, 625), var. racemosa, Rob. n. var.

Barranca de Guadalajara, Septiembre 8 de 1893 (C. G. Pringle, 5516).

Teramnus uncinatus, Sw. Fl. Ind. Occ. III. p. 1238, t. 25.

Glycine discolor, Mart. et Gal.

?Glycine elliptica, Mart. et Gal.

Cerros, Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 28 de 1893 (C. G. Pringle, 5521).

Erythryna coralloides, DC. Prodr. n. p. 413; Calq. des Dess. F1. Mex. 253.

N. V. Colorin, Pitos.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 96).

Erythryna longipes, DC. Prodr. n. p. 413; Calq. des Dess. Fl. Mex. 253.

Cerro de Coatepec (VALLE DE MÉXICO), Marzo de 1883 (M. Urbina).

Erythryna setosa, Marr. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. pars. 2, p. 194.

Bancos secos, Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Junio 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4687).

Erythryna sp.

Flor roja, fruto espinoso.

Volcán del Nevado (Est. de Colima), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 459).

Erythryna sp.

Árbol de flor roja.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 617).

Mucuna urens, DC. Prodr. II. p. 405.

Dolichos urens, Jaco. Amer. t. 182, fig. 84.

N. V. Pica-pica.

Usados los pelos del fruto contra las lombrices.

Chorrera del Bobo, Cempoala (Est. de Veracruz), Enero 9 de 1891 (M. Villada).

Calopogonium galactoides, Benth. in Benth. et Hooker Gen. Pl. 1. p. 534.

Stenolobium galactoides, Benth. in Ann. Wien. Mus. H. p. 125.

Galactia hispidula, Bentii.

Tamasopo (Est. de S. Luis Potosf), Diciembre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 5096); Bancos secos, cerca de Orizaba, á 4,000 piés (Est. de Veracruz), Enero 18 de 1895 (C. G. Pringle, 6096).

Galactia multiflora, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, eerca de Tequila (Est. de Jalisco), Julio 1.º y Septiembre 24 de 1893 (C. G. Pringle, 4433); Faldas de la Sierra de S. Felipe, á 6,500 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 28 de 1894 (C. G. Pringle, 4667).

Galactia tenuiflora, Willd. ex Wight. et Arn. Prodr. Fl. Ind. p. 206.

Galactia filiformis, Bent.

Galactia brevistyla, Schl.

Galactia pilosa, Nutt.

Cerros, Tequila (Est. DE Jalisco), Septiembre 27 de 1893 (C. G. Pringle, 5527).

Canavalia villosa, Benth. Ann. Wien. Mus. n. p. 135.

Canavalia rostrata, Bentil.

Canavalia multiflora, Hook. et Arn.

Wenderothia discolor, SCHL.

Planta perenne y trepadora.

N. V. Gallinitas: flor color de rosa y aromática.

Falle de Abualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Barcena, 612); Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosl), Junio de 1892 (M. Villada); Sierras, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 9 de 1888 (C. G. Pringle, 2274).

Phaseolus acutifolius, GRAY, Pl. Wright. 1. p. 43.

Cerros, Tequila (Est. DE JALISCO), Septiembre 23 de 1893 (C. G. Pringle,)

Phaseolus anisotrichus, Schl. in Linnæa, xn. p. 326.

En bancos sombreados, cerca de Guadalajara, Septiembre de 1893 (C. G. Pringle, 4544).

Phaseolus heterophyllus, Willb. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 446.

Phaseolus parviflorus, Schl.

N. V. Chichimecatl, & Chichimecapatl.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 811); La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 26).

Phaseolus multiflorus, Willo. Sp. Pl. p. 1030.

N. V. Frijol de monte, Mex. Ayacotl.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 824).

Phaseolus retusus, Benth. Pl. Hartw. p. 11. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 825).

Phaseolus truxillensis, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. vi. p. 451.

Phaseolus adenantius, Mev. Prim. F1. Esseq. p. 239; DC.

Prodr. II. p. 394.

Phascolus cirrhosus, H. B. K.

Phaseolus amænus, Mac Fad.

En los bosques, Tequila (Est. DE JALISCO), Septiembre 22 de 1893 (C. G. Pringle, 4615).

Phaseolus sp.

Hacienda de la Guiñada (VALLE DE MÉXICO), Septiembre 23 de 1888 (F. Altamirano).

Phaseolus sp.

N. V. Frijol de ratón.

Valle de Ahualuleo (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 615).

Minkerlesia biflora, Hemst. Diag. Pl. Nov. pars. 3, p. 48; Biol. Centr. Am. Bot. 1. p. 308, t. xvi, fig. 1-7.

Cañadas cerca de Guadalajara, Septiembre de 1893 (C. G. Pringle,)

Vigna strobilophora, Rob. in hb. Pringle.

Tallos leñosos de una pulgada ó más de grueso, trepadores sobre las cimas de los arbustos y árboles.

Barranca, cerca de Guadalajara, Agosto 25 de 1893 (C. G. Pringle, 4503).

Rhynehosia caribæa, DC. Prodr. n. p. 384.

Glycine caribæa, JAco. Ic. Pl. Rar. t. 146.

Cerros de Guadalajara (Est. de Jalisco), Agosto 25 de 1893 (C. G. Pringle, 5519).

Rhynchosia longeracemosa, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. pars. 2, p. 198.

Atemajac, Valle de Guadalajara, Septiembre 21 de 1886 (M. Bárcena, 31); Sierra Madre, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Agosto 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2080).

Rhynchosia macrocarpa, Bentu. Pl. Hartw. p. 11.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 826).

Rhynchosia minima, DC. Prodr. II. p. 385; Benth. in Mart. Fl. Bras. xxiv. t. 54, fig. 2.

¿Rhynchosia punctata, DC.

Rhynchosia mexicana, Hook. et Arn.

Glicine lamarckii, H. B. K.

Cerros, cerca de Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 22 de 1893 (C. G. Pringle, 4604).

Rhynchosia phaseoloides, DC. Prodr. n. p. 385.

N. V. Negritos: la semilla, del tamaño de un arbejón, presenta la mitad colorada y la otra negra.

N. V. Peonía, en Guadalajara.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 827); Valle de Ahualulco (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 023). Planta trepadora de 5-10 piés. En los bosques de Tequila (Est. DE JALISCO), Septiembre 25 de 1893 (C. G. Pringle, 4597).

Rhynchosia pringlei, Rose, n. sp.

De 3 á 5 piés. Cerros calizos y secos, Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 15 de 1894 (C. G. Pringle, 4900).

Rhynchosia texana, Torr. et Gray. in hb. Pringle.

Valle de Ortíz (Est. de Спичаниа), Mayo 26 de 1888 (С. G. Pringle, 3039)

Rhynchosia sp.

N. V. Pegarropa de pared.

Cerro de la Guiñada (Valle de México), Septiembre 23 de 1888 (F. Altamirano).

Rhynchosia sp.

N. V. Peonia.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 623).

Rhynchosia sp.

Belén, Guadalajara, Septiembre 24 de 1886 (M. Barcena, 55).

Eriosema diffusum, G. Dox. Gen. Syst. n. p. 347.

Sierra de S. Estéban, cerca de Guadalajara, Septiembre 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3842).

Eriosema grandiflorum, Seen. Bot. Voy. "Herald," p. 345. Rhynchosia grandiflora, Cn. et Scul.

La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena, 126, 492 y 619); Pedregal de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 20 de 1893 (C. G. Pringle,)

Eriosema multiflorum, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, cerca de Tequila; de 2-3 piés (Est. de Ja-Lisco), Octubre 7 de 1893 (C. G. Pringle, 4548).

Eriosema palmeri, Warson in hb. Pringle.

Cuestas cespitosas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 16 de 1890 (C. G. Pringle, 3205).

Eriosema pulchellum, Don. Gen. Syst. п. р. 348.

Llanuras de Guadalajara, Mayo 25 de 1891 (C. G. Pringle, 3710).

TRIBUS IX. DALBERGIEÆ.

Piscidia erythrina, Linn. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. vi. Suppl. p. 116; Lamk. Illustr. t. 605.

De 30-40 piés, cerros calizos y pedregosos; Rascón (Est. DE S. Luis Potosí), Junio 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4110).

Tribus X. SOPHOREÆ.

Sophora secundiflora, Lag. Rev. Hort. ser. 4, m, p. 201, t. 11 Sophora speciosa, Benth. Virgilia secundiflora, CAV. Ic. t. 401.

Dermatophyllum speciosum, Scheele.

Broussonetia speciosa, ORT. Dec. 61, t. 7.

N. V. Patol.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada, 17); Cerros, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 3 de 1889 (C. G. Pringte, 3011).

Sophora sericea, Nutr. Gen. I. p. 280.

Valle de Río Grande (Est. de Chimuanua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle, 5366); Paso del Norte, Junio 8 de 1892 (C. G. Pringle, 5233).

Myroxylon pereiræ, Klotzsch. in Bonplandia, 1857, p. 274.

Myrospermum pereiræ, Royle.

N. V. Palo de Bátsamo.

Jalapa (R. Montes de Oca).

TRIBUS XIII. EUCÆSALPINIEÆ.

Cæsalpinia mexicana, A. Grav. in Proc. Am. Acad. v. p. 157.
Cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Julio 22 de 1888
(C. G. Pringle, 1908).

var. pubescens, Rob. et Greenm.

Cerros secos, Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 25 de 1893 (C. G. Pringle, 5466).

Cæsalpinia multiflora, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Un árbol de tamaño mediano. Cerros volcánicos, Paso de Monte León (Est. de Michoacán), Mayo 30 de 1891 (C. G. Pringle, 3730).

Cæsalpinia pulcherrima, Sw. Obs. p. 166.

Poinciana pulcherrima, Linn. Sp. Pl. p. 554; Bot. Mag. t. 995. N. V. Tabachin, Flor del camarón.

Cerca de la Gruta de Cacahuamilpa (Esr. de Guerrero), Enero de 1886 (M. Villada).

Cæsalpinia sp.

N. V. Brasil.

Jalapa (Est. de Veracruz), (R. Montes de Oca).

Hoffmanseggia jamesii, Torr. et Gray in hb. Pringle.

Llanos, Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosí), Mayo 15 de 1891 (C. G. Pringle,)

Hoffmanseggia stricta, Benth. in A. Gray. Pl. Wright. I. p. 56.

N. V. Camote de ratón.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 832).

Parkinsonia aculeata, Linn. Hort. Cliff. p. 147, t. 13. Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel): S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 87).

TRIBUS XIV. CASSIEÆ.

Cassia absus, Linn.

Cuestas, Tequila (Est. de Jalisco), Septicmbre 29 de 1893 (C. G. Pringle, 4605).

Cassia bacillaris, Linn. fil. Suppl. p. 231; Fl. Bras. t. 31; Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. t. 62.

Cassia puberula, H. B. K.

Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Julio 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 5441).

Cassia bicapsularis, Linn. Sp. Pl. p. 538; Benth, in Trans. Linn. Soc. XXVII. p. 525.

Cassia ovalifolia, MART. et GAL.

Cassia alcaparillo, H. B. K.

Cassia sennoides, JACQ. Ic. Pl. Rar. t. 170.

N. V. Bricho.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bârcena, 609); Octubre 3 de 1886 (M. Bârcena, 302); Bosques fértiles en Micos (Est. DE S. Luis Potosi), Noviembre 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3926).

Cassia biflora, Linn. Sp. Pl. p. 540; Bot. Mag. t. 810; Bot. Reg. t. 1310.

Cassia acapulcensis, H. B. K.

Cassia geminiflora, Moc. et Sessè.

Cassia xiphoides, BERTOL.

La Barranca (Est. De Jalisco), Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena, 127); Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 23 de 1891 (C. G. Pringle, 4034).

Вот-18.

Cassia crotalarioides, Kuntii. Mim. p. 132, t. 40.

Llanuras, Estación de la Honda (Est. de Zacatecas), Agosto 18 de 1890 (C. G. Pringle, 3154).

Cassia emarginata, Linn. Sp. Pl. p. 538; Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. p. 548.

Cassia canescens, y C. elliptica, H. B. K.

En sitios agrestes, Barranca de Atenquique (Est. de Jalisco). Arbol pequeño, Junio 10 de 1893 (C. G. Pringle, 4408).

Cassia fistula, Linn. Sp. Pl. p. 540; Bentil, in Trans. Linn. Soc. xxvii. p. 514.

Cassia fistuloides, Collad. Hist. Cass. t. 1.

N. V. Cañafistula.

Soconusco (Est. de Chiapas), 1883 (R. Montes de Oca).

Cassia leptocarpa, Bentil. in Linnæa, xxii. p. 528.

Cerca de las corrientes, S. Luis Potosí, Agosto 27 de 1891 (C. G. Pringle, 4030).

Cassia multiflora, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 2, p. 307.

De 5 at 12 pies. Cerros cerca de Oaxaca, de 5,500 at 6,000 pies,

Noviembre de 1894 (C. G. Pringle, 4883).

Cassia occidentalis, Linx. Sp. Pl. p. 539; Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. p. 532; Bot. Reg. t. 83.

N. V. Bricho. Caracteriza terrenos de labor fértiles.

Sta. Cruz, Valle de Túxpan (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 356); Valle de Tonila (Est. de Jalisco) (M. Bárcena, 169); Rascón (Est. de S. Lus Potosf), Junio 17 de 1892 (C. G. Pringle, 5286); Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 29 de 1893 (C. G. Pringle,)

Cassia palmeri, Warson in hb. Pringle.

Cerros, cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Julio y Agosto de 1893 (C. G. Pringle, 5418).

Cassia polyantha, Moc. et Sessè in Collad. Hist. Cass. p. 112, t. 2.

Cassia browniana, Kuntu. Mim. t. 41.

Grande arbusto ó pequeño árbol.

Cerros volcánicos, Paso Monte León (Est. de Michoacán), Mayo 30 de 1891 (C. G. Pringle, 3731); De 10 á 15 piés, Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Agosto 15 de 1894 (C. G. Pringle, 4792).

Cassia rotundifolia, Pers. Syn. I. p. 456; Benth. in Trans. Linn. Soc. xxvii. p. 570.

var. bauhiniæfolia, Kunth. Mim. t. 57 (species).

Cassia fabaginæfolia, H. B. K.

Llano de Belén, Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 39 y 169).

Cassia sericea, Swartz. Fl. Ind. Occ. p. 724; Benth in Trans. Linn, Soc. xxvii. p. 536

En terrenos bajos, Rascón (Est. DE S. Luis Potosi), Junio 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4103).

Cassia tomentosa, Linn. fil. Suppl. p. 231.

Cassia multiglandulosa, JAcq. Ic. Rar. 1. t. 72.

N. V. Retama de tierra caliente.

Cacahuamilpa (Est. de Guerrero), Enero de 1886 (M. Villada). Cassia sp.

N. V. Retama de tierra caliente.

Cacahuamilpa (Est. de Guerrero), Enero de 1886 (M. Villada). Cassia sp.

Cerro del Borrego (Orizaba), Marzo de 1891 (P. Toro).

Cassia sp.

Jalapa (Est. DE VERACRUZ), (R. Montes de Oca).

Cassia sp.

Ixtapalapan (Valle de México), Abril de 1886 (M. Urbina).

Cassia sp.

La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena, 104).

TRIBUS XV. BAUHINIEÆ.

Bauhinia dipetala, Hemst. Diag. Pt. Nov. pars. 3, p. 48; Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 337.

De 10 á 15 piés. Monte Albán, cerca de Oaxaca, Noviembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 50o5).

Bauhinia divaricata, Linn.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3104).

Bauhinia lunarioides, Zucc.

Sierra, cerca de Monterey (Est. DE NUEVO León), Mayo 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2529).

Bauhinia platypetala, Bentu. MS. in hb. Kew.

N. V. Timbre.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosi), Junio de 1892 (M. Villada); Cerros pedregosos y de boscaje. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3908).

Bauhinia pringlei, Watson in hb. Pringle.

Barranca, cerca de Guadalajara (Est. DE Jalisco), Noviembre 10 de 1892 (C. G. Pringle, 5239).

Bauhinia sp.

Barranca de Metlac (Est. DE VERACRUZ), Junio de 1886 (J. Velasco).

TRIBUS XXI. ADENANTHEREÆ.

Prosopis juliflora, DC. Prodr. II. p. 447; BENTH. in Trans. Linn. Soc. xxx. p. 377.

Prosopis horrida, Kunth. Mim. t. 33.

Prosopis dulcis, Kunth. Mim. t. 34.

Prosopis domingensis, DC.

Algarobia dulcis, BENTH.

Algarobia glandulosa, Torr. et Gray.

N. V. Mezquite.

En las montañas, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 629).

TRIBUS XXII. EUMIMOSEÆ.

Mimosa acanthocarpa, Bentil. in Hook. Journ. Bot. iv. p. 409. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 624).

Mimosa berlandieri, Gray in Torr. Bot. Emory Exped. p. 61. En terrenos bajos, Micos (Est. de S. Luis Potosí), Julio 28 de 1891 (C. G. Pringle, 3798).

Mimosa biuncifera, BENTH. Pl. Hartw. p. 12.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 623); S. Francisco Acuautla (Est. de México), á 2,250 m. Abril 28 de 1890 (F. Altamirano).

Mimosa distachya, CAV. Ic. III. p. 48, t. 295.

De 3 á 5 piés. Cañón de Tomellín, á 2,500 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4635).

Mimosa fasciculata, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. p. 88. Acacia fasciculata, Kunth Mim. t. 23.

Cerros, cerca de Guadalajara, Julio 20 y Noviembre 2 de 1893 (C. G. Pringle, 4459).

Mimosa floribunda, Willd. Sp. Pl. iv. p. 1031; Hook Ic. Pl. t.

Mimosa racemosa, Sciil.

Terrenos bajos, Hac. de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosf), Diciembre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3970).

Mimosa leucænoides, Bentil. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. p. 89.

De 10 á 15 piés de altura.

En capas calizas, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3750).

Mimosa malacophylla, Gray, Pl. Lindh. II. p. 182, in adnot. Valle de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 9 y Julio 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2685).

Mimosa monancistra, Bentil Pl. Hartw. p. 12.

De 3 á 5 piés de altura.

Valle de Lerma (Est. de Michoacán), Mayo 30 de 1891 (C. G. Pringle, 3733).

Mimosa prolifica, Warson in hb. Pringle.

Cañadas, eerca de Chihuahua, Mayo 4 de 1887 (C. G. Pringle, 1594).

Mimosa tequilana, Watson in hb. Pringle.

Faldas de las montañas, Tequila (Est. DE Jalisco), Septiembre 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4596).

Mimosa zygophylla, Benth. in Gray. Pl. Wright. 1. p. 61. De 1 á 3 piés de altura.

Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Mayo 10 y Julio 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3703).

Mimosa sp.

Mineral de Guadaleázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

Mimosa sp.

Soconusco (Est. de Chiapas), 1883 (R. Montes de Oca).

Schrankia aculeata, Willd. Sp. Pl. Iv. p. 1041; Reliq. Houst. t. 25. Suelo delgado y arenoso, cerca de Guadalajara, Julio 15 y Agosto 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4453).

Вот.-19.

Schrankia distachya, DC. Prodr. n. p. 443; Calq. des Dess. Fl. Mex. 211.

Bancos húmedos, cerca de Guadalajara, Julio 27 de 1893 (C. G. Pringle, 4454).

Leucæna diversifolia, Bentu, in Hook, Journ. Bot. iv. p. 417.

Acacia diversifolia, Sciil.

Acacia trichandra, Zucc.

De 15 piés. Faldas de la Sierra de S. Felipe, á 6,000 piés. Diciembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4656).

Leucæna esculenta, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. p. 442. Acacia esculenta, DC. Calq. des. Dess. Fl. Mex. 209.

N. V. Guaje, Mex. Hoatzin.

Valle de México, Octubre de 1891 (M. Urbina). De 20 á 50 piés. Cerros, Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 18 de 1893 (C. G. Pringle, 4534).

Leucæna macrophylla, Benth. Bot. Voy. Sulphur. p. 90.

Barranea, cerca de Guadalajara, Septiembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3846).

Leucæna pulverulenta, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. p. 417.

Acacia pulverulenta, Schl.

En la Sierra, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 28 de 1888 (C. G. Pringle, 2570).

TRIBUS XXIII. ACACIEÆ.

Acacia cochliacantha, H. B. K. in hb. Pringle.

(Forma sin espinas). Barranea cerca de Tequila (Est. de Ja-Lisco), Julio 4 de 1893 (C. G. Pringle, 4428).

Acacia constricta, Benth. in A. Gray. Pl. Wright. 1. p. 66.

Montañas de los Pozos, eerea de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 627); Llanuras, Boeas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 17 de 1891 (С. G. Pringle, 4008).

Acacia filicina, Willd. Sp. Pl. iv. p. 1072; Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. p. 532.

Acacia texensis, Torr. et Gray.

Acacia glabrata, elegans, hirsuta, cuspidata et stipellata, Schl.

Acacia elegans et insignis, MART. et GALL.

Acacia hartwegii, Bentii.

Acacia argulosa, Bertol.

Acacia chlorantha, Zucc.

Acacia umbellulifera, Kuntu. Mim. t. 31.

Valle de México, Agosto de 1881 (M. Urbina); Tallos postrados. Sitios pedregosos y húmedos, cerca de Guadalajara, Julio 27 de 1893 (C. G. Pringle, 4478 y 1770).

Acacia glandulifera, Warson n. sp. in hb. Pringle.

De 2 piés de altura. Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. DE COAHUILA), Mayo 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3697).

Acacia micrantha, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. p. 526. Montañas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 12 y Octubre 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3119).

Acacia pennatula, Bentu. in Hook London Journ. I. p. 390.

Inga pennatula, CH. et SCHL.

Cerros, cerca de Guadalajara, Mayo 26 de 1891 (C. G. Pringle, 4016).

Acacia pringlei, Rose n. sp.

Árbol de 20 á 30 piés de altura. Cañón de Tomellín, á 3,000 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre 22 de 1894 (C. G. Pringle, 6113).

Acacia riparia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 276.

Mimosa plana, Well. Fl. Flum. Ic. xi. t. 28?

N. V. Tlahmitol.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Volcán del Nevado de Colima (M. Bárcena, 453). Una especie de parra con tallos cuadrangulares, de 1 á 2 pulgadas de grueso, trepando sobre las copas de los árboles. En los bosques bajos. Las Palmas (Est. de S. Luis Porosí), Julio 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3782).

Acacia spadicigera, Cn. et Scult. in Linnæa v. p. 594.

Un arbusto erguido, con pocas ramas tiesas. En lugares bajos, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 13 de 1891 (C. G. Pringle, 3691).

Acacia tequilana, Warson in hb. Pringle.

De 5 á 10 pies. En lugares cespitosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 28 de 1891 (C. G. Pringle, 3873).

TRIBUS XXIV. INGEÆ.

Lysiloma acapulcensis, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. 18. p. 83.

Cerros, cerca de Guadalajara, Mayo 26 de 1891 (C. G. Pringle, 4017).

Lysiloma microphylla, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. III. p. 83.

Un arbusto de copa aplanada, de 10 á 12 piés.

Cerros volcánicos, Paso de Monte León (Est. de Michoacán), Mayo 29 de 1891 (C. G. Pringle, 3732), Noviembre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 4342).

Calliandra conferta, Benth. in A. Gray. Pl. Wright I. p. 63. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 626).

Calliandra cumingii, Bentii, in Hook, Journ. Bot. 11. p. 140. Inga? speciosa, Mart. et Gal.

De 1 á 2 piés, Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 5,800 piés. Septiembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4889).

Calliandra gracilis, KLOTZSCH. in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, cerca del Lago Cuitzeo (Est. de Michoacáx), Agosto 9 de 1892 (C. G. Pringle, 4161); De 10 á 15 piés, cerros cerca de Oaxaca, á 5,500 piés. Agosto 15 de 1894 (C. G. Pringle, 4801).

Calliandra grandiflora, Bentu. in Hook. Journ. Bot. 11. p. 139. Calliandra kunthii. Bentu.

Inga anomala, Kunth. Mim. t. 22.

Acacia callistemon, Schl.

N. V. Pambotano; N. Mex. Tlacoxiloxochitl.

S. Francisco Acuautla (Est. de México), á 2,400 m. Abril 28 de 1890 (F. Altanirano); Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina); Volcán del Nevado de Colima (M. Bárcena, 452); Montañas, cerca del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Diciembre 9 de 1889 (C. G. Pringle, 2426).

Calliandra humilis, Bentu. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. p. 103.

Calliandra herbacea, Engelm.

Acacia humilis, Schl.

Cerros de Guadalajara, Julio 12 de 1893 (C. G. Pringle,)

Calliandra nitida, Watson in hb. Pringle.

De 1 á 3 pies de altura. Cerros pedregosos, eerca de Guadalajara, Mayo 2o de 1891 (C. G. Pringle, 3713).

Calliandra portoricensis, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. III. p. 99; Torr. Rep. Emory Exp. p. 61.

Mimosa portoricensis, Jacq. Ic. Rar. III. t. 633.

Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. DE VERACRUZ), Marzo de 1891 (P. Toro); Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosí), de 6 á 10 piés, Junio 6 de 1891 (C. G. Pringle, 3722); En las corrientes, Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3752).

Pithecolobium albicans, Benth in Trans. Linn. Soc. xxx. p. 592.

Acacia albicans, Kuntu. Mim. t. 27.

Calliandra pallens, Benth.

N. V. Huisache.

Valle de Ahualuleo (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 491).

Pithecolobium brevifolium, Bentu. in A. Gray. Pl. Wright. 1. p. 67.

Cerros cerca de Monterey (Est. De Nuevo León), Mayo 29 y Agosto 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2691).

Pithecolobium dulce, Bentil. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. p. 198.

Mimosa dulcis, RoxB. Coromand. Pl. 1. t. 99.

Acacia obliquifolia, MART. et GAL.

N. V. Huamuchil.

Valle de Ahualulco (Est. De JALISCO), (M. Bárcena, 611); Árbol de 20 á 30 piés. Valle de Oaxaca, á 5,000 piés. Noviembre 12 de 1894 (C. G. Pringle, 6049).

Pithecolobium (Chloroleucon) schaffneri, Warson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 352.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 628).

Pithecolobium sp.

N. V. Sinvergüenza.

Tenancingo (Est. DE México), Septiembre de 1884 (M. Villada).

Inga laurina, Willd. Sp. Pl. IV. p. 1018; Benth. in Trans. Linn. Soc. XXX. p. 607.

Вот.-20.

Mimosa fagifolia, Jaco. Stirp. Amer. t. 164. nec. Linn.
S. Márcos (Est. de Jalisco), Junio 4 de 1893 (C. G. Pringle, 5494).

Inga vera, Willd. Sp. Pl. iv. p. 1010.

Hac. de las Palmas (Est. de S. Luis Potosi), Junio 18 de 1892 (C. G. Pringle, 5257).

ORDO LXVI, ROSACEÆ.

TRIBUS II. PRUNEÆ.

Prunus capuli, Cav. in Spreng. Syst. II. p. 477; Schl. in Linnæn XIII. pp. 89, 404.

Cerasus capuli, SER. in DC. Prodr. H. p. 541.

Cerasus capollin, DC. II. p. 539; Zucc. Pl. Nov. Fasc. II. p. 37, t. 8.

N. V. Capulin.

Montes, cerca de S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 106).

Prunus salicifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 241, t. 563. Cañadas, Montañas de Mapula (Est. de Chimuanua), Abril 26 de 1887 (C. G. Pringle, 1460).

TRIBUS III. SPIRÆEÆ.

Spiræa discolor, Pursh. Fl. Am. Sept. I. p. 342; Maxim. Adnot. de Spiræeæ p. 150, sub. *Holodisco*.

Spiræa ariefolia, Sm. in Rees's Cycl. xxxiii. n. 16.

Spirwa dumosa, Nurr. ex Torr. in Bot. Stansbury's. Exped. Salt. Lak. p. 387. t. 4.

Spiræa fissa, Lindl. Bot. Reg. 1842, Misc. p. 1.

Spiraea argentea, Benth. Pl. Hartw. p. 82, nec. Mut.

Spiræa mexicana, Schiede in Reg. Ind. Sem. Hort. Petr. 1857.

var. dumosa, Watson Proc. Am. Acad. xvii. p. 353.

Montes de S. Rafael en S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 104).

TRIBUS IV. QUILLAJEÆ.

Vauquelinia corymbosa, Corr. in Humb. et Bonpl. Pl. Æquin. 1. p. 141, t. 40.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

Pterostemon mexicanus, Schauer in Linnæa, xx. p. 736.

De 6 a 10 piés, Capas calizas, Cañón de Las Hoyas, a 5,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 6027).

Lindleya mespiloides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vr. p. 240. t. 562 bis.

Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. DE COAHULA), Septiembre 14 de 1889 (С. G. Pringle, 2310), Mayo 29 de 1890 (С. G. Pringle, 3116).

TRIBUS V. RUBEÆ.

Rubus adenotrichus, Cu. et Schl. in Linnæa, xhl. p. 267; Focke. Batograph. Abhandl. p. 150.

Tallos ascendentes, hasta de 20 piés, sobre arbustos; fruto negro. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Junio 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4695).

Rubus occidentalis, Linn. Sp. Pl. p. 706; Focke Batograph. Abhandl. p. 147.

var. grandiflora, FOCKE.

Fruto ovoideo de una pulgada, rojo de sangre. Sierra de S. Felipe, á 9,500 piés (Est. de Oaxaca), Junio 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4686).

Rubus trilobus, Moc. et Sessè in DC. Prodr. n. p. 566; Calq. des Dess. Fl. Mex. p. 290.

Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. DE OAXACA), Junio 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4670).

Rubus trivialis, Michx. Fl. Bor. Am. 1. p. 296.

Rubus flagellaris, Hook. et Arn. nec. Willd.

Montes, cerca de S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 105).

TRIBUS VI. POTENTILLEÆ.

- Cercocarpus fothergilloides, H. B. K. Nov. Gcn. et Sp. vi. p. 233, t. 559.
 - De 25 piés. Cañón de La Hoya, á 5,500 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 6140).
- Cercocarpus parvifolius, Nutt. in Torr. &. Gray. Fl. N. Am. I. p. 427.
 - Cercocarpus betulæfolius, NUTT. in Hook. Ic. Pl. t. 322.

Cercocarpus betuloides, Torr. et Gray.

var. paucidentatus, Watson Proc. Am. Acad. xvii. p. 53.

Montes de S. Miguelito, en S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 114); Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Porosí), Junio de 1892 (M. Villada).

- Fallugia paradoxa, Endl. ex Torr. in Emory's Rep. p. 139. t. 2.
 Paso del Norte (Est. de Chimuanua), Abril 25 de 1893 (C. G.
 Pringle,.....)
- Fragaria mexicana, Schl. in Linnæa, xhi. p. 265.

Fragaria vesca, Linn.

En los bosques húmedos, montañas cerca de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Agosto 3 de 1892 (C. G. Pringle, 4160); Amecameca (Est. DE México), Julio de 1881 (M. Urbina).

- Potentilla candicans, Humb. et Bonpl., ex Nestl. Monog. Pot. p. 34, t. 3, fig. 2, et t. 4, fig. 2.
 - Potentilla lineariloba, Ser. in DC. Prodr. II. p. 582; Calq. des Dess. Fl. Mex. 298.

Potentilla humboldtiana, TRALL.

- N. V. Coanenepilli, Atlanchana; usada como astringente para las disenterias.
- En lugares arenosos y elevados, cerca de Toluca (Est. de México), Noviembre de 1885 (M. Urbina). var. nana, Nutt.
- Montañas arenosas, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 16 de 1892 (C. G. Pringle, 4176).

Potentilla hematochroa, Lehm. Add. ad Ind. Sem. Hort. Hamb. 1836, Collect. p. 6; Monog. Pot. p. 110; Knowle et Westc. Fl. Cab. III. t. 119.

Potentilla fusca, Schl. in Linnæa xin. p. 262.

Flor de María (Est. de México), Julio 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3615).

Potentilla ranunculoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 216; Nestl. Potent. p. 56, t. 3, fig. 1.

Potentilla macrorhisa, LEIM.

Lomas cespitosas y firfas, bajo los pinos. Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4220).

TRIBUS VII. POTERIEÆ.

Alchemilla hirsuta, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 224.

var. β. alpestris, Cham. et Schl.

Cerros cerca de Pátzcuaro (Est de Michoacáx), Noviembre 24 de 1891 (C. G. Pringle, 4005); Sierta de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 10 de 1894 (C. G. Pringle, 4934).

Alchemilla orbiculata, Ruz et Pav. Fl. Peruv. I. p. 68. Suelo húmedo. Sierra de Reyes, de 8-9,000 piés (Est. de O.y-NACA), Noviembre 9 de 1894 (C. G. Pringle, 6039).

Alchemilla pinnata, Ruz et Pav.

Suelo húmedo, en la cima del cráter del Nevado de Toluca, á 13,500 piés (Est. de México), Septiembre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4228).

Alchemilla sibbaldiæfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 225. t. 561.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 868). En el límite de la vegetación del volcán del Nevado de Colima, Septiembre de 1887 (M. Bárcena); Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 4935).

Alchemilla velutina, Warson, in Proc. Am. Acad. xviu. p. 354. Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 870).

Acæna elongata, Linn. Mant. p. 200.

Sierra de las Cruces, á 10,000 piés (Est. de México), Agosto 16 de 1892 (C. G. Pringle, 4179).

Tribus VIII. ROSEÆ.

Rosa montezumæ, Rep. Roses p. 55. t. 16.

Ixtapalapam (DISTRITO FEDERAL), Julio de 1882 (M. Villada; Acuautla, Bella vista, á 2,600 m. (Est. de México), Mayo 1.º de 1890 (F. Altamirano).

TRIBUS X. POMEÆ.

Cydonia vulgaris, Pers. Ench. 2. p. 40. N. V. *Membrillo*, planta naturalizada. Est. de Hidalgo (A. *Peñafiel*).

Cratægus sp.

N. V. Tejocote morado. Acuautla (Est. de México), Marzo 17 de 1890 (F. Altamirano).

Cotoneaster denticulata, H. B. K. Nov. Gen et Sp. vi. p. 214.

Nagelia denticulata, LINDL.

var. latifolia.

N. V. Membrillo cimarrón; Mex. Tlaxisqui.

Apasco (Valle de México), Noviembre 2 de 1890 (M. Villada).

ORDO LXVII. SAXIFRAGACEÆ.

TRIBUS I. SAXIFRAGEÆ.

Heuchera longipetala, Ser. Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 381.

Terrenos fríos, cerca de S. Felipe, a 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 21 de 1894 (C. G. Pringle, 4651).

Heuchera mexicana, Schaffn. in hb. Pringle.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 71); Peñas, Sierra de las Cruces (Est. DE México), Diciembre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 5342).

TRIBUS III. HYDRANGEÆ.

Deutzia mexicana, Hemst. Diag. Pl. Nov. pars. prima. p. 9; Biol. Cent. Am. Bot. i. p. 384.

Arbusto de 10 piés.

Montañas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3216); De 15 piés, Sierra de S. Felipe, a 3,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 20 de 1894 (C. G. Pringle, 4691).

TRIBUS VI. RIBESIEÆ,

Ribes jorullensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 61.

Ribes ciliatum, WILLD.

Ribes odoratum, Schl.

S. Francisco Acuautla (Est. de México), á 2,500 m. Mayo 1.º de 1890 (F. Altamirano); Cañadas húmedas del Nevado de Toluca, á 12,000 piés (Est. de México), Septiembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4255).

Ordo LXVIII. CRASSULACEÆ.

Tillæa angustifolia, Nurr. in Torr. et Gray Fl. N. Am. 1. p. 558. Cerca de Morales, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 126).

Cotyledon batesii, Hensl. Diaga. Pl. Nov. pars. prima, p. 9; Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 388, t. xix.

En la orilla del Río Hondo (Est. DE México), Septiembre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4287).

Cotyledon grayi, Baker in Ref. Bot. 1. sub. t. 71. n. 33.

Echeverria paniculata, GRAY Pl. Wright. 1. p. 76, in adnot.

En lugares arenosos, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 769); Llanuras alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Junio 27 de 1891 (C. G. Pringle, 3766).

Cotyledon parviflora, Hemst. Diag. Pl. Nov. pars. prima, p. 9; Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 391.

Montes de S. Miguelito, 1877 S. Luis Potosí (G. Schaffner, 775).

Cotyledon subrigida, Rob. et Sea n. sp. in hb. Pringle.

En la orilla del Cañón de Tultenango (Est. de México), Octubre 31 de 1892 (C. G. Pringle, 4326).

Sedum bourgæi, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. pars. prima, p. 11; Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 393, t. xx.

Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel); En lugares secos, cerros de Pátzcuaro (Est. DE ΜΙCHOΛΛΑΝ). Noviembre 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3344).

Sedum calcicola, Rob. et Greenm. n. sp.

Peñas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Octubre 20 de 1891 (C. G. Pringle, 5101).

Sedum ebracteatum, Moc. et Sessé ex DC. Mem. Crass. p. 37, t. 6, fig. B.

Montes Morales, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 774).

Sedum fuscum, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 1, p. 395.

Montes de S. Rafael, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 778).

Sedum guadalajaranum, Watson in. hb. Pringle.

Tenancingo (Est. de México), Septiembre de 1884 (M. Villada); Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); En sitios agrestes y fríos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Julio 11 de 1893 (C. G. Pringle, 4413).

Sedum Jaliscanum, Watson n. sp. in hb. Pringle.

En roeas con musgo. Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 11 de 1891.

Sedum liebmannianum, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars 1, p. 12; Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 396.

Cerca de S. Miguelito, en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 776).

Sedum madrense, Warson n. sp. in hb. Pringle.

Cerro del Pino, Ayotla (Est. de México), Noviembre 1.º de 1888 (M. Urbina); Sierra Madre (Est. de Chihuahua), Septiembre 27 de 1888 (C. G. Pringle,)

Sedum moranense, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 44; Biol. Cent. Am. Bot. i. p. 397.

Bancos y capas, Sierra de las Cruces (Est. DE México), Agosto 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4501).

Sedum pringlei, Watson n. sp. in hb. Pringle.

Sierra Madre (Est. de Chihuahua), Septiembre 23 de 1888 (C. G. Pringle,)

var? minor, Rob. et Sea n. var.

Terrenos estériles, Cima del Nevado de Toluca (Est. DE MÉXICO), Septiembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4240).

Sedum sp.

Atotonilco el Grande (Est. DE Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel). Sedum sp.

Cerro de Sta. Cruz, Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Enero de 1887 (M. Bárcena, 517).

Sedum sp.

Tenancingo (Est. de México), Septiembre de 1884 (M. Villada).

ORDO LXXII. HALORAGEÆ.

Callitriche austini, Engelm. ex Watson Proc. Am. Acad. xviii. p. 154.

Cerca de Morales, en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 123a in part.)

Callitriche heterophylla, Pursu. ex Watson Proc. Am. Acad. xviii. p. 154.

Cerca de Morales, en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 123^a in part.)

Callitriche verna, Linn. ex Watson Proc. Am. Acad. xviii. p. 155.

Cerca de Morales, en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 123b).

ORDO LXXIV. COMBRETACEÆ.

Sub-Ordo I. COMBRETEÆ.

Combretum farinosum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 110. N. V. Peinecillo. Cempoala (Est. de Veracruz), Enero 12 de 1881 (M. Villada).

Sub-Ordo II. GYROCARPEÆ.

Gyrocarpus jacquini, Roxb. Pl. Corom. 1. p. 2, t. 1.
Gyrocarpus americanus, Jac. Amer. p. 282, t. 178, fig. 80.
N. V. Palo hediondo.
Cacahuamilpa (Est. de Guerrero), Enero de 1892 (F. Allamirano).

ORDO LXXV. MIRTACEÆ.

TRIBUS III. MIRTEÆ.

Eugenia schiedeana, Scul. in Linnæa, XIII. p. 418. Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro); Terrenos bajos, Micos (Est. de S. Luis Potosi), Diciembre 8 de 1891 (C. G. Pringle, 3966).

ORDO LXXVI. MELASTOMACEÆ.

TRIBUS X. MICONIEÆ.

Conostegia xalapensis, Don. in Mem. Wern. Soc. iv. p. 317. Melasloma xalapensis, Bonpl. Melast. t. 54. N. V. Capulincillo ò nigua.

Barranca de Xico, ecrca de Huachinango (Est. de Puebla), Abril de 1889 (F. Altamirano); Arbusto de 5 á 15 piés de altura, Cañones de Montaña, Hac. de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), Diciembre 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3976).

Miconia sp.

Lomas de S. Sebastian cerea de Atasta (Est. de Tabasco), Febrero 1.º de 1888 (J. N. Rovirosa).

ORDO LXXVII. LYTHRARIEÆ.

TRIBUS I. AMMANIEÆ.

Rotala dentifera, Koenne in hb. Pringle.

Lugares húmedos cerca de Guadalajara, Noviembre de 1892 (C. G. Pringle, 4337).

TRIBUS II. LYTHREÆ.

Cuphea avigera, Rob. et Sea. n. sp. in hb. Pringle.

Bancos húmedos, montañas cerca del Lago de Chapala (Est. DE JALISCO), Noviembre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4349).

Cuphea æquipetala, CAV. Ic. t. 382, fig. 2.

Cuphea virgata, CAV. loc. cit. fig. 1.

Cuphea scabrida, H. B. K.

Cuphea floribunda, Lehm. nec. Hook.

Cuphea violacea, Regel.

Cuphea ocimoides, Decaisne.

Cuphea atrosanguinea, W.

Montes de S. Miguelito en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 722); Barranca de Río Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Pehafiel); Ajusco (Valle de México), Agosto 7 de 1881 (M. Urbina); (Valle de México), Junio 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2575).

Cuphea appendiculata, Benth. Pl. Hartw. p. 61.

Barranea de Metlae (Est. de Veraeruz), Mayo de 1881 (J. M. Velasco).

Cuphea bracteata, Hook et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 289, nec Lag.

Laderas, eerca de la Magdalena (Est. DE JALISCO), Octubre 11 de 1893 (C. G. Pringle, 4586).

Cuphea calcarata, BENTH. Pl. Hartw. p. 7.

Valle de Lerma, cerea de Guadalajara, Septiembre 18 de 1893 (C. G. Pringle, 4533).

Cuphea cyanea, Moc. et Sessé in DC. Prodr. m. p. 85; Calq. des Dess. Fl. Mex. 321.

Cuphea coccinea, DC.

Cuphea pubiflora, BENTIL.

Cuphea strigulosa, Lem. Fl. des Serres, i. t. 14; PAXT. Mag. Bot. xi. 241, nec H. B. K.

Cuphea strigillosa, Lindl. Bot. Reg. xxxII. t. 14.

Sierra de S. Felipe, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4674).

Cuphea hyssopifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 199.

Riveras arenosas, Micos (Est. de S. Luis Porosi), Julio 29 de 1891 (C. G. Pringle, 3797).

Cuphea lanceolata, Arr. Hort. Kew. ed. 2, nt. p. 605; Sweet. Brit. Fl. Gard. vn. t. 402, nec Bot. Mag. t. 4412.

Cuphea silenoides, NEES Bot. Mag t. 4362.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalco), 1872 (A. Peñafiel); En los Montes Morales (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 721); Belén, Guadalajara, Septiembre 24 de 1887 (M. Bárcena, 56); Tlalpam (Valle de México), Julio de 1889 (M. Urbina); Laderas cerca de Cárdenas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3918).

Cuphea liebmanni, Koehne in Fl. Bras. fasc. LXXIII. p. 231.

Bajo los peñaseos fríos, montañas eerca del Lago de Chapala (Est. DE Jalisco), Noviembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4355).

Cuphea mesochloa, Greene in hb. Pringle.

Entre las encinas. Cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoneán), Julio 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4141).

Cuphea micropetala, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vr. p. 207, t. 551.

Cuphea eminens, PL. et LINDL. Fl. des Serres t. 994.

Cuphea jorullensis, Bot. Mag. t. 5233, nec H. B. K.

Ajusco (Valle de México), Julio de 1878 (M. Urbina).

Cuphea procumbens, CAV. Ic. IV. p. 35, t. 380; Bot. Reg. t. 1981. Cuphea purpurea, Horr.

En los campos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 9 de 1892 (C. G. Pringle, 4265).

Cuphea palmeri, Warson in hb. Pringle.

Campos y laderas, Tequila (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1893 (C. G. Pringle, 4616).

Cuphea pringlei, Watsox in hb. Pringle.

Cañones cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Noviembre 17 de 1892 (C. G. Pringle, 5241).

Cuphea reipublicæ, Ros. et Sea n. sp. in hb. Pringle.

Junto à las corrientes cerca de Patzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 28 de 4892 (C. G. Pringle, 4142),

Cuphea retroscabra, Warson in hb. Pringle.

En las lomas húmedas, cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Julio 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4455).

Cuphea tolucana, PEYR? in hb. Pringle.

En las lomas secas, Cañada de Río Hondo (Est. de México), Agosto 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3147).

Cuphea sp.

Llanos del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro).

Cuphea sp.

Belén, Septiembre 24 de 1887 (M. Barcena, 56 y 57).

Lythrum album, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 193

Hac. de la Guiñada (VALLE DE MÉXICO), Septiembre 23 de 1888 (F. Altamirano); En terrenos bajos, cerca de Morelia (Est. DE MICHOACÁN), Julio 20 de 1892 (C. G. Pringle, 4122).

Lythrum gracile, Bentu. Pl. Hartw. p. 7.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 655); En los pantanos, cerca de la Capilla (Est. de Jalisco), Mayo 17 de 1890 (C. G. Pringle, 3113).

Lythrum kennedianum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 194. Ixtapalapam (Valle de México), Julio de 1884 (M. Urbina).

Lythrum maritimum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 194. Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro). Nesæa salicifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 192; Ноок. Ic. Pl. t. 54, B.

Heimia salicifolia, Link. et Otto in Link, Ie. t. t. 28. Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 654).

N. V. Granadillo.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Abril de 1887 (M. Barcena, 387 y 751); Valle de Monterey (Est. de Nuevo León), Agosto 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2651).

Lagerstræmia sp.

N. V. Astronómica, Atmosférica.

Cultivada en Tacubaya (VALLE DE MÉXICO), Junio de 1891 (M. Urbina).

Punica granatum, LINN.

N. V. Granado. Planta cultivada y naturalizada.

Tlalmanalco, á 2,400 m. (Est. de México), Mayo de 1890 (F. Altamirano).

ORDO LXXVIII. ONAGRARIEÆ.

Epilobium bonplandianum, Kuntu? in hb. Pringle.

En lugares frios de las montañas. Sierra de las Cruces (Est. DE México), Agosto 15 de 1892 (C. G. Pringle, 4182).

Epilobium mexicanum, DC. Prodr. 11. p. 41; Calq. des Dess. Fl. Mex. 379.

Escuela de Agricultura (Valle de México), Mayo 26 de 1882 (M. Urbina); Xico, Lago de Chalco (Valle de México), Agosto de 1888 (M. Urbina); Pátzeuaro (Est. de Michoacán), Julio 28 de 1892 (C. G. Pringle, 5271).

Jussiæa hirsuta, Prest. Reliq. Haenk. II. p. 34. Barranca de Metlac (Est. de Veracruz), Abril de 1882 (J. M.

Barranea de Metlac (Est. DE Veracruz), Abril de 1882 (J. M. Velasco).

Jussiæa repens, Linn. Mant. p. 381; DC. Prodr. III. p. 54. Jussiæa swartziana, DC. Escuela de Agricultura (VALLE DE MÉXICO), Abril de 1882 (M. Urbina).

Jussiæa suffruticosa, Linn. Sp. Pl. p. 555; DC. Prodr. III, pp. 57 y 58.

Jussica villosa, Lam. Dict. III. p. 331.

Jussiwa erecta, Linn. Sp. Pl. p. 556.

Cerca de los Morales en S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 174).

Jussiæa sp.

Belén (Guadalajara), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 61).

Jussiæa sp.

La Presa (Guadalajara), Octubre de 1887 *(M. Bárcena*, 162). Jussiæa sp.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), 1887 (M. Bárcena, 743, 744).

Ludwigia palustris, Ell. Sk. 1. p. 214; Torr. et Gray. Fl. N. Am. 1. p. 525.

Isnardia palustris, Linn. Sp. Pl. p. 175; DC. Prodr. III. p. 61. Cerca de Morales en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 127).

Œnothera cuprea, Schl. in Linnæa, xh. p. 269.

Sierra de S. Felipe, á 9-10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 23 de 1894 (C. G. Pringle, 4702).

Œnothera (Megapterium) dissecta, Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. p. 357.

En lugares arenosos, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 168).

CEnothera rosea, Air. Hort. Kew. II. p. 3; DC. Prodr. III. p. 51. N. V. Yerba del golpe.

Cerca de los Morales en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 170); Guadalajara, Marzo de 1887 (M. Bárcena, 212); Mineral de Guadaleázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

Enothera tetraptera, Cav. Ic. III. p. 40, t. 279; DC. Prodr. III. p. 50.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 169). Amecameca (Est. DE Mèxico), Julio de 1881 (M. Urbina); Atemajac (Est. DE JALISCO), Marzo de 1887 (M. Bárcena, 213); Mineral de Guadaleázar (Est. DE S. Luis Potosi), Julio de 1893 (M. Villada).

Fuchsia arborescens, Sims. (charac. amplif.); Hemsi., Diag. Pl. Nov. pars. 1, p. 13; Biol. Cent. Amer. Bot. 1, p. 456.

N. V. Don Diego de dia; Mex. Atexuchitl.

Temascaltepec y Hacienda de Luvianos (Esr. de México), Febrero de 1886 (M. Villada).

Fuchsia fulgens, DC. (charac. amplif.); HEMSL. Diag. Pl. Nov. pars. 1, p. 14; Biol. Cent. Am. Bot. 1, p. 457.

Sobre las paredes cubiertas de musgo, en los árboles viejos, etc., en bancos de lava, cerca de Patzeuaro (Est. de Michoacáx). Tallos blandos, leñosos, de 1 á 4 piés de altura, raíces tuberosas gruesas. Julio 14 de 1892 (C. G. Pringle, 4123).

Fuchsia microphylla, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 103, t. 504; Bot. Reg. t. 1260; Sweet. Fl. Gard. ser. 2, t. 16; Biol. Cent. Am. Bot. i. p. 458.

Entre Jaripeo y Agua fria (Est. De Michoacán), Diciembre de 1887 (M. Villada); En bordes 6 capas frias, Sierra de las Cruces (Est. De México), Octubre de 1892 (C. G. Pringle, 4314); Volcán del Nevado de Colima (M. Bárcena, 465).

Fuchsia parviflora, Zucc. non Lindl; Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. 1, p. 15; Biol. Cent. Am. Bot. 1, p. 460.

Volcán del Nevado de Colima (M. Bárcena, 466, 467); Bancos de lava de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4266).

Fuchsia pringlei, Rob et Sea, n. sp. in. hb. Pringle.

Bajo los pinos. Montañas cerca de Pátzenaro (Est. de Michoacán), Julio de 1892 (C. G. Pringle, 4140).

Hauya elegans, Moc. et Sesé (char. emend.); Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. 1, p. 13; Biol. Centr. Am. Bot. 1. p. 463 (t. xxix, fig. 1).

Zimapán (Est. de Hidalgo), (M. Barcena).

Lopezia angustifolia, Rob. n. sp. in. hb. Pringle.

De 2 á 4 piés de altura; blanda y leñosa hacia abajo. En capas calizas. Las Canoas (Esr. de S. Luis Porosí), Octubre 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3990).

Lopezia mexicana, Jacq. Ic. Rar. II. t. 3. Lopezia racemosa, Cav. Ic. t. 18.

Lopezia coronata, Andr. Rep. viii. t. 551?

Valle de México, Abril de 1881 (M. Urbina); Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), (M. Bárcena, 505); Cañón de Tultenango (Est. de México), Octubre 31 de 1892 (C. G. Pringle, 5310).

Lopezia pubescens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 96. El Gachupín (Est. de Jalisco) (M. Bârcena, 420). Cerros boscosos y secos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3953).

Lopezia pumila, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 95.

Montes cerca de San Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 640).

Tultenango (Est. de México), Octubre 31 de 1892 (C. G. Pringle, 5220).

Lopezia trichota, Schal. in. Linnæa vn. p. 273. Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 641).

Gaura coccinea, Nutt. in Torr. et Gray. Fl. N. Am. I. p. 73.

Gaura epilobioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 93.

Gaura suffrutescens, Ser. in DC. Prodr. III. p. 45; Calq. des
Dess. Fl. Mex. 374.

N. V. Linda tarde,

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 171); Guadalajara (М. Bárcena, 214); Paso de Carneros (Евт. DE Солнинд), Mayo 31 de 1890 (С. G. Pringle, 3105).

Gaura odorata, Sessé?

S. Ángel (VALLE DE MÉXICO), Abril de 1881 (M. Urbina).

Gaura sp.

Querétaro, Abril 20 de 1886 (M. Urbina).

ORDO LXXIX. SAMIDACEÆ.

TRIBUS I. CASEARIEÆ.

Casearia sp.

Motzorongo (Est. DE VERACRUZ), Abril de 1891 (F. Altamirano).

Tribus II. BANAREÆ.

Banara mexicana, Gray in Proc. Am. Acad. v. p. 174.

Arbusto de 15 à 20 piés. Terrenos bajos y forestales. Micos y
Tamasopo (Est. de S. Luis Porosf), Julio 31 y Diciembre 12
de 1891 (C. G. Pringle, 3799).

ORDO LXXX, LOASEÆ.

Cevallia sinuata, Lag. Nov. Gen. et Sp. p. 11, t. 1; Ноок. Ic. Pl. t. 252.

En el Valle, cerca de Ortíz (Еst. DE Сипианиа), Mayo 21 de 1887 (С. G. Pringle, 1590).

Sclerothrix fasciculata, Presl. Symb. Bot. 11. p. 3, t. 53.

Ancyrostemma micranthum, Poepp. et Enl. Nov. Gen. et Sp. III. p. 65, t. 262.

En la sombra de los peñascos, cerca de Tequila (Est. DE Ja-Lisco), Octubre de 1893 (C. G. Pringle, 4563).

Mentzelia bartonioides, Zucc.

En la pendiente de las rocas agrestes. Montes de Sta. Eulalia (Est. de Chihuahua), Septiembre de 1885 (C. G. Pringle, 520).

Mentzelia hispida, Willd. Sp. Pl. n. p. 1176; Bot. Mag. t. 3205.
Mentzelia stipitata, DC. Prodr. ni. p. 343; Calq. des Dess. Fl. Mex. 358; The Botanist. t. 34.

Mentzelia aspera, CAV. nec. Linn.

N. V. Pegajosa; la raíz es tuberosa.

Montes cerca de S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 110).

Barranca de Río Grande, cerca de Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

Mentzelia lobata, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 1. p. 472.

Eucnide lobata, GRAY Pl. Lindh. p. 192.

Microsperma lobata, Hook. Ic. Pl. t. 234.

Microsperma rudis, Schauer in Linnæa xx, p. 721?

Cañon de la Rinconada (Esr. de Nuevo León), Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 4335).

Mentzelia wrightii, GRAY in hb. Pringle.

Paso del Norte (Est. de Chinuahua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,.....)

Mentzelia sp.

N. V. Pegajosa.

La Barranca (Est. DE JALISCO), Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena, 125); Valle de Ahualulco (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 576).

ORDO LXXXI. TURNERACEÆ.

Turnera aphrodisiaca, L. F. Ward. Virginia. Medical Monthly. Abril, 1876.

N. V. Yerba del Venado. Damiana.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 166).

Turnera palmeri, Watson in hb. Pringle.

Llanuras arenosas de Guadalajara, Junio 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4405).

Turnera ulmifolia, Linn. Sp. Pl. p. 695.

var. surinamensis, Urban. in hb. Pringle.

Cerros cespitosos, cerca de Tequila (Est. DE Jalisco), Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4464).

ORDO LXXXII. PASSIFLORACEÆ.

TRIBUS II. PASSIFLOREÆ.

Passiflora bryonioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 140.

Pasiflora exudans, Zucc. in Abhandl. bayer Akad. Wiss. 11
p. 343.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 109).

Passiflora fœtida, Linn. Amæn. Acad. i. p. 288, t. 10.

Micos (Est. de S. Luis Potosi), Julio de 1891 (C. G. Pringle,....)

Passiflora inamœna, Gray Pl. Wright. H. p. 59.

Laderas húmedas, Guadalajara, Agosto 31 de 1893 (C. G. Pringle, 5463).

Passiflora liebmannii, Mast. in Fl. Bras. xm. pt. 1, p. 547.

Bancos del Río, S. Antonio, a 2,500 piés (Est. DE OAXACA). Septiembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 4847).

Passiflora mexicana, Juss. in Ann. Muss. vi. p. 108, t. 38, fig. 2. N. V. Itamo real.

Estado de México, Abril de 1889 (M. Urbina).

Passiflora tuberosa, Linn. Amæn. Acad. 1. p. 226; Jack. Hort. Vindob. t. 163.

Cerros de Cárdenas (Est. de S. Luís Porosí), Octubre 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3520); Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 14 de 1891 (C. G. Pringle, 5306).

Passiflora sp.

Tlalmanalco (Est. de México), Agosto de 1890 (M. Villada). Passiflora sp.

N. V. Pasionaria silvestre.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel). Passiflora sp.

N. V. Granada cimarrona.

S. Ángel (Valle de México), Abril de 1884 (M. Urbina).

ORDO LXXXIII. CUCURBITACEÆ.

SERIES I. PLAGIOSPERMEÆ. B. et H.

TRIBUS I. CUCUMERINEÆ.

Cucurbita sp.

N. V. Calabacilla venenosa.

Cerro colorado y S. Nicolás (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Schizocarpum filiforme, Schrab, in Linnea, vi. Litteratur-Bericht, p. 73.

Sitios agrestes y secos. Sierra de S. Felipe, à 7,000 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4980).

Schizocarpum parviflorum, Rob. et Greenm. n. sp. in hb. Pringle.

En el borde de los peñascos, barranea de Tequila (Est. DE IALISCO), Octubre 3 de 1893 (C. G. Pringle, 4553).

Apodanthera buræavi, Cogn. Diag. Cucurb. Nouv. fasc. n. p. 44.
Jalapa (Est. de Veracruz), Abril de 1880 (R. Montes de Oca).

Apodanthera pringlei, Wars. n. sp. in hb. Pringle.

Bancos obscuros, cerca de Guadalajara, Septiembre 18 de 1891 (C. G. Pringle, 4077).

Apodanthera undulata, Gray. Pl. Wright. H. p. 60. Valle Ortiz (Est. de Chimanua), Mayo 26 de 1888 (C. G. Pringle,)

Mazimowiczia lindheimeri, var. dissecta, Cognx. Cerros y llanos (Евт. DE Сишиапиа), Agosto 12 de 1885 (С. G. Pringle, 551).

SERIES II. ORTHOSPERMEÆ.

Tribus III. CYCLANTHEREÆ.

Echinocystis cirropedunculatus, Rose in hb. Pringle.
Bancos, Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 3 de 1893 (C. G. Pringle, 4562).

Echinocystis coulteri, Cogn. Diag. Cueurb. Nouv. fasc. u. p. 88. Elaterium? coulteri, A. Grav. Pl. Wrigth. u. p. 61. Echinopepon horridus, Naud. in Ann. Sc. Nat. ser. 5, vi. p. 19. Cubriendo los arbustos. Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 30 de 1893 (C. G. Pringle, 4563); Sierra de S. Felipe, a 7,500 piés (Est. de Oanaca), Octubre 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4958). Echinocystis floribunda, Cogx. Diag. Cucurb. Nouv. fasc. n. p. 89.

Valle de Oaxaca, á 5,200 piés, Septiembre 22 de 1894 C. G. Pringle, 4957).

Echinocystis pubescens, Coox. Diag Cucurb. Nouv. fasc. n. p. 88.

Elaterium pubescens, Benth. Pl. Hartw. p. 6.

Trepadora sobre las rocas, cerros volcánicos. Monte León (Est. de Місноаса́х), Noviembre 11 de 1892 (С. G. Pringle, 4346).

Cyclanthera langæi, Cogn. Diag. Cucurb. Nouv. fasc. H. p. 67.
Cañadas húmedas, Sierra de S. Felipe, [á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 21 de 1894 (C. G. Pringle, 6047).

Cyclanthera naudiniana, Cogn.

Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 4569).

Cyclanthera pringlei, Rob. et Sea, n. sp. in hb. Pringle.
Cerros pedregosos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacan.
(C. G. Pringle, 4317).

Cyclanthera ribiflora, Cogn. Diag. Cucurb. Nouv. fasc. II p. 63.
Bordes del río, cercanos á Orizaba (Est. de Verrarruz), á
4,000 pies. Enero 18 de 1895 (C. G. Pringle, 6090).

Elaterium carthaginense, Linn. Sp. Pl. p. 1375.

Barranca de Tepic (Est. de Jalisco), Octubre 11 de 1893 (C. G. Pringle, 5456).

SERIES III. CREMOSPERMEÆ.

TRIBUS IV. SICYOIDEÆ.

Sicyos angulatus, Linn. Sp. Pl. p. 1438. N. V. Chayotillo, Mex. Chichicamolli. Se dá en las milpas; los camotes se usan para layar. Calimaya (Est. de México), Octubre de 1884 (M. Urbina). Sechium edule, Sov. Fl. Ind. Occ. u. p. 1150.

Sechium chayota, Jacq. Amer. t. 163.

N. V. Chayole; á la raíz se le llama Camote de Chayote ó Chinchayote.

Atotonileo el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Penafiel).

Sicydium tamnifolium, Cogn? in hb. Pringle.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosf), Julio 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3093).

Sechiopsis triquetra, NAUD. in hb. Pringle.

Trepadora sobre arbustos. Tequila (Est. DE Jalisco), Septiembre 20 de 1893 (C. G. Pringle, 4561).

ORDO LXXXIV. BEGONIACEÆ.

Begonia crenatifolia, A. DC. Prodr. xv. pars. 1, p. 306.
Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4955).

Begonia franconis, Liebu. Mex. og. Cent. Am. Beg. p. 22.

Begonia parviflora, Liebn.

Volcán del Nevado (Est. DE Colma) (M. Bárcena, 473); En peñascos. Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosi), Junio 13 de 1890 (C. G. Pringle, 3100).

Begonia gracilis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vn. p. 184; DC. Prodr. xv. pars. 1, p. 310.

N. V. Carne de doncella.

Barranca del Salto, Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina); Bancos húmedos, cerca de Guadalajara, Agosto de 1893 (C. G. Pringle, 4504).

Begonia manicata, Brock ined. et Vis Orto di Padov 1842, p. 135.

Begonia schizolepis, et B. lepidota, Liebm.

Bordes y bancos húmedos, Barranca de Tepic (Est. de Ja-Lisco), Octubre 11 de 1893 (C. G. Pringle, 4553).

Begonia palmaris, A. DC. Prodr. xv. pars. 1, p. 307.

Begonia palmata, PAV. in hb. Boiss, nec Don. Con una raíz tuberosa; de 2 á 4 piés de altura. En suelo rico de sitios pedregosos y sombreados de la Barranca, cerca de Guadalajara, Julio 29 de 1893 (C. G. Pringle, 4474).

Begonia portillana, Warson in hb. Pringle.

Barranca (Est. DE Jalisco), Junio 27 de 1892 (C. G. Pringle 5277); Terrenos húmedos. Barranca, cerca de Guadalajara, à 3,500 pies, Julio 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4741).

ORDO LXXXVI. CACTEÆ.

· TRIBUS I. ECHINOCACTEÆ.

Mamillaria acanthophlegma, Liebm. Delect. Sem. Hamb. 1833; Pfeiff. Enum. p. 26.

Mamillaria recta, Mio. ex Labour. Cact. p. 63.

Mamillaria geminispina, DC. Rev. Cact. p. 30, t. 3.

Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Mayo 29 de 1890 (C. G. Pringle, 3118).

Echinocactus cornigerus, DC. Revue Cact. p. 36, t. 7; et Mem Cact. t. 10.

Mesas secas y arenosas, cerca de S. Luis Potosí, Septiembre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3270).

Cereus geometrizans, Mart. ex Pfeiff. Enum. p. 90. Cerros secos y pedregosos, Hacienda de Bocas (Est. de S. Luis Potosf). Mayo 13 de 1891 (C. G. Pringle, 3743).

TRIBUS II. OPUNTIEÆ.

Rhipsalis cassytha, Gærtn. Fruct. 1. p. 137, t. 28, fig. 1; Pfeiff. Enum. p. 133.

Cereus baccifera, Bor. Mag. t. 3080.

Sobre los árboles, en las selvas bajas (Est. de S. Luis Porosí), Julio 31 de 1891 (C. G. Pringle, 3892).

ORDO LXXXVII. FICOIDEÆ.

TRIBUS III. MOLLUGINEÆ.

- Mollugo verticillata, Linn. Sp. Pl. p. 131; A. Gray. Gen. Am. Bor. or. t. 101.
 - S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 118); Llanos (Est. de Cinhuanua), Agosto 23 de 1887 (C. G. Pringle,.....)

ORDO LXXXVIII. UMBELLIFERÆ.

TRIBUS I. HYDROCOTYLEÆ.

- Hydrocotyle bonariensis, Lam. Dict. nn. p. 147; DC. Prodr. vi. p. 60.
 - En las arenas. Veracruz, Abril 23 de 1895 (C. G. Pringle, 5554).
- Hydrocotyle mexicana, Cu. et Schl. in Linnæa v. p. 208.
 - Bosques húmedos. Sierra de Reyes, á 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 6036).
- Hydrocotyle verticillata, Thung. in hb. Pringle.
 - Lugares húmedos. Guadalajara, Mayo 6 de 1893 (C. G. Pringle,.....)
- Micropleura renifolia, Lag. Obs. Aparasol, p. 15; DC. Prodr. vi. p. 71.
 - Hydrocotyle? grumosa, DC. Prodr. vi. p. 70; Calq. des Dess. Fl. Mex. 426.
 - Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre de 1894 (C. G. Pringle, 4664).

TRIBUS III. SANICULEÆ.

- Eryngium bonplandii, Delar. Eryng. Hist. p. 52, t. 22.
 - En los bosques de pinos, á 10,000 piés. Nevado de Toluca (Est. DE México), Septiembre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4283).
- Eryngium bromeliæfolium, Delar. Eryng. Hist. p. 60, t. 28. De 5-8 piés. Sierra de S. Felipe, à 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 14 de 1894 (C. G. Pringle, 6045); Sierra de Reyes, à 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 9 de 1894 (C. G. Pringle, 6038).
- Eryngium carlinæ, Delar. Eryng. Hist. p. 53, t. 23.
 - En el suelo húmedo, cerca del Lago de Patzeuaro (Est. DE Michoacán), Julio 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4120).
- Eryngium comosum, Delar. Eryng. Hist. p. 30, t. 7.
 - Ajusco, Valle de México, Agosto 7 de 1881 (M. Urbina); Valle de México (Distrito Federal), Julio 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3203).
- Eryngium deppeanum, Cu. et Scul. in Linnæa v. p. 207.
 - En las laderas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3698); Praderas alcalinas, Hacienda de Angostura (Est. de S. Luis Potosi), Junio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3759).
- Eryngium ghiesbreghtii, Delar. (ubi publ.)
 - Sierra de S. Felipe, á 8,000 pies (Est. DE OAXACA), Noviembre 17 de 1894 (C. G. Pringle, 4746).
- Eryngium involucratum, Coult. et Rose. n. sp.
 - Sierra de S. Felipe, à 10,000 piés (Est. DE OANACA), Diciembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4747).
- Eryngium longirameum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. p. 171.
 - Cuesta de S. Juan del Estado, á 7,500 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 21 de 1894 (C. G. Pringle, 4910).
- Eryngium mexicanum, Watson, n. sp. in hb. Pringle.
 - Praderas humedas. Del Rio (Est. de Mexico), Agosto 30 de 1890 (C. G. Pringle, 3229).

Eryngium montanum, Coult. et Rose. n. sp.

Praderas húmedas. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 17 de 1894 (C. G. Pringle, 6040).

Eryngium nasturtiifolium, Juss. ex Delar. Eryng. Hist. p. 46, t. 17.

Lugares húmedos. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1891 (C. G. Pringle, 4098).

Eryngium phyteumatos, Delar. Eryng, Hist. p. 51, t. 21.

N. V. Yerba del sapo.

Potrero de la Garcesa (Valle de Toluca), Marzo de 1886 (M. Villada); Praderas húmedas, Flor de Maria (Est. de México), Agosto 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3180).

Eryngium protæflorum, Delar. Eryng. Hist. p. 62, t. 30.
Arriba del limite de los pinos, á 13,000 piés. Nevado de To-

Arriba del limite de los pinos, à 13,000 pies. Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4254).

Eryngium ranunculoides, Bexth. Pl. Hartw. p. 38.

Praderas húmedas (VALLE DE TOLUCA), Agosto 29 de 1892 (C. G. Pringle, 4217).

Eryngium scaposum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. p. 171. Sierra de S. Felipe, à 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 25 de 1891 (C. G. Pringle, 4834).

Eryngium serratum, Cav. Ic. vi. p. 36, t. 554.

Laderas. Cañada del Río Hondo (Est. de México), Agosto 23 de 1890 (C. G. Pringle, 2156).

Eryngium wrightii, A. Gray, Pl. Wright, 1, p. 78, 11, p. 65. Teoloyúcan (Est. de México), Agosto de 1886 (M. Urbina);

Lianuras de Guadalajara, Noviembre 15 de 1888 (C. G. Pringle, 2131).

Eryngium sp.

N. V. Yerba del sapo.

Barranca del Salto, Amecameca (Est. DE México), Agosto de 1881 (M. Urbina).

Eryngium sp.

Pedregal, Valle de México, Diciembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4359).

TRIBUS V. AMMINEÆ.

Conium maculatum, LINN. Sp. Pl.

N. V. Cicuta.

Pénjamo (Est. de Guanajuato), Abril de 1891 (A. Dugés).

Musenium alpinum, Coult. et Rose. n. sp. in hb. Pringle.

Lugares fríos de la cima. Nevado de Toluca, á 14,000 pies (Est. de Mêxico), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4247).

Arracacia acuminata, Benth. Pl. Hartw. p. 187.

Cerros. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 21 de 1891 (C. G. Pringle, 5016).

Arracacia atropurpurea, Bentil. et Hook. Gen. Pl. i. p. 885.

De 3 á 8 piés de altura. La madera es blanda en la parte inferior del arbusto. Montañas, cerca de Pátzcuaro (Евт. DE Місновся́х), Noviembre 23 de 1891 (С. G. Pringle, 3947).

Arracacia bracteata, Coult. et Rose, n. sp.

De 3 á 4 piés. Cañadas húmedas. Sierra de S. Felipe, á 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4675).

Arracacia filiformis, Coult. et Rose. n. sp.

Crestas pedregosas de la cima. Sierra de S. Felipe, à 10,560 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4714).

Arracacia mariana, Watson, n. sp. in hb. Pringle.

Sitios agrestes de Flor de Maria, Julio 31 de 1890; Praderas, Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 18 de 1892 (C. G. Pringle, 3480, 4198).

Arracacia multifida, Watson, n. sp. in hb. Pringle.

Bordes cespitosos. Rio Hondo (Est. de México), Septiembre 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3893).

Arracacia pringlei, Coult. et Rose. n. sp.

Crestas pedregosas de la cima. Sierra de S. Felipe, á 10,300 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4844).

Arracacia trifida, Coult. et Rose n. sp. in hb. Pringle.

Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 23 de 1892 (C. G. Pringle, 5210 y 4744).

Arracacia vaginata, Coult. et Rose n. sp.

Dc 1 á 3 piés. Límites de terrenos boscosos. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre de 1894 (C. G. Pringle, 6008).

Smyrnium ægopodioides, H. B. K. Nov. Gen. ct Sp. v. p. 16. Bosques de pinos. Cerros de Pátzeuaro (Est. de Michoacán), Octubre 25 de 1893 (C. G. Pringle, 4620).

Eulophus peucedanoides, Bentil. et Hook. Gen. Pl. 1. p. 885. Smyrnium? lineare, Bentil. Pl. Hartw. p. 83.

Cuidium peucedanoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 15.

Silaus? peucedanoides, DC. Prodr. iv. p. 161.

Sitios agrestes y fríos del Río Grande de Santiago (Est. de Jalisco), Octubre 5 de 1889 (C. G. Pringle, 2454).

Apium ammi, Urban.

Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 5546).

Apium leptophyllum, F. Mill. in Benth. Fl. Australiensis in. p. 332.

Helosciadium leptophyllum, DC. Prodr. iv. p. 105; Rcнв. Fl. Gcrm. t. 1860.

Ccrro de S. Cristóbal, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro); En lugares agrestes. Flor de María (Est. de México), Agosto 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3231).

Rhodosciadium dissectum, Coult. et Rose n. sp.

Cerros calizos y sccos. Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 2 de 1894 (C. G. Pringle, 4764).

Rhodosciadium glaucum, Rose n. sp.

Ccrros cerca de Oaxaca, á 6,000 piés, Noviembre de 1894 (C. G. Pringle, 4823).

Ammi visnaga, Lam.

Valle de Oaxaca, cerca de Etla, á 5,400 piés, Septiembre 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4855).

Вот.-27.

Sium angustifolium, Linn. Sp. Pl. p. 1672; DC. Prodr. iv. p. 125. Berula angustifolia, Kock.

Campos húmedos. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 10 de 1894 (C. G. Pringle, 5544).

Pimpinella mexicana, B. L. Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Cerros de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Noviembre 16 de 1890 (C. G. Pringle, 3331).

Osmorrhiza mexicana, Griseb, in hb. Pringle.

Sierra de S. Felipe, a 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 5547).

Oreomyrrhis andina, Endl. Gen. Pl. p. 787?

Myrrhis andina, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 419?
Creciendo entre los matorrales en la cima del Nevado de To-

luca, á 13,500 piés (Est. de México), Septiembre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4236).

Ottoa œnanthoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 20, t. 423.

Cimas de la Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4644).

TRIBUS VI. SESELINEÆ.

Fœniculum vulgare, GÆRTN.

N. V. Hinojo, Cultivada.

S. Joaquín (Valle de México), Agosto de 1881 (M. Urbina).

Œnanthe pringlei, Coult. et Rose n. sp.

Tallos rastreros sobre la superficie del limo: á lo largo de ellos brotan dos ó tres vástagos. En pantanos. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 25 de 1894 (C. G. Pringle, 6009).

Crantzia lineata, Nutt. Gen. Am. I. p. 178; DC. Prodr. IV. p. 71. Crantzia schaffneri, Schl. in Linnæa xxvi. p. 370.

Cerca del Río, Chihuahua, Marzo 28 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Siler trilobum, Scor.

Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Angelica pringlei, Coult. et Rose in hb. Pringle.

Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 12 de 1892 (C. G. Pringle,....)

Angelica nelsoni, Coult. et Rose n. sp.

Praderas húmedas. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 16 de 1894 (C. G. Pringle, 4996).

TRIBUS VII. PEUCEDANEÆ.

Peucedanum tolucense, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. 1, p. 570.

Ferula tolucensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. v. p. 12, t. 418.

Tlalmanalco (Est. de México), Agosto de 1890 (M. Villada).

TRIBUS VIII. CAUCALINEÆ.

Daucus montanus, Willip, in Schultz's Syst. vi. p. 482; Ref. Bot. t. 299.

Daucus toriloides, DC, Prodr. IV. p. 214.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Penafiel); Cerro de S. Cristóbal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro); Sierra de S. Felipe, a 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4884).

GENERA INCERTÆ SEDIS.

Prionosciadium madrense, Watson in hb. Pringle.

Tallos de un verde glauco, de 6 á 12 piés. Hojas biternadas y pinadas de 2 á 4 piés de ancho.

Bancos pedregosos del río. Salto de Juanacatián (Est. DE JALISCO), Octubre 6 de 1891 (C. G. Pringle, 3889).

Prionosciadium megacarpum, Coult. et Rose n. sp.

De 8 á 15 piés. Florece en Junio y fructifica en Octubre. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. De Oaxaca), Octubre 10 de 1894 (C. G. Pringle, 4688).

Prionosciadium mexicanum, Warson in hb. Pringle.

Tallos de 2 á 5 piés, pubescentes.

Sitios pedregosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3886).

var. acuminatum, Rob. n. var.

De 4 á 6 piés de altura.

Sitios agrestes de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3864).

Prionosciadium pringlei, Watson in hb. Pringle.

Tallos de 6 á 8 piés, de un verde glauco.

Praderas frías de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3868).

Prionosciadium watsoni, Coult. et Rose in hb. Pringle.

Capas calizas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 12 y Octubre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3822).

Coulterophitum laxum, Rob. in hb. Pringle.

Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Julio 6 de 1893 (C. G. Pringle, 3831).

Rhodosciadium pringlei, Watson n. gen. in hb. Pringle.

Lugares cespitosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3869).

Rhodosciadium tuberosum, Coult. et Rose n. sp.

En las praderas bajas (VALLE DE TOLUCA), Octubre 3 de 1892 (C. G. Pringle, 4295).

SPECIES NON SATIS NOTA.

Museniopsis cordata, Coult. et Rose n. sp.

Sierra de S. Felipe, a 7,500 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 25 de 1894 (C. G. Pringle, 5548).

Museniopsis scabrella, Coult. et Rose n. sp.

Sierra de S. Felipe, a 7,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 10 de 1894 (C. G. Pringle, 5550).

Museniopsis serrata, Coult. et Rose n. sp.

Rancho de Calderón (Est. DE OAXACA), Agosto 21 de 1894 (C. G. Pringle, 5542).

Neonelsonia ovata, Coult, et Rose n. gen.

De 2 á 3 piés. Bosques muy húmedos. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 6007).

Neogœzia gracilipes, Hemsl. in hb. Pringle.

Laderas de las montañas, arriba de Sta. Inés del Monte, á 8,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre de 1894 (C. G. Pringle, 4997).

Neogœzia minor, HEMSL. n. gen. in hb. Pringle.

Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés. Agosto 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4725).

Deanea nudicaulis, Coult. et Rose n. gen. in hb. Pringle. Sierra de S. Felipe, de 7,500-10,000 piés (Est. DE OANACA), Agosto 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4663).

ORDO LXXXIX. ARALIACEÆ.

Series I. ARALIEÆ.

Gilibertia arborea, Durand. Ind. Phan. p. 167.

Dendropanax arboreum, Pl. et Dec. in Rev. Hort. 1854, p. 107.

Hedera arborea, Sw. Fl. Ind. Occ. p. 518; DC. Prodr. iv. p. 262. Un árbol de tamaño mediano, con ramos verticilados; ramas tiernas con hojas 3-5 palmatilobadas; fruto negro.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3723).

SERIES III. PANACEÆ.

Aralia pubescens, DC. Hort. Monsp. 1813. p. 80; DC. Prodr. iv.

Un árbol pequeño de 15 á 20 piés; fructifica en Mayo.

Bancos de lava, cerca de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 13 de 1893 (C. G. Pringle, 4366); Barranca, 'cerca de Guadalajara, Septiembre 28 de 1891 (C. G. Pringle, 5144).

Вот.-28.

ORDO XC. CORNACEÆ.

Cornus disciflora, DC. Prodr. iv. p. 293; Calq. des Dess. Fl. Mex. 442.

Cornus grandis, Cu. et Schl. in Linnæa v. p. 171.

N. V. Xochilcorona.

Cerro de S. Cristóbal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro); Cerros pedregosos de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 8 de 1892 (C. G. Pringle, 4263).

Cornus excelsa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 3356.

De 15 á 20 piés, montañas cerea de Oaxaca, á 6,500 piés, Agosto 21 de 1894 (C. G. Pringle, 4825).

Cornus florida, Linn. Sp. Pl. p. 1661; DC. Prodr. iv. p. 273; Bot. Mag. t. 226.

Sierra Madre, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León). Agosto 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2409).

Cornus stricta, Lam. Dict. II. p. 116; DC. Prodr. IV. p. 272 (striata).

Tlalmanaleo, á 2,400 m. (Est. de México), Mayo de 1890 (F. Altamirano).

Garrya laurifolia, Harrw. in Benth. Pl. Hartw. p. 14.
Barrancas húmedas, cerea de Pátzcuaro (Est. de Michoacán),
Diciembre 22 de 1891 (C. G. Pringle, 3989).

Garrya macrophylla, HARTW. in Benth. Pl. Hartw. p. 50.

N. V. Chichiquahuitl, Quauhchichic, Zapotillo.

Tlalmanaleo, á 2,400 m. (EST. DE MÉXICO), Mayo de 1890; Desierto de Cuajimalpa (DISTRITO FEDERAL), Julio de 1890 (F. Altamirano); De Tultenango á Tulpetlac (EST. DE MÉXICO), Mayo de 1891 (M. Villada).

Garrya ovata, BENTH. Pl. Hartw. p. 14.

Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Septiembre 14 de 1889 (C. G. Pringle, 2806).

PHANEROGAMIA. - DICOTYLEDONES. - GAMOPETALÆ.

SERIES I. INFERÆ.

ORDO XCI. CAPRIFOLIACEÆ.

Tribus I. SAMBUCEÆ.

Sambueus mexicana, Prest. DC. Prodr. iv. p. 322.

N. V. Sauco, Mex. Xumetl.

Ixtapalucan, á 2,255 m. (Est. de México), Abril 28 de 1890 (F. Altamirano).

Viburnum microphyllum, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 3.

Oreinotinus microphyllus, Œrst. in Vidensk. Meddel. 1860 p.

293. Un arbusto de 15 ú 20 piés.

Cañadas, en la base del Nevado de Colima (Est. de Jalisco), Mayo 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4384).

TRIBUS II. LONICEREÆ.

Symphoricarpos microphyllus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 424; Bot. Mag. t. 4975.

Symphoricarpos glaucescens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. p. 424, t. 295.

Symphoricarpos montanus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. p. 425, t. 296.

Margaris barbigera, DC. Prodr. iv. p. 483; Calq. des Dess. Fl. Mex. 480.

N. V. Perlitas.

Hacienda de Acuautia, Cerro del Pino (Est. DE México), Noviembre 2 de 1888 (F. Altamirano); Volcán del Nevado de Colima (М. Ва́гсена, 429); Cerros de Pátzcuaro (Est. DE Міснодса́л), Octubre 11 de 1892 (С. G. Pringle, 4261).

Abelia coriacea, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. pars. 3, p. 53. Biol. Centr. Am Bot. 11. p. 4 (Fab. xxxvi. fig. 1-5).

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 32).

- Abelia floribunda, Dene. in Fl. des Serres n. t. 5; Bot. Mag. t. 4316.
 - Vesalea floribunda, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 1, p. 242.
 - Terrenos secos. Sierra de S. Felipe, de 8-10,000 pies (Est. de Oaxaca), Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4649).
- Lonicera pilosa, Willd. ex H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 427. Lonicera tubulosa, Benth. Pl. Hartw. p. 37.

Caprifolium pilosum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 427. t. 298.

Montes cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 733).

ORDO XCII. RUBIACEÆ.

TRIBUS I. NAUCLEEÆ.

Cephalanthus occidentalis, Linn. Sp. Pl. p. 138; Barton. Fl. in. t. 91.

Ozumba (Est. de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina).

TRIBUS II. CINCHONEÆ.

- Bouvardia leiantha, Bentii. Pl. Hartw. p. 85; Schl. in Linnæa xxvi. p. 78.
 - De 2 á 3 piés; flores de un rojo obscuro. Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4888).

Bouvardia myrtifolia, Schl. in Linnea xxvi. p. 121.

Sitios agrestes y eespitosos de las barrancas. S. Máreos (Est. DE JALISCO), Junio 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4388); Laderas eerca de Guadalajara, Julio 1.º de 1889 (C. G. Pringle, 2791).

Bouvardia scabra, Hook. et Arx. Bot. Beceli. Voy. p. 427.

Bouvardia obovata, Bentii. Pl. Hartw. p. 16, nec. H. B. K.
Barranca, cerca de Guadalajara, Noviembre 15 de 1889 (C. G.

Pringle, 2764).

Bouvardia triphylla, SALISB. Parad. Lond. t. 88.

Bouvardia jacquini, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 385.
Bonvardia ternifolia, Schl. in Linnaa xxvi. p. 98.
Bonvardia coccinea, Link. Enum. t. p. 139.
Bonvardia splendens, Gran. in Bot. Mag. t. 3781.
Ixora ternifolia, Cav. Ic. Iv. p. 3, t. 305.
Ixora americana, Jaco. Hort. Schoenb. III. p. 4, t. 257.
Houstonia coccinea, Andrews, Bot. Rep. t. 106.

Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Bouvardia versicolor, Ker. Bot. Reg. t. 245; Schl. in Linnæa xxvi. p. 109.

Cerros que limitan el Lago de Cuitzeo (Est. de Michoacán), Agosto 4 de 1892 (C. G. Pringle, 4137); var. Sitios agrestes y pedregosos de las barraneas. San Márcos (Est. de Jalisco), Junio 9 de 1893 (C. G. Pringle, 4387).

var. graciliflora, GRAY. in hb. Pringle.

Lugares sombríos. Tequila (Est. de Jalisco), Julio 3 de 1893 (C. G. Pringle, 4437).

Bouvardia sp.

N. V. Trombetilla.

De 3 á 8 piés. Cerros que limitan el Lago de Cuitzeo (Est. de Michoacán), Agosto 4 de 1892 (C. G. Pringle, 4138).

Bouvardia sp.

Jalapa (Est. de Veracruz), Agosto de 1886 (R. Montes de Oca). Bouvardia sp.

Tehuacan (Est. DE PUEBLA), Julio de 1884 (J. Velasco).

Bouvardia sp.

La Barrranea (Est. de Jalisco), Octubre 3 de 1887 (M. Bârcena, 101).

Bouvardia sp.

Volcán del Nevado de Colima (M. Barcena, 469 y 470).

Вот.-29.

Bouvardia sp.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bărcena, 496, 573 y 574).

Exostemma caribeum, Rœm. et Schult. Syst. v. p. 18. Cinchona caribæa, Jaco. Amer. t. 179, fig. 65; Obs. n. t. 17. Cerros. Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 27 de 1890 (C. G. Pringle,)

Exostemma mexicana, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. p. 180. Un árbol pequeño. Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3087).

TRIBUS V. RONDELETIEÆ.

Rondeletia gracilis, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars tertia, p. 53. De 15-20 piés. Cerros eerca de Orizaba, á 5,000 piés (Est. de Veracruz), Febrero 9 de 1895 (C. G. Pringle, 6135).

Rondeletia ligustroides, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars altera, p. 26; Biol. Cent. Amer. Bot. II. p. 21.

Cerro de S. Cristóbal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro).

TRIBUS VI. HEDYOTIDEÆ.

Oldenlandia microtheca, Ch. et Schl. in Linnæa vi. p. 414. Gerontogea microtheca, Ch. et Schl. in Linnæa v. p. 169. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3510).

Oldenlandia pringlei, Rob n. sp. in hb. Pringle. Llanuras alcalinas, Hacienda de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Junio 27 de 1891 (C. G. Pringle, 3758).

Houstonia angustifolia, Michx. Fl. Bor. Amer. i. p. 85.

Hedyotis stenophylla, Torr. et Gray. Fl. n. Amer. ii. p. 41.

Oldenlandia angustifolia, A. Gray. Pl. Wright. ii. p. 68.

Montes de S. Miguelito (Est. de [S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 614).

Houstonia longiflora, A. Gray. in Proc. Am. Acad. iv. p. 314.

Bouvardia longiflora, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. nt. p. 386; Bot. Mag. t. 4223.

Æginetia longiflora, CAV. Ic. vi. t. 572, fig. 1.

N. V. Flor de S. Juan. Muy estimada por su perfume agradable.

Sierra de S. Felipe, á 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4655).

Houstonia polypremoides, Gray, in hb. Pringle.

Suelo calizo. Montes de Sta. Eulalia (Est. De Chuiuahua), Octubre 2 de 1886 (C. G. Pringle, 1066).

TRIBUS VII. MUSSÆNDEÆ.

Gonzalea glabra, Watson in hb. Pringle.

Cañadas de la Sierra, cerca de Guadalajara, Noviembre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 5240).

TRIBUS VIII. HAMELIEÆ.

Hamelia patens, Jaco. Stirp. Amer. p. 52, t. 50; DC. Prodr. iv. p. 441.

Duhamelia patens, Pers. Ench. 1. p. 203.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3677).

TRIBUS X. GARDENIEÆ.

Randia pringlei, GRAY. in hb. Pringle.

Sierras de Jimulco (Est. DE Coahulla), Abril 9 de 1886 (C. G. Pringle, 142).

Randia watsoni, Rob. in hb. Pringle.

De 10 á 15 piés. Bancos de lava, cerca de Zapotlán (Est. DE Jalisco), Mayo 20 de 1893 (C. G. Pringle 4383).

TRIBUS XIII. GUETTARDEÆ.

Chomelia pringlei, Watson n. sp. in hb. Pringle.
De 15 piés. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosó, Agosto 6 de 1890 (C. G. Pringle, 3209).

TRIBUS XV. CHIOCOCCEÆ.

Chiococca phænostemon, Schl. in Linnæa ix. p. 594.
Sierra Madre, cerca de Monterey (Est. de Nuevo León), Junio 17 y Agosto 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2703),
Chiococca racemosa, Jaco. Stirp. Amer. p. 68; DC. Prodr. iv.

p. 482.

Barranca cerca de Guadalajara, Noviembre 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2739); Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 5 de 1890 (C. G. Pringle,)

TRIBUS XVIII. IXOREÆ.

Coffea arabica, Linn. var.

Jalapa (Est. de Veracruz), Mayo de 1889 (R. Montes de Oca).

TRIBUS XXIII. ANTHOSPERMEÆ.

Nertera depressa, Banks. et Sol. in Gærth. Fruct. i. p. 124, t. 26; Hook. Fl. n. Zeal. t. 28; Bot. Mag. t. 5799.

Nerteria depressa, Smith, Ic. ined. n. t. 28.

Bancos musgosos, Sierra de S. Felipe, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4672).

TRIBUS XXIV. SPERMACOCEÆ.

Diodia teres, Walt. Fl. Carol. p. 87; DC. Prodr. iv. p. 562.

Spermacoce diodina, Michx. Fl. Bor. Amer. 1. p. 82.

Prados húmedos, cerca de Guadalajara, Septiembre 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3838).

Crusea brachyphylla, Cu. et Schl. in Linnaa v. p. 165.

Cerros, Rio Hondo (Est. de Mexico), Agosto 26 de 1890 (C. G. Pringle, 3619).

Crusea calocephala, DC. Prodr. iv. p. 567.

Llano de Belén, Guadalajara, Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 40); Campos cerca de Guadalajara, Septiembre 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3256).

Crusea coronata, Rob. et Grenn. n. sp.

Terreno arido. Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 3 de 1893 (C. G. Pringle, 5424).

Crusea cruciata, Watson n. sp. in hb. Pringle.

Peñascos sombríos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3834).

Crusea megatocarpa, Watson in hb. Pringle.

En las pendientes secas y obscuras de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 19 de 1891 (C. G. Pringle, 3852).

Crusea subulata, Hook. et Arx. Bot. Beech. Voy. p. 431.

Cerros catizos y secos. Las Sedas, a 6,000 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4870).

Crusea villosa, Warson in hb. Pringle.

Cuestas cespitosas, cerca de Guadalajara, Septiembre 11 de de 1890 (C. G. Pringle, 3257).

Crusea sp.

Colomitos, Valle de Guadalajara, Mayo de 1887 (M. Bárcena, 211).

Spermacoce asperifolia, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xt. 1, p. 132.

Suelo arenoso, cerca de Guadalajara, Agosto 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4477).

Spermacoce hænkeana, DC. Prodr. iv. p. 547 (sub. Borreria). Hemsl. Biol. Cent. Amer. Bot. n. p. 59.

Belén, Guadalajara, Septiembre 24 de 1887 (M. Bárcena, 41, 43); Cuestas, cerca de Guadalajara, Octubre 5 de 1889 (C. G. Pringle, 2453).

Spermacoce Iævis, Lam. Ill. nº 1435, t. 94, fig. 2.

Borreria lævis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 349.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porost), Septiembre 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3254).

Spermacoce parviflora, G. F. W. Mey. Fl. Esseq. p. 38, t. 1; DC. Prodr. iv. p. 544 (sub Borreria).

Borreria ramisparsa, DC. Prod. IV. p. 544.

Cuestas cespitosas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 29 de 1891 (C. G. Pringle, 3907).

Spermacoce patula, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 1, p. 128 (sub. Borreria).

Sitios cespitosos. Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 19 de 1892 (C. G. Pringle, 4178).

Spermacoce podocephala, DC. Prodr. iv. p. 542 (sub Borreria);
 Hemst. Biol. Cent. Amer. Bot. ii. p. 60.
 S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 836).

Spermacoce pringlei, Watson n. sp. in hb. Pringle.

Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Octubre 31 de 1891 (C. G. Pringle, 4060).

Spermacoce psyllioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. m. p. 346, t. 278.

Borreria psyllioides, DC. Prodr. iv. p. 548.

Valle de México, Mayo 17 de 1881 *(M. Urbina)*. Spermacoce tenella, H. B. K. var. in hb. Pringle.

Llanuras de Guadalajara, Julio 15 y Septiembre 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4447).

Spermacoce tenuior, Linn. Sp. Pl. p. 147; DC. Prodr. iv. p. 552.
Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porosf), Septiembre 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3255).

Spermacoce verticillata, Sw., ex DC. Prodr. iv. p. 541.

Borreria verticillata, G. F. W. Mey. Fl. Esseq. p. 83. Valle de México, Mayo 17 de 1881 (M. Urbina).

Spermacoce sp.

Ajusco, Valle de México, Mayo 17 de 1881 (M. Urbina).

TRIBUS XXV. GALIEÆ.

Galium aschenbornii, Schauer ex Watson Proc. Am. Acad. xvin. p. 99.

Montes de S. Miguelito, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 841).

Galium microphyllum, GRAY in hb. Pringle.

Paso de Carneros (Est. DE COAHUILA), Septiembre 3 de 1889 (C. G. Pringle,.....)

Galium uncinulatum, DC. ex Warson Proc. Amer Acad. xvii. p. 99.

Cerca de Morales, en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 179).

Galium uropetalum, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 66, t. xll. ligs. 7, 9.

Rubia acuminata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 1, p. 127.

De 3-5 piés. Sierra de S. Felipe, à 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 28 de 1894 (C. G. Pringle, 4710).

Galium sp.

N. V. Pegaiosa.

Escuela de Agricultura (Valle de México), Julio de 1892 (M. Urbina).

Galium sp.

Cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Julio de 1890 (M. Urbina).

Didymæa mexicana, Ноок. fil. in Ноок. Ic. t. 1271.

Perenne; tallos de 5-10 piés; trepadora sobre los arbustos; llores purpureas. Sierra de S. Felipe, de 8,500 á 9,000 piés (Est. De Oaxaca), Junio 22 de 1894 (C. G. Pringle, 4716).

ORDO XCIII. VALERIANEÆ.

Phyllaetis pratensis, Benth. et Hook. Gen. Pl. H. p. 153.

Astrephia pratensis, Benth. Pl. Hartw. p. 39.

Valeriana galeottiana, Mart. in Bull. Acad. Brux. xl. 1, p. 124?

Praderas húmedas, Valle de Toluca (Est. De México), Agosto
17 de 1892 (C. G. Pringle, 4199).

Valeriana affinis, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. xt. 1, p. 123.

Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Junio 23 de 1894 (C. G. Pringle, 4707).

Valeriana albonervata, Robinson, n. sp. in hb. Pringle.

Cuestas. Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3612).

Valeriana densifiora, Benth. Pl. Hartw. p. 39.

Bancos fríos y húmedos. Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4210).

Valeriana edulis, Nutt.

Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 24 de 1892 (C. G. Pringle, 4206). Á 9,700 piés de altura en la Sierra Madre (Est. de Chimuanua), Octubre 3 de 1887 (C. G. Pringle, 1257).

Valeriana palmeri, A. GRAY in hb. Pringle.

Bancos sombríos, cerca de Guadalajara, Septiembre 2 de 1893 (C. G. Pringle, 4521).

Valeriana scandens, Linx, Sp. Pt. p. 47; DC. Prodr. iv. p. 634.
En las corrientes, Las Canoas (Est. de S. Luis Porosf), Octubre 31 de 1891 (C. G. Pringle, 4603).

Valeriana pilosiuscula, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 1, p. 122.

Sitios agrestes, cerca del Lago de Pátzenaro (Est. de Michoa-Cán), Julio 17 de 1892 (C. G. Pringle, 4121).

Valeriana scorpioides, DC. Prodr. iv. p. 635.

Bancos calizos. Flor de María (Est. de México), Agosto 30 de 1890 (C. G. Pringle, 3234).

Veleriana sorbifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. иг. р. 332.

Cerca de S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 107). Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3341).

Valeriana subincisa, Benth. Pl. Hartw. p. 39.

Tallos blandos y leñosos hacia abajo, trepadores de 10 á 15 piés sobre los arbustos. En los bosques húmedos. Volcán de Colima, á 11,000 piés (Est. DE Jalisco), Junio 7 de 1893 (C. G. Pringle, 4390).

Valeriana tolucana, DC. Prodr. iv. p. 640.

Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 25 de 1894 (C. G. Pringle, 4837).

Ordo XCVI. COMPOSITÆ.

TRIBUS I. VERNONIACEÆ.

- Vernonia alamani, DC. Prodr. v. p. 61.
 - Monte de Pozo, Tenancingo (Est. de México), Enero de 1886 (M. Villada).—De 3 á 5 piés de altura, Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 18 de 1890 (C. G. Pringle, 3347).
- Vernonia aschenborniana, Schauer in Linnæa xix. p. 714. Anual. Valle de Ahualulco, Guadalajara, Octubre de 1886 (M. Bárcena, 351).
- Vernonia deppeana, Less. in Linua vi. págs. 368 et 655.
 - Un arbusto de 10 á 15 piés. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 6 de 1891 (C. G. Pringle, 3721).—De 10-15 piés; suelo húmedo, cerca de Orizaba (Est. de Veracruz), Febrero 2 de 1895 (C. G. Pringle, 6121).
- Vernonia ervendbergii, Gray in hb. Pringle.
 - En las cuestas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3773).
- Vernonia foliosa, Sch. Bib. in Pollichia, 1861, p. 161.

 Monosis foliosa, Benth. Pl. Hartw. p. 19.
 - Cerros rocallosos, cerca de Guadalajara, Octubre 28 de 1889 (C. G. Pringle, 2728).
- Vernonia karvinskiana, DC. Prodr. v. p. 62.
 - S. Luis Potosí (G. Schaffner).—De 3-4 piés, leñosa hacia abajo, entre las encinas enanas. Cerros secos arriba de Las Sedas, á 7,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 30 de 1894 (C. G. Pringle, 6019).
- Vernonia leiboldiana, Schl. in Linnæa xix. p. 742.
 - Leiboldia ovata. Schl. loc. cit.
 - De 3-6 piés. Cerro del Borrego, arriba de Orizaba, á 4,700 piés (Est. de Veracruz), Enero 21 de 1895 (C. G. Pringle, 6085).
- Vernonia monosis, Schz. Bib. in Linnæa xx. p. 507.

 Monosis? tomentosa, DC. Prodr. v. p. 77.

Turpinia? tomentosa, La Llav. et Lex. Nov. Veg. Deser. 1. p. 24.

Fucaldea? tomentosa, Less, in Linna, v. p. 248.

Sierra de S. Felipe, à 7,500 pies (Est. de Oaxaca), Noviembre 17 de 1894 (C. G. Pringle, 5842).

Vernonia salicifolia, Sch. Rib. in Linnæa xx. 507.

Monosis salicifolia, DC. Prodr. v. p. 77.

N. V. Ahuitule.

Entre Tejupilco y Luvianos (Est. de México), Febrero de 1886 (M. Villada).

Vernonia schiedeana, Less. in Linnæa vi. p. 399; DC. Prodr. v. p. 47.

N. V. Flor de borla.

Soconusco (Est. de Chiapas), 1884 (R. Montes de Oca).—De 3-6 piés. Bancos cerca de Córdoba, a 2,000 piés (Est. de Veracruz), Enero 27 de 1895 (C. G. Pringle, 6080).

Vernonia serratuloides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 33, t. 316.

N. V. Vara de S. Miguel.

Arroyo de Enmedio (Guadalajara), Septiembre de 1886 (M. Bărcena); Llanuras de Guadalajara, Octubre 16 de 1889 (C. G. Pringle, 2316).

var. Cerros rocallosos, cerca de Guadalajara, Octubre 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2984).

Vernonia steetzii, Sch. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald" p. 297. De 4 á 8 piés de altura.

Cerros, cerca de Guadalajara, Diciembre 11 de 1889 (C. G. Pringle, 2439).

Bolanosa coulteri, A. Gray Pl. Wrigth. t. p. 82.

Matorral pequeño de flor morada.

Valle de Ahualulco y la Barranca (Guadalajara) Septiembre de 1886 (M. Bárcena); Lugares cespitosos de Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 28 de 1891 (C. G. Pringle, 4031).

Elephantopus angustifolius, Swartz. Prodr. Fl. Ind. Occ. p. 115; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 355.

Elephantosis angustifolia, DC. Prodr. v. p. 87.

Las Canoas (Est. de S. Luis Porosi), Agosto 29 de 1891 (C. G. Pringle, 5017).

Elephantopus scaber, Linn. Sp. Pl. p. 1313; DC. Prodr. v. p. 86; Baker in Mart. Fl. Bras. fase. Lnu. p. 173.

Elephantopus tomentosus, Linn. Sp. Pl. p. 1314.

Elephantopus martii, Gran. in Edinb. New. Phil. Journ. 1830, p. 2.

Elephantopus mollis, II. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 26.

Elephantopus carolineanus, Willd. Sp. Pl. III. p. 2390.

Especie ampliamente esparcida en la América tropical y subtropical.

Jalapa (Est. de Veracruz), Diejembre de 1885 (R. Montes de Oca).

var. tomentosus, Scu. Bib.

Bosques fértiles, cerca de Magdalena (Est. DE JALISCO), Octubre 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4588).

Elephantopus spicatus, B. Juss. in Aubl. Pl. Guian, p. 808.

Distreptus spicatus, Cass. et Less. ex DC. Prodr. v. p. 87.

Matamoria spicata, La Llave et Lex. Nov. Veg. Descr. 1. p. 8.

Cerca de Guadalajara, Noviembre 14 de 1888 (C. G. Pringle, 2178).

TRIBUS II. EUPATORIACEÆ.

Piqueria laxiflora, Rob. et Sea n. sp. in hb. Pringle.

Lugares fríos. Cañadas de las montañas, cerca del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Noviembre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4333).

Piqueria pilosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 153.

Montañas de Salazar (Est. de México), Julio 10 de 1892 (C. G. Pringle, 4119).

Piqueria pringlei, Rob. et Sea. n. sp. in hb. Pringle.

En los bosques de pinos. Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4285).

Piqueria serrata, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 25.

var. angustifolia, Rob. et Greenm. n. var.

Un arbusto de 3-6 piés. Sierra de S. Felipe, á 9,500 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4827).

Piqueria trinervia, Cav. Ic. III. p. 19. t. 235; Bot. Mag. t. 2650).
N. V. Yerba del Tabardillo, N. Mex. Yoloxillic, Xoxonitzal,
Otomí. Empueshte.

Especie muy abundante en todo el Valle de México, Octubre de 1883 (M. Urbina); Garita del Sur, Guadalajara, Mayo de 1887 (M. Bárcena, 174); Llanuras de Guadalajara, Noviembre 13 de 1889 (C. G. Pringle, 2751).

Decachæta hænkeana, DC. Prodr. v. p. 133; Deless. Ic. Sel. iv. t. 13.

Arbusto con hojas lanceoladas de 30 cent. de largo y de 7 á 8 de ancho, irregularmente serradas.

La Barranca, Guadalajara, Octubre de 1886 (M. Bárcena); La Barranca, Guadalajara, Octubre 3 de 1891 (C. G. Pringle, 5004).

Ophryosporus ovatifolius, Bentu. et Hook. Gen. Pl. 11. p. 239. Nothites ovatifolia, DC. Prodr. v. p. 187.

Arbusto de flor blanca.

Hac. de la Concepción y Valle de Ahualulco, Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bàrcena, 397).

Triehocoronis greggii, GRAY. Pl. Wright. 1. p. 89.

Pantanos de Atequiza (Est. de Jalisco), Mayo 17 de 1890 (C. – G. Pringle, 3110).

Ageratum albidum, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 81.

Cælestina albida, DC. Prodr. v. p. 107.

Cerros, cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Agosto 23 de 1894 (C. G. Pringle, 4816).

Ageratum arbutifolium, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 149. Phania arbutifolia, DC. Prodr. v. p. 115.

Cofre de Perote (Est. de Veracruz), Abril de 1885 (J. Velasco), Sierra de las Cruces (Est. de México), Septiembre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 4290).

Ageratum callosum, Watson n. sp. in hb. Pringle.

Peñascos húmedos y calizos, cerca de Guadalajara, Mayo 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3481); Pendientes húmedas, eerca de Guadalajara, á 5,000 piés, Mayo 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4739).

Ageratum glanduliferum, Tu. Dur. Ind. p. 191.

Oxylobus glanduliferus, Gray.

De 3-4 piés. En las cimas de la Sierra de S. Felipe, á 10,400 piés (Est. de Oanaca), Agosto 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4833).

- Ageratum tomentosum, Hemse. Biol. Cent. Am. Bot. u. p. 84. Cwlestina tomentosa, Bentu. in Vidensk. Meddel. 1852, p. 71. Cañon de Tomellin, á 3,000 piés (Est. de Oanaca), Mayo 17 de 1894 (C. G. Pringle, 5786).
- Piptothrix palmeri, A. Gray in Proc. Am. Acad. xxi. p. 383. Barranca de Rio Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Volcán del Nevado (Est. de Colima), á 3,364 m. (M. Bárcena, 455).
- Stevia berlandieri, A. Grav. in Torr. Bot. Emory Rep. p. 73. in adnot.
 - S. Luis Potosí (G. Schaffner); Sierra Madre, cerea de Monterey (Est. DE NUEVO LEÓN), Mayo 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2090).
- Stevia clinopodia, DC. Prodr. v. p. 116.

Cerros arriba de Reyes, à 7,500 pies (Est. de Oaxaca), Noviembre 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4973 y 6034).

Stevia elatior, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 144.

S. Luis Potosi (G. Schaffner); Teoloyúcan (Est. de México), Septiembre de 1886 (M. Villada); Cañada de Rio Hondo (Est. de México), Agosto 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3150); Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 6 de 1894 (C. G. Pringle, 4696, 4974 y 4976).

Stevia eupatoria, Willd. Sp. Pl. III. p. 1775; DC. Prodr. v. P. 118; Bot. Mag. t. 1849.

Stevia hyssopifolia, Cav. Præl, 465; Lag. Nov. Gen. et Sp. P. 26, non Kunth nec Sims.

Stevia punctata, Prest. Ench. 11. p. 403.

Ageratum punctatum, ORT. Dec. III. p. 37.

Mustelia cupatoria, Spreng. in Trans. Linn. Soc. Lond. VI. p. 152, t. 13.

Color de púrpura. Cuestas. Paso de S. José (Est de S. Luis Porosó, Julio 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3176); Praderas. Flor de María (Est. de México), Septiembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3246, 3479).

Bor.-32.

Stevia laxa, Rob. et Sea in hb. Pringle.

Sitios de boseaje y calientes. Cerros cerca de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Oetubre 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4543).

Stevia laxiflora, DC. Prodr. v. p. 122.

Stevia purpurea (quinquearistata), Lag. Nov. Gen. et Sp. p. 26, non. Pers.

Stevia hyssopifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 140, non Cav. nec Sims.

Cerro de Guadalupe, Taeubaya (Valle de México), Septiembre de 1884 (M. Urbina); S. Luis Potosi (G. Schaffner); Cerros de Rio Hondo (Est. de México), Agosto 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3458).

Stevia linoides, Scn. Bib. in hb. Pringle.

Suelo húmedo. Llanuras de Guadalajara, Septiembre 17 de 1891 (C. G. Pringle, 1041).

Stevia lucida, Lag. Nov. Gen. et Sp. p. 28; DC. Prodr. v. p. 117. S. Luis Potosi (G. Schaffner).

Stevia micrantha, Lag. Nov. Gen. et Sp. p. 27; DC. Prodr. v. p. 121; Calq. des Dess. Fl. Mex. 548.

Stevia macella, A. GRAY.

Cerros de Guadalupe, Chapultepee (Valle de México), Septiembre de 1884 (M. Urbina).

Stevia monardæfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 147. var. cordifolia, A. Gray. in hb. Pringle.

Lugares de boscaje, eerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 25 de 1893 (C. G. Pringle, 4581).

Stevia origanoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 147. S. Luis Potosi (G. Schaffner).

Stevia paniculata, LAG. Nov. Gen. et Sp. p. 27; DC. Prodr. v. p. 120.

S. Luis Potosí (G. Schaffner); Chapultepec (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de 1884 (M. Urbina); Arroyo de Enmedio, Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena); Cerros eerca de Guadalajara, Noviembre 13 de 1889 (C. G. Pringle, 2753).

Stevia phlebophylla, GRAY in hb. Pringle.

Sierra de S. Estéban, cerea de Guadalajara, Noviembre 9 de 1888 (C. G. Pringle, 2291).

Stevia plummeræ, GRAY. in hb. Pringle.

Sierra Madre (Est. de Ciminalina), Octubre 9 de 1888 (C. G. Pringle,)

Stevia rhombifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 143.

Chapultepec (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina); Belén, Guadalajara, Septiembre de 1886 (М. Bárcena); Lomas, cerca de la Barranca, Guadalajara, Septiembre 11 de 1890 (С. G. Pringle, 3282); Faldas de la Sierra Madre (Евт. de Сипианиа), Octubre 17 de 1888 (С. G. Pringle, 3054).

Stevia salicifolia, Cav. lc. iv. p. 32, t. 354; DC. Prodr. v. p. 117. N. V. Jarilla.

Tacubaya y en todo el Valle, Septiembre de 1883 (M. Urbina);
Cerros de Zacatecas, Octubre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 4052).

Stevia salicifolia, Cav. var. nana, A. Grav. in Proc. Am. Acad. xv. p. 25.

S. Luis Potosi (G. Schaffner).

Stevia seemannii, Scuz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald" p. 298.
Sierra de S. Felipe, a 7,000 pies (Est. De Oaxaca), Octubre 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4949).

Stevia serrata, Cav. Ic. IV. p. 33, t. 355.

S. Juan del Rio (Est. de Querétaro), Septiembre de 1886 (A. Herrera); Belén, Guadalajara, Septiembre 24 de 1886 (M. Bârcena, 51); Lomas frías, cerca de Chihuahua, Septiembre 29 de 1886 (C. G. Pringle, 639 y 1033).

var. ovalis, Roв. n. var. in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Agosto 28 de 1893 (C. G. Pringle, 4491).

Stevia stenophylla, A. Grav. in Proc. Am. Acad. xv. p. 25.

S. Luis Potosi (G. Schaffner): Peñascos sombreados, cerros pedregosos cerca de Chihuahua, Agosto 4 de 1885 (C. G. Pringle, 677½).

Stevia subpubescens, Lag. Nov. Gen. et Sp. p. 28; DC. Prodr. v. p. 116.

Terrenos arenosos, Colomitos, Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena); Muy aromática y de olor balsámico (M. Urbina); Cerros cerca de Guadalajara, Noviembre 14 de 1889 (C. G. Pringle, 2748).

Stevia trifida, LAG. Nov. Gen. et Sp. p. 27.

Stevia multifida, DC. Prodr. v. p. 121.

Peñascos húmedos, cerca de Guadalajara, Mayo 21 de 1882 (C. G. Pringle,.....)

Stevia venosa, Gray, in hb. Pringle.

Faldas cespitosas de la Sierra Madre, bajo las encinas (Est. de Chimuanua), Octubre 4 de 1888 (C. G. Pringle, 1616).

Stevia viminea, Schrad. Hort. Gott. 1832; DC. Prodr. v. p. 117.

Praderas cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4580).

Stevia viscida, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 140, t. 351. N. V. Yerba de la pulga,

Teoloyúcan (Est. DE México), Septiembre de 1886 (M. Viliada); Belén, Guadalajara, Septiembre 21 de 1885 (M. Bárcena, 52).

Fleischmannia schaffneri, A. Grav. in Proc. Am. Acad. xvi.

S. Luis Potosí (G. Schaffner).

Carminatia tenuiflora, DC. Prodr. vII. p. 267; Deless. Ic. Sel. Iv. t. 99.

S. Angel (Valle de México), Octubre de 1890 (M. Urbina); La Barranca, Guadalajara, Octubre de 1886 (M. Bârcena, 144).

Eupatorium adenophorum, Spreng, Syst. m. p. 420; DC. Prodr. v. p. 164.

Enpatorium glandulosum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 122, t. 346; Bot. Reg. t. 1723, non Michx.

Chapultepec (Valle de México), Marzo de 1883 (M. Urbina). Eupatorium adenospermum, Scu. Bib. in Secm. Bot. Voy. "Herald," p. 299.

var. pleianthum, Gray in hb. Pringle.

Cerros de Guadalajara, Noviembre 1.º de 1893 (C. G. Pringle,....)

Eupatorium ageratifolium, DC. Prodr. v. p. 173.

var. mexicanum, DC, Loe. cit.

De 5 á 6 piés. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1890 (C. G. Pringle, 3072).

Eupatorium albicaule, Sch. Bib. in hb. Liebm. n.º 88.

Arbusto de 10 á 20 piés. Las Palmas (Est. de S. Luis Porosí), Junio 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3103). Eupatorium amplifolium, A. Gray in Proc. Am. Acad. xv. p. 28.

Cañadas frías de las montañas, cerca de Pátzcuaro (Est. DE Michoacáx), Octubre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4272). var. Gray in hb. Pringle.

Con hojas más anchas. Lugares cespitosos, cerca de Guadalajara, Julio 6 de 1889 (C. G. Pringle, 2878).

Eupatorium aschenbornianum, Schauer in Linnæa, xix. p. 720. De 10-15 piés. Valle de Oaxaca, á 5,000 piés, Mayo 12 de 1894 (C. G. Pringle, 4628).

Eupatorium bellidifolium, Benth. Pl. Hartw. p. 380.
Bancos sombreados. Sierra de S. Felipe, á 8,000 piés (Est. DE OANACA), Noviembre 21 de 1894 (C. G. Pringle, 6056).

Eupatorium brevipes, DC. Prodr. v. p. 168.
Barranca de Dolores (Valle de México), Marzo de 1882 (M. Urbina); Cerros, cerca de Guadalajara, Octubre 22 de 1889 (C. G. Pringle, 2732); Faldas de la Sierra de S. Felipe, å 5,500 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 16 de 1894 (C. G. Pringle, 6046).

Eupatorium bustamanta, DC. Prodr. v. p. 168. Corolas blancas. Tlalpam (Valle de México), Marzo de 1882 (M. Urbina).

Eupatorium calaminthæfolium, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV, p. 129, t. 348.

Valle de México, Octubre de 1886 (M. Urbina).

Eupatorium collinum, DC. Prodr. v. p. 164.

Eupatorium nigrescens, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 297.

Barranca de Dolores (Valle de México), Octubre de 1885

(M. Urbina); Llano de la Concepción (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 172); Cerros, cerca de Gua-

dalajara, Octubre 22 de 1889 (C. G. Pringle, 2733).

Eupatorium collodes, Rob. et Greenm n. sp.

De 2-3 pics. Cerros graníticos. Las Sedas, á 6,000 pics (Est. DE OAXACA), Octubre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4941).

Eupatorium conyzoides, Vahl. Symb. III. p. 96; DC. Prodr. v. p. 143.

Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. DE NUEVO LEÓN), Agosto 23 de 1889 (C. G. Pringle,); Ixtapan de la Sal (Est. DE México), Enero de 1885 (M. Villada); Barranca de Beltrán, Guadalajara, Enero de 1886 (M. Barcena, 3.7-5). Eupatorium daleoides, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 94. Critonia daleoides, DC. Prodr. v. p. 141.

Nevado de Colima, Septiembre de 1886 (M. Bárcena).

Eupatorium deltoideum, Jaco. Hort. Schoenb. III. p. 63, t. 369. N. V. Yerba del Ángel. Mex. Yolochichic. Otomí, Peshto.

Río de los Morales (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina); Faldas de las montañas, Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 29 de 1892 (C. G. Pringle, 4327).

Eupatorium espinosarum, A. Gray. in Proc. Am. Acad. xv. p. 28.

var. subintegrifolium, B. L. Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Lugares sombreados, de rocas calizas. Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosf), Octubre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3311).

Eupatorium filicaule, Sch. Bib. in hb. Pringle.

Capas calizas. Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosí), Diciembre 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3956).

Eupatorium glabratum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 127.
N. Mex. Mixtlacott.

Serranía de las Cruces (Est. de México), Marzo de 1886 (M. Villada); Acuautla, Bella Vista, á 2,500 m. (Est. de México), Marzo de 1885 (F. Altamirano).

Eupatorium grandidentatum, DC. Prodr. v. p. 167.

var. laxiflorum, GRAY in hb. Pringle.

Barrancas sombreadas. Montes de Mapula (Est. de Chihuahua), Octubre 30 de 1886 (C. G. Pringle, 747).

Eupatorium greggii, GRAY in hb. Pringle.

Cerros calizos, cerca de Chihuahua, Noviembre 7 de 1886 (C. G. Pringle, 913).

Eupatorium hastile, Schauer in Linnæa xix. p. 719.

Capas calizas. Cañón de Tamasopo (Esr. de S. Luis Potosí), Septiembre 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3275).

Eupatorium hebecarpa, HEMSL.

Critonia hebecarpa, DC. Prodr. v. p. 141.

Chapultepec (Valle de México), Noviembre de 1886 (M. Urbina).

Eupatorium hysopinum, A. Gray in Proc. Am. Acad. xv. p. 28. S. Luis Potosi (G. Schaffner).

Eupatorium incomptum, DC. Prodr. v. p. 173.

Cuestas pedregosas, cerca de Guadalajara, Octubre 21 de 1889 (C. G. Pringle, 2469).

Eupatorium ivæfolium, Linn. Amæn. Acad. v. p. 405; DC. Prodr. v. p. 146.

Cuestas cespitosas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf) Octubre 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3914).

Eupatorium longipes, A. Gray in Proc. Am. Acad. xv. p. 26.

Eupatorium pedunculosum, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 86, nec. Hook, et Arn.

Bulbostylis pedunculosa, DC. Prodr. v. p. 138.

S. Luis Potosí (G. Schaffuer); Montes secos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 3942).

Eupatorium macrocephalum, Less. in Linnæa v. p. 136. Cuestas cospitosas. Las Canoas (Est. de S. Luis Porost), Agosto 6 de 1890 (C. G. Pringle, 3200).

Eupatorium macrophyllum, Lixx. Sp. Pl. p. 1175.

Hebeclinium macrophyllum, DC, Prodr. v. p. 136.

N. V. Chiople.

Alrededores de S. Juan Bautista (Est. de Tabasco), Abril 4 de 1888 (J. N. Rovirosa).

Eupatorium monanthum, Sch. Bib. in Scem. Bot. Voy. "Herald," p. 299.

Ixtapan de la Sal (Est. de México), Enero de 1887 (M. Villada).

Eupatorium occidentale, Hook. in hb. Pringle.

Cañadas y Valles, Montañas cerca del Lago de Chapala (Est. DE Jalisco), Noviembre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4353).

Eupatorium palmeri, Gray in hb. Pringle.

Arbusto de 3 piés de altura. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luís Potosí) Noviembre 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3372).

Eupatorium petiolare, Moc. in DC. Prodr. v. p. 166. N. V. Yerba del Ángel.

Chapultopoc, Ajusco (Valle de México), Enero de 1883 (M. Urbina).

Eupatorium popocatepetlense, Sch. Bib. in hb. Pringle. A 8,500 piés. Montañas, Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Septiembre 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2465).

Eupatorium populifolium, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 111. Arbusto de 15 á 20 piés. Montañas, Tamasopo (Est. de S. Luis Potost), Junio 14 de 1892 (C. G. Pringle, 4105). Eupatorium pringlei, Rob. et Greenn n. sp.

De 8-12 pies. Sicrra de S. Felipe, a 9,500 pies (Est. de Oaxaca), Diciembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 6118).

Eupatorium pulchellum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. tv. p. 119, t. 345.

Chapultepec (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1885 (M. Urbina); Valle de Abualulco, Guadalajara, Octubre de 1886 (M. Bárcena); Llanuras, cerca de Guadalajara, Octubre 30 de 1889 (C. G. Fringle, 2579).

Eupatorium pycnocephalum, Less. in Linnæa vi. p. 404.

Lomas de Tacubaya (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina); Puerto de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3523).

Eupatorium quadrangulare, DC. Prodr. v. p. 150.

N. V. Hierba de Sta. María.

Cempoala (Est. de Veracruz), Enero de 1891 (M. Villada); Cañadas fértiles, cerca de Guadalajara, Diciembre 3 de 1889 (C. G. Pringle, 2669).

Eupatorium rhodochlamideum, Gray in Proc. Am. Acad. xv. p. 26.

Herbácea de 3 á 6 piés.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Noviembre 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3370).

Eupatorium saltivarii, Schz. Bib. in hb. Pringle.

En los bosques de pinos. Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4286).

Eupatorium scordioides, GRAY? (scorodonioides?) in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Mayo 26 de 1891 (C. G. Pringle, 3718).

Eupatorium schaffneri, Schz. Bib. ex A. Gray in hb. Kew. (ubi publ?)

S. Luis Potosí (G. Schaffner).

Eupatorium sordidum, Less. in Linnæa vi. p. 403.

N. V. Xiquite.

Cerro del Borrego, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro); Cerros calizos. Las Sedas, á 6,000 piés, y Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 5,800 piés. Octubre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4959 y 6022).

Eupatorium triangulatum, Alam. in DC. Prodr. v. p. 172.

Barranca de Dolores (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Eupatorium trinervium, Scnz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 300.

Cerros. Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 18 de 1893 (C. G. Pringle,)

Eupatorium tubiflorum, Benth. Pl. Hartw. p. 76.

Montañas, cerca de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Diciembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3987); De 10-12 piés. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. De Oaxaca), Octubre 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4956).

Eupatorium wrightii, GRAY in hb. Pringle.

Cerros, cerca de Chihuahua, Noviembre 7 de 1886 (C. G. Pringle, 912).

Eupatorium sp.

Cañadas, cerca de Guadalajara, Noviembre 11 de 1889 (C. G. Pringle, 2741).

Eupatorium sp.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), Septiembre de 1872 (A. Peñafiel).

Jaliscoa pringlei, Watson in hb. Pringle.

Bajo los peñascos de la Barranca de Tequila (Est. DE JALISCO), Octubre 14 de 1893 (C. G. Pringle, 5391).

Mikania denticulata, Willd. Sp. Pl. III. p. 1744; DC. Prodr. v. p. 198.

Eupatorium denticulatum, VAIL. Symb. III. p. 92. N. V. Chichicaste, planta herbácea, semi-trepadora.

Soconusco (Est. de Chiapas), 1884 (R. Montes de Oca).

Mikania gonoclada, DC. Prodr. v. p. 199.

N. V. Guaco.

Túxpan (Est. de Veracruz), Marzo de 1882 (R. Montes de Oca); Lomas pedregosas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Noviembre 4 de 1891 (C. G. Pringle, 3928).

Mikania houstonis, Willd. Sp. Pl. III. p. 1742; DC. Prodr. v. p. 190.

Eupatorium houstonis, Linn. Sp. Pl. p. 1172.

N. V. Palo guaco.

Lagunas de Cocos (Est. de Veracruz), Febrero de 1883 (Ochoa).

Bot.-34.

Brickellia betonicæfolia, A. Gr. Pl. Wright. B. p. 72.

Cerros pedregosos. Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 16 de 1890 (C. G. Pringle, 3171).

Brickellia cavanillesii, A. GRAY Pl. Wright, I. p. 85.

Bulbostylis cavanillesii, DC. Prodr. v. p. 138.

Bulbostylis nepetæfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 112. Eupatorium squarrosum, Cass. Dict. x. p. 37.

N. V. Atanasía amarga, Prodigiosa.

Chapultepec y en todo el Valle, Octubre de 1885 (M. Urbina): Cerros, cerca de Guadalajara, Diciembre 4 de 1889 (C. G. Pringle, 2664).

Brickellia corymbosa, GRAY Pl. Wright. r. p. 84.

Clavigera scabra, Bentii. Pl. Hartw. p. 19. Clavigera corymbosa, DC. Prodr. v. p. 128.

var. subauriculata, Gray in hb. Pringle.

Cerros de Zacatecas, Octubre 25 de 1888 (C. G. Pringle, 1766).

Brickellia coulteri, GRAY Pl. Wright. 1. p. 86.

Valle de Aguascalientes, Octubre 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3932).

Brickellia cuspidata, GRAY in hb. Pringle.

Cerros, cerca de Guadalajara, Octubre 30 de 1889 (C. G. Pringle, 2724).

Brickellia diffusa, GRAY Pl. Wright. 1. p. 86.

Eupatorium diffusum, Vaul. Symb. III. p. 94.

Eupatorium capillare, Desv. in Hamb. Fl. Ind. Occ. p. 1301.
Eupatorium leptopodum, GARD. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. p. 478.

Bulbostylis diffusa, DC. Prodr. vn. p. 268

Orillas sombreadas de la Barranca, cerca de Guadalajara, Noviembre de 1888 (C. G. Pringle, 2174); Cañón de Cuicatlán á 2,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 6 de 1894 (C. G. Pringle, 6032).

Brickellia hebecarpa, A. Gr. Pl. Wright, I. p. 85.

Bulbostylis hebecarpa, DC. Prodr. v. p. 138.

Bancos, cerca de Guadalajara, Noviembre 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2667).

Brickellia hymenochlæna, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 29. S. Luis Potosí, Mayo de 1877 (G. Schaffner); Sierra de S. Felipe, á 8,500 piés (Est. de Oaxaca), Junio 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4698).

Brickellia laciniata, GRAY in hb. Pringle.

Arroyos, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 5242).

Brickellia lanata, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 84.

Bulbostylis lanata, DC. Prodr. vii, p. 268.

Bulbostylis rigida, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 297.

Bolaños (Est. de Guanajuato), Abril de 1883 (D. Cano); Cerros, cerca de Guadalajara, Noviembre 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2762).

Brickellia lancifolia, Rob. et Greenm. n. sp.

De 5-8 piés, Sierra de S. Felipe, à 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Enero 3 de 1895 (C. G. Pringle, 6109).

Brickellia nutans, Rob. et Greenm. n. sp.

De 5-8 piés, Sterra de S. Felipe, à 10,000 piés (Est. de OA-XACA), Diciembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 6114).

Brickellia oliganthes, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 84.

Enpatorium oliganthes, Less. in Linnæa v. p. 1397.

Bulbostylis oligauthes, DC. Prodr. v. p. 137.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Cerros, cerca de Chihuahua, Mayo 8 de 1885 (C. G. Pringle,)
var. crebra, Gray in hb. Pringle,

Cerros, cerca de Chihuahua, Septiembre 27 de 1885 (C. G. Pringle, 635).

Brickellia palmeri, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 30.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner); Cerros de Zacatecas, Octubre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 4054).

Brickellia secundiflora, A. Gr. Pl. Wright. I. p. 85.

Bulbostylis secundiflora, DC. Prodr. v. p. 138.

Eupatorium secundiflorum, LAG. Nov. Gen. p. 25.

Enpatorium nutans, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 105?

Sierra de S. Felipe, á 7,000 piés (Est. DE OAXACA) Octubre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 5697).

Brickellia scoparia, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 84.

Clavigera scoparia, DC. Prodr. v. p. 128; Deless. Ic. Sel. iv. t. 12.

Colomitos, Guadalajara, Abril de 1886 (M. Bärcena).

Brickellia simplex, A. Gr. Pl. Wright. H. p. 73.

Cerros pedregosos, cerca de Chihuahua, Octubre 17 de 1885 (C. G. Pringle, 641).

Brickellia spinulosa, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 84.

Clavigera spinulosa, A. Gr. Pl. Fendl. p. 63, Adnot.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Mesas. Chihuahua, Abril 25 de 1887 (C. G. Pringle, 1593).

Brickellia squamulosa, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 30. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Brickellia thyrsiflora, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 30. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Brickellia veronicæfolia, A. Gr. Pl. Wright, r. p. 85.

Eupatorium veronicæfolium, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 112, t. 341.

Bulbostylis veronicæfolia, DC. Prodr. v. p. 139.

N. V. Gobernadora de Puebla, Peistón, Orégano de monte; Otomí, Peshlo.

En todo el Valle de México, Diciembre de 1883 (M. Urbina); Cerros pedregosos, cerca de Chihuahua, Octubre 13 de 1885 (C. G. Pringle, 610).

Brickellia wislizeni, Gray Pl. Fendl. p. 61.

var. brevifolia, GRAY in hb. Pringle.

gle, 3315).

Cerros de Chihuahua, Septiembre 21 de 1885 (C. G. Pringle, 323).

Barroetea subuligera, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 29. Cerros calizos, cerca de Cárdenas (Est. de S. Luis Potosf), (C. G. Pringle, 3319).

Carpochæte grahami, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 89, Adnot.
S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Lugares agrestes de Flor de María (Est. de México), Octubre 18 de 1890 (C. G. Prinder)

Kuhnia eupatorioides, Linn. Sp. Pl. ed 2, p. 1662; Linn. fil. Dec. n. p. 21, t. 11; DC. Prodr. v. p. 126.

Kuhnia rosmarinifolia. VENT. Hort. Cels. t. 91.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Cerros y llanuras, cerca de Chihuahua, Octubre 5 de 1886 (C. G. Pringle, 1007).

var. monocephala, Warson in hb. Pringle.

Sierras, cerca de Guadalajara, Noviembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 5289).

TRIBUS III. ASTEROIDEÆ.

Gymnosperma corymbosum, DC, Prodr. v. p. 312.

N. V. Tatalencho, Mex. Xonequitl.

Usado en tintura para las reumas.

En el Valle de México, Noviembre de 1885 (M. Urbina); Cerros, cerca de Chihuahua, Octubre 24 de 1886 (C. G. Pringle, 943).

Gymnosperma eriocarpum, A. Gr. Pl. Wright, I. p. 94. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Gymnosperma multiflorum, DC. Prodr. v. p. 312. N. V. Tatalencho.

En el Valle de México, Noviembre de 1885 (M. Urbina); De 2 á 3 piés, Valle del Parián, á 5,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4931).

Xanthocephalum alamani, Велти. et Ноок. Gen. Pl. n. p. 249. Gutierrezia alamani, А. Gr. Pl. Wright. r. p. 91, adnot.

Keerlia linearifolia, DC. Prodr. v. p. 310.

Lugares agrestes y calizos, Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 17 de 1892 (C. G. Pringle, 4195).

Xanthocephalum centauroides, Willd. in Ges. nat. Fr. Mag. 1807, p. 140.

Xanthocephalum bonplandianum, DC. Prodr. vi. p. 44.

Pyrethrum bonplandianum, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. IV. p. 300.

Grindelia? coronopifolia, Leim. Ind. Sem. Hort. Hamb. 1828, p. 16; et in Linnæa v. p. 376; DC. Prodr. v. p. 316.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Agosto de 1885 (M. Urbina).

Xanthocephalum dentatum, Schauer in Linnæa xix. p. 723. S. Cosme (Valle de México), Julio de 1883 (M. Urbina).

Xanthocephalum humile, Schz. Bib. in hb. Liebm.

Xanthocoma humilis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 310, t. 412.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Julio de 1884 (M. Urbina); Praderas bajas (Valle de México), Julio 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3202).

Bor.-85.

Xanthocephalum tomentellum, Rob. n. sp. in hb. Pringle. Praderas alcalinas, Hacienda de Angostura (Est. de S. Luis

Poтosí), Julio 11 de 1891 (С. G. Pringle, 3761).

- Gutierrezia berlandieri, Gray in Proc. Am. Acad. xv. p. 31.
 S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1885 (D. Cano);
 Llanuras, cerca de S. Luis Potosí, Agosto 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3804).
- Gutierrezia euthamiæ, Torr. et Gr. Fl. N. Am. 11. p. 123. var. *microcephala*, Gray in hb. Pringle.

Cañón Rinconada, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 5293).

Grindelia inuloides, Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. 1807, p. 261; DC. Prodr. v. p. 315.

Demetria spathulata, Lag. Elench. Hort. Matr. 1814, p. 30.

N. V. Palancapatli de Puebla.

Río de los Morales (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Grindelia squarrosa, Dunal.

var. hirtella, Rob. et Greenm. n. var.

Cerros. Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 16 de 1894 (C. G. Pringle, 4805).

Heterotheca inuloides, Cass. Dict. li. p. 460, ex DC. Prodr. v. p. 317.

Diplocoma villosa, Don. in Swet's Brit. Fl. Gard. III. t. 246.Doronicum mexicanum, Cerv. in Link. et Otto. Abbild. t. 22.

N. V. Falsa árnica.

Cementerio de Dolores y en todo el Valle, Octubre de 1883 (M. Urbina).

Heterotheca leptoglosa, DC. Prodr. v. p. 317

N. V. Falsa árnica.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Haplopappus ramulosus, DC. Prodr. v. p. 350.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosi, Septiembre de 1881 (D. Cano).

Haplopappus spinulosus, DC. Prodr. v. p. 350.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Abril de 1884 (M. Urbina); Llanuras y mesas, cerca de Chihuahua, Agosto 15 de 1887 (C. G. Pringle, 1572).

Haplopappus stoloniferus, DC. Prodr. v. p. 349, var.

En las corrientes, Nevado de Toluca, á 12,000 piés (Est. DE México), Septiembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4239).

Bigelovia hartwegi, A. Gr. in litt.

Llanuras, eerca de S. Luis Potosí, Agosto 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3803).

Bigelovia veneta, A. Gr. in Proc. Am. Acad. viii. p. 638.

Linosyris mexicana, Schl. Hort. Hal. t. 4.

Aplopappus discoideus, DC. Prodr. v. p. 330.

Baccharis veneta, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 68.

N. V. Falsa damiana.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Septiembre de 1884 (M. Urbina).

Solidago bigelovii, Gray in hb. Pringle.

Sierra Madre (Est. de Chimuanua), Octubre 3 de 1888 (C. G. Pringle,)

Solidago californica, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. n. s. vii. p. 238.

Sierra Madre (Esr. de Nuevo León), Julio 13 de 1888 (C. G. Pringle, 2227).

Solidago mexicana, Linn. Sp. Pl. p. 879; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 104; Torr. et Gray Fl. N. Am. II. p. 211.

Solidago limonifolia, Pers. Syn. II. p. 449.

Teoloyúcan, Chalco (Est. de México), S. Ángel y en todo el Valle, Agosto de 1885 (M. Urbina). *

Solidago velutina, DC. Prodr. v. p. 332.

N. V. Perú cimarrón.

Río de los Morales (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Egletes viscida, Less. Syn. p. 252; DC. Prodr. vi. p. 242.

Bordes del Río, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosf), Junio 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4101).

^{*} Esta especie ha sido descrita con 10s nombres de S. paniculata, DC, S. odora, Arr. S. gonoclada, DC. y S. puncticulata, DC. En mi concepto es una misma especie.

Aphanostephus arkansanus, Gray in hb. Pringle.

Cañadas de la Sierra Madre (Est. de Chihuanua), Octubre 4 de 1888 (C. G. Pringle, 2015).

Aphanostephus humilis, A. Gr. Pl. Wright. I. p. 93.

Aphanostephus arizonicus, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xvi.

Egletes humilis, Torr. et Gr. Fl. N. Am. II. p. 111.

Leucopsidium humile, Benth. Pl. Hartw. p. 18.

Zapópan (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena); Llanuras. Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 2 de 1891 (C. G. Pringle, 4024).

var. coronopifolia, A. GRAY in hb. Schaffner. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Keerlia mexicana, Gray in hb. Pringle.

Lomas sombreadas. Cerca de Guadalajara, Junio 27 y Julio 14 de 1893 (C. G. Pringle, 4412).

Achætogeron linearifolius, Warson, n. sp. in hb. Pringle. Sitios agrestes y llanuras. Flor de María (Est. de México), Septiembre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3242).

Achætogeron pinnatifidus, GRAY in hb. Pringle.

Lomas frías, cerros cerca de Chihuahua, Septiembre 18 de 1886 (C. G. Pringle, 1060).

Bellis mexicana, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 93.

Sierra de S. Felipe, a 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4719).

Bellis xanthocomoides, GRAY in litt.

Brachycome xanthocomoides, Less. in Linnaa ix. p. 265. Pendientes cespitosas y sombreadas. Barranca de las Canoas

(Est. de S. Luis Potosi), Agosto 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3819).

Psilactis coulteri, GRAY Pl. Fendl. p. 72.

Cerros arenosos, cerca de Samalayuca (Est. DE Chihuanua), Septiembre 13 de 1888 (C. G. Pringle, 3050).

Aster ericæfolius, Rothr. in Coulter's Bot. Gaz. 1877, p. 70, et in Bot. Wheller's. Exped. p. 152.

Diplopappus ericoides, Torr. et Gray, Fl. N. Am. II. p. 182. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Aster gymnocephalus, A. Gr. Pl. Wright. I. p. 77, adnot., et in Proc. Am. Acad. xv. p. 32.

Aplopappus gymnocephalus, DC. Prodr. v. p. 346. Machieranthera setigera, Less. in Linnea xix. p. 792?

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Sitios agrestes y calizos, Flor de María (Est. de México), Julio 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3179).

Aster hesperius, GRAY in lib. Pringle.

Valle cerca de Chihuahua, Octubre 4 de 1886 (C. G. Pringle, 1069).

Aster lima, Lindl. in DC. Prodr. v. p. 320.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Sitios agrestes y calizos, Flor de María (Est. de México), Agosto 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3201).

Aster linifolius, LINN. in hb. Schaffner.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Aster moranensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 93.

Diplostephium moraneuse, Nees, Ast. p. 198; DC. Prodr. v. p. 273.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Aster palmeri, Gray in hb. Pringle.

Terrenos bajos, cerca de Brownsville, Agosto 9 de 1888 (C. G. Pringle, 1950).

Aster pauciflorus, Nutt. Gen. H. p. 154; A. Gray Pl. Wright. H. p. 76.

Aster caricifolius, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 92, t. 333. Tripolium caricifolium, Schauer in Linnæa XIX. p. 721.

Tacubaya y Chapultepec, en lugares húmedos (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de 1885 (M. Urbina); Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

Aster potosinus, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 32. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Aster spinosus, Benth. Pl. Hartw. p. 20.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Aster sp.

Alameda de Querétaro, Septiembre de 1884 (M. Urbina).

Erigeron alamosana, Rose.

Cerros de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 22 de 1893 (C. G. Pringle, 5524).

Erigeron affinis, DC. Prodr. v. p. 289.

N. V. Peritre, Chilquan.

Chapultepec (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Erigeron coronopifolius, GRAY in hb. Pringle.

Sitios agrestes, Flor de Maria (Est. DE México), Agosto 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3214).

Erigeron delphinifolius, WillD. Hort. Berol. t. 90.

Polyactidium delphinifolium, DC. Prodr. v. p. 282.

Arcos de la Tlaxpana (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina); Sitios agrestes y calizos, Flor de María (Est. de México), Agosto 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3235).

Erigeron divergens, Torr. et Gr. Fl. N. Am. H. p. 175.

Erigeron cinereus, A. Gr. in Pl. Fendl. p. 68; ex A. Gray in Proc. Am. Acad. xvi. p. 95.

Escalón (Est. de Chimuanua), Abril 27 de 1893 (C. G. Pringle,....)

Erigeron gnaphalioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 88, t. 331.

Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 14 de 1889 (C. G. Pringle, 2449).

Erigeron heteromorphus, Rob. n. sp. in. hb. Pringle.

Creciendo en tobas calizas, más ó menos sumergido. Cascadas del Río de la Concepción, cerca de Micos (Est. de S. Luis Potosí), Diciembre 9 de 1891 (C. G. Pringle, 3963).

Erigeron lanatus, Hook. ex. DC. Prodr. viii. p. 275.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Erigeron longipes,* DC. Prodr. v. p. 285.

S. Francisco Acuautla (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de 1887 (M. Urbina).

Erigeron mucronatus, DC. Prodr. v. p. 285.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Erigeron palmeri, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 32.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Erigeron scaposus, DC. Prodr. v. p. 287.

Aster rivularis, Less. in Linnæa v. p. 143, excl. synon. Ajusco y Chapultepec (Valle de México), Marzo de 1881 (M.

^{*} El Sr. A. Gray cree que el E, scaposus seu esta misma especie y con razón, pues sólo difiere en la talla.

Urbina); Valle de Oaxaca, á 5,000 piés, Junio 2 de 1894 (C. G. Pringle, 4673).

Erigeron spathulatus, VAHL.

De 2-4 piés. Cerros cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Octubre de 1894 (C. G. Pringle, 4940).

Erigeron subdecurrens, Scu. Bib. in hb. Pringle.

Cerros cerca de Pátzeuaro (Est de Michoacán), Diciembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3984).

Erigeron sp.

Colomitos (Valle de Guadalajara), Mayo de 1887 (M. Bárcena, 204).

Conyza asperifolia, Венти. et Ноок. Gen. Pl. н. р. 284.

Baccharis asperifolia, Bentu. Pl. Hartw. p. 86.

De 5-10 piés. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 6051).

Convza coulteri, Gray in hb. Pringle.

Valle cerca de Chihuahua, Septiembre de 1885 (C. G. Pringle, 336).

Conyza gnaphalioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 73, t. 327.

Lænnecia gnaphaloides, Cass.

N. V. Simonillo; Mex. Sacachichic.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner). Escuela de Agricultura, Cerro de Guadalupe y en todas las montañas del Valle de México. Octubre de 1883 (M. Urbina). Llanuras, base de la Sierra Madre (Est. de Chihuahua), Septiembre 23 de 1887 (C. G. Pringle, 1577).

Conyza hispida, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 71.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1883 (D. Cano).

Conyza microcephala, HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 126. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Conyza sophiæfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 72, t. 326. Conyza pulchella, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 72.

Teoloyúcan (Est. de México), Agosto de 1886 (M. Urbina). Llanuras, cerca de S. Luis Potosí, Agosto 26 de 1891 (C. G. Pringle, 4028).

Baccharis alamani, DC. Prodr. v. p. 402.

Atlixco (Est. de Puebla), Noviembre de 1886 (J. Velasco).

Baccharis conferta, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 55.

Baccharis xalapensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 56?

Baccharis cuneata, DC. Prodr. v. p. 408.

Conysa tricuneata, WILLD. Sp. Pl. III, p. 1946.

N. V. Tepopote.

Monte de Pozo, Tenancingo (Est. de México), Enero de 1885 (M. Villada).

Baccharis elegans, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 60, t. 324.
De 2 á 3 piés. Sierra de S. Felipe, á 6,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4954).

Baccharis glutinosa, Pers. in hb. Pringle.

En las corrientes de agua, cerca de S. Luis Potosí, Agosto 27 de 1891 (C. G. Pringle, 4029).

Baccharis heterophylla, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. iv. p. 62. N. V. Escobilla.

Chimalixtac, S. Ángel (Valle de México), Abril de 1883 (M. Urbina).

Baccharis hirtella, DC. Prodr. v. p. 418.

De 2-5 piés. Bancos sombreados, cerea de Orizaba, á 4,200 piés (Est. de Veracruz), Enero 25 de 1895 (C. G. Pringle, 6108).

Baccharis mucronata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 60, nec. Hook et Arn.

Pluchea floribunda, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. altera, p. 32.
Río de los Morales (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Baccharis potosina, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 33.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner), Faldas de los cerros, cerca de Guadalajara, Julio 19 de 1893 (C. G. Pringle, 4460).

Baccharis ptarmicæfolia, DC. Prodr. v. p. 419.

S. Francisquito (Est. de Mèxico), Enero de 1885 (M. Urbina); Hacienda de los Morales (Valle de Mèxico), Septiembre de , 1883 (M. Urbina).

Baccharis pterionioides, DC. Prodr. v. p. 410. N. V. Popotillo; Mex. Tepopotl; Otomi, Boshi.

Matorral de 1 m. de altura: caracteriza terrenos pobres.

Huisquilúcan (Est. de México), Mayo de 1883 (M. Villada); Cerca de Guadalajara, Mayo 21 de 1890 (C. G. Pringle, 3471).

Baccharis ramulosa, A. Gr. Pl. Thurb. p. 301; et in Torr. Bot. Mex. et U. S. Bound. Surv. p. 84.

Aplopappus (Aplodiscus) ramulosus, DC. Prodr. v. p. 350. Linosyris (Aplodiscus) ramulosa, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 97, et 11. p. 80.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); S. Ángel (Valle de México), Abril de 1884 (M. Urbina).

Baccharis rhexioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 66.
Taludes de peñascos. Cañon de Tamasopo (Est. de S. Luis
Potosi), Agosto 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3199).

Baccharis scandens, Less. in Linnæa v. p. 146.

Trepadora sobre arbustos, de 15 piés. En los bosques de encinas, Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4988).

Baccharis seemanni, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 33.

Baccharis wrightii, Scuz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald,"
p. 303, non A. Gr.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Baccharis sordescens, DC. Prodr. v. p. 405.

Río de los Morales (Valle de México), Octubre de 1885 (M. Urbina); Capas secas. Monte Albán, á 6,000 pies (Est. de Oaxaca), Noviembre 27 de 1894 (C. G. Pringle, 6067).

TRIBUS IV. INULOIDEÆ.

Pluchea bifrons, DC. Prodr. v. p. 451.

Por las corrientes. Llanuras alcalinas, Hacienda de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3813).

Pluchea camphorata, DC. Prodr. v. p. 452.

Matamoros (Est. de Tamaulipas), Agosto 8 de 1888 (C. G. Pringle.....)

Achyrocline deflexa, Rob. et Greenn n. sp.

De 3-4 piés. Sierra de S. Felipe, de 7-8,000 piés (Est. DE OAXACA), Noviembre de 1894 (C. G. Pringle, 6054).

Gnaphalium arizonicum, Gray in hb. Pringle.
Sierra Madre (Est. de Cinhuahua), Octubre 11 de 1888 (C. G. Pringle, 3055).

Gnaphalium bourgovii, Gray in hb. Pringle.

Box.-37.

- Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Septiembre 7 de 1889 (C. G. Pringle, 2858).
- Gnaphalium concinnum, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 34.
 S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).
- Gnaphalium gracile, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 83. N. V. Gordolobo.
 - Chapultepec (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina); Llanuras, cerca de S. Luis Potosí, Agosto de 1891 (C. G. Pringle, 3905).
- Gnaphalium kunthianum, Weddell? (Merope kunthiana).
 Cerca del límite de los pinos del Nevado de Toluca, de 12,500 á 13,000 piés (Est. de México), Septiembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4249).
- Gnaphalium lavandulaceum, DC. Prodr. vi. p. 297. Bordes de Ia cima del Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4223).
- Gnaphalium leptophyllum, DC. Prodr. vi. p. 226.
 N. V. Gordolobo, Canelillo, Pollomate.
 - Hacienda de los Morales (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1883 (M. Urbina).
- Gnaphalium leucocephalum, A. Gr. Pl. Wright, II p. 99. Chihuahua, Septiembre de 1888 (Parry et Palmer).
- Gnaphalium oxyphyllum, DC. Prodr. vi. p. 225.
 - Hacienda de la Castañeda (Valle de México), Noviembre de 1883 (M. Urbina); Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4312).
- Gnaphalium popocatepecianum, Sch. Bib. in hb. Pringle.

 Lugares cespitosos, cerca del límite de los pinos. Nevado de

 Toluca (Est. de México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4232).
- Gnaphalium pringlei, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xxi. p. 387.
 S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).
- Gnaphalium rhodanthum, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 310.
 - Surcos secos de la cima, bajo las encinas. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 6115).
- Gnaphalium roseum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 81; DC. Prodr. vi. p. 229.
 - S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1883 (D. Cano).

Gnaphalium schraderi, DC. Prodr. vi. p. 225.

Cerros, cerca de Sta. Inés del Monte, á 5,800 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 15 de 1894 (C. G. Pringle, 4979).

Gnaphalium semiamplexicaule, DC. Prodr. vi. p. 228.

Barranca de S. Jerónimo, Tenancingo (Est. de México), Enero de 1886 (M. Villada).

Gnaphalium sphacelatum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 86.
N. V. Canelillo, Otomí, Chicapashi.

La Presa, Guadalajara, Noviembre de 1886 (M. Barcena).

Gnaphalium spicatum, Lam. Diet. n. p. 757; DC. Prodr. vl. p. 232.

Hacienda de la Castañeda (Valle de México), Noviembre 9 de 1883 (M. Urbina).

Gnaphalium wrightii, GRAY in hb. Pringle.

En la sombra de los cerros (Est. de Chilluanua), Agosto 29 de 1885 (C. G. Pringle,.....)

Helichrysum orientale, Tourn.

N. V. Sempiterna.

Cultivada en el Jardín de la Escuela N. Preparatoria, Diciembre de 1886 (M. Urbina).

TRIBUS V. HELIANTHOIDEÆ.

Lagascea angustifolia, DC. Prodr. v. p. 92.

Cerros, cerca de Guadalajara, Noviembre de 1889 (C. G. Pringle, 2737).

Lagascea heteroppapus, Hensl. Diag. Pl. Nov. pars. altera, p. 33; Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 140.

Laderas, cerca de Morelia (Est. de Michoacán), Oetubre 22 de 1893 (C. G. Pringle, 4541).

Lagascea rubra, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 24, t. 311.

Cerros, Río Hondo (Est. DE México), Septiembre 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3896).

Lagascea suaveolens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 24.

Lagascea helianthifolia, H. B. K. loc. cit.

Lagascea latifolia, DC. Prodr. v. p. 92.

Nocca latifolia, La Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. I. p. 31; Sweet, Brit, Fl. Gard, t. 215.

- Cerro de Sta. Cruz, Valle de Abuaiulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bürcena, 483); Cerros, cerca de Guadalajara, Noviembre 14 de 1889 (C. G. Pringle, 2763).
- Elvira biflora, Cass. Diet. xxx. p. 37; DC. Prodr. v. p. 503. Milleria biflora, Linn. Sp. Pl. p. 1301; Lam. III. t. 310, f. 1. Cerros calizos. Cárdenas (Est. de S. Lins Potosi), Octubre 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3287).
- Milleria quinqueflora, Linn. Sp. Pl. p. 1301; DC. Prodr. v. p. 503.

Milleria dichotoma, CAV. Ic. 1, p. 82.

Milleria glandulosa, DC. Prodr. v. p. 503.

Laderas pedregosas, cerca de Guadalajara, Septiembre 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4518).

- Desmanthodium ovatum, Benth. in Hook. Ic. Pl. sub. tab. 1116. Sierra de S. Felipe, à 7,500 piès (Est. de Oanaca), Junio 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4694).
- Desmanthodium perfoliatum, Bentil. in Hook. Ic. Pl. t. 1116. De 10-20 piés. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4799).
- Trigonospermum melampodioides, DC. Prodr. v. p. 509. En lugares obscuros de los peñascos, Barranca de Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 4 de 1893 (C. G. Pringle, 4568).
- Polymnia aspera, DC. Prodr. v. p. 515.

Escuela de Agricultura (Valle de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina).

- Polymnia maculata, Cav. Ic. III. p. 14, t. 227; DC. Prodr. v. p. 515.
 - Campos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3326).
- Polymnia uvedalia, Linn. Sp. Pl. p.

La Barranca, Guadalajara, Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena, 106).

Guardiola atriplicifolia, A. Gray Pl. Wright. I. p. 111. Terreno arenoso. Colomitos, Guadalajara, Abril de 1886 (M. Bárcena); Cerros, cerca de Pátzcuaro (Est. de Μιchoacán), Julio 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4167).

Guardiola rotundifolia, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Cerros, cerca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre I5 de 1893 (C. G. Pringle, 4571).

Guardiola tulocarpus, A. Gray Pl. Wright. I. p. 111.

Tulocarpus mexicanus, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 298, t, 63.

var. angustifolia, Gray.

Cerros, cerca de Guadalajara, Noviembre 13 de 1889 (C. G. Pringle, 2752).

Melampodium bibracteatum, Warson n. sp. in hb. Pringle.

Campos, Del Río (Est. de México), Agosto 30 de 1890 (C. G. Pringle, 3230).

Melampodium coronopifolium, Scuz. Bib. MSS.; Biol. Cent. Am. 11. p. 145.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Melampodium divaricatum, DC. v. p. 520.

Dysodium divaricatum, Rich. in Pers. Ench. n. p. 489.

Melampodium paludosum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 215.

Alcina ovatifolia, Lag. Nov. Gen. et Sp. nº 403; Jacq. fil. Ectog. t. 78.

Melampodium ovatifolium, RCHB. Icon. Exot. t. 42.

Cerros, Cárdenas (Est. de S. Luis Potosí), Noviembre 3 de 1891 (C. G. Pringle, 3923).

Melampodium glabrum, Wats. n. sp. in hb. Pringle.

Valle de Lerma, cerca de la Barca (Est. de Jalisco), Septiembre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3863).

Melampodium hispidum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 273, t. 399.

La Cañada de Querétaro, Septiembre 6 de 1884 (M. Urbina). Cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Agosto de I884 (M. Urbina); Montañas, cerca de Chihuahua, Septiembre de 1886 (C. G. Pringle, 754).

Melampodium longipilum, Ros. in hb. Pringle.

En los campos, cerros pedregosos en Villar (Est. DE S. Luis Porosí), Septiembre 14 de 1893 (C. G. Pringle, 4537). Melampodium microcephalum, Less. in Linnæa ix. p. 268.
Valle de Ahualulco, Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena).

Melampodium montanum, Bentu. Pl. Hartw. p. 64.

Lugares cespitosos, barranca de las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3818); Sierra de S. Felipe, de 8-10 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 28 de 1894 (C. G. Pringle, 4666).

Melampodium oblongifolium, DC. Prodr. v. p. 519.

Cerros pedregosos, Lago de Cuitzeo (Est. DE Michoacán), Octubre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4322).

Melampodium perfoliatum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 274; DC. Prodr. v. p. 526.

Alcina perfoliata, CAV. Ic. 1. p. 10, t. 15.

S. Ángel (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1883 (M. Urbina); Cerros de Acámbaro (Est. De Guanajuato), Octubre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 5269).

Melampodium sericeum, Lag. Elench. Hort. Matr. 1805; DC. Prodr. v. p. 518, non H. B. K.

var. longipes, GRAY.

Cerros secos, Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 22 de 1893 (C. G. Pringle, 4598); Las Sedas, á 6,000 pies (Est. de Oaxaca), Septiembre 15 de 1894 (C. G. Pringle, 5722).

Melampodium tenellum, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 299. Alameda de Querétaro, Abril 20 de 1886 (M. Urbina).

Parthenium incanum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 260, t. 391; DC. Prodr. v. p. 532.

Parthenium ramosissimum, DC. Prodr. v. p. 532.

Planta que produce hule en la corteza del arbusto, que tiene cerca de 1 m.; 10 mismo que el *P. argentatum*, Torr. de Zacatecas y Chihuahua, Septiembre de 1888. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner). Cerros calizos, cerca de Monterrey (Est. De Nuevo León), Agosto 4 de 1889 (C. G. Pringle, 2642).

Parthenium lyratum, GRAY in hb. Pringle.

Cañón de la Rinconada (Est. de Nuevo León), Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 5300).

Parthenium tomentosum, DC. Prodr. v. p. 532.

De 8-10 piés. Capas secas y lisas. Monte Albán, á 5,800 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4952).

Iva ambrosiæfolia, GRAY in hb. Pringle.

Cañón de la Rinconada cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 5292).

Euphrosine parthenifolia, DC. Prodr. v. p. 530; Deless. Ic. Sci. iv. t. 28.

Escuela de Agricultura (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Ambrosia artemisiæfolia, Linn. Sp. Pl. p. 1401; Lamk. Ill. t. 765, f. 1; DC. Prodr. v. p. 526.

N. V. Yerba amargosa,

Escuela de Agricultura (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina); Guadalajara, Octubre de 1886 (M. Bârcena).

Franseria tenuifolia, A. Grav Pl. Fendl. p. 80, et Bot. Calif. 1. p. 346.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Tragoceros mocinianus, GRAY in hb. Pringle.

La Barranca. Guadalajara, Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena); Suelo delgado y arenoso, cerros cerca de Guadalajara, Octubre 5 de 1889 (C. G. Pringle, 2450).

Tragoceros schiedeanus, Less. in Linnea IX. p. 269.

Valle de Ahualulco, Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena); Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Octubre 5 de 1889 (C. G. Pringle, 2341).

Tragoceros zinnioides, H. B. K. Nov. Gen. ct Sp. iv. p. 249, t. 385.

Zinnia bicuspis, DC. Prodr. v. p. 535; et Calques des Dess. F1. Mex. 573.

Valle de Ahualulco, Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Barcena).

Philactis longipes, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 35. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Zinnia acerosa, A. Gr. Pl. Wrigth. I. p. 105. Diplothria acerosa, DC. Prodr. v. p. 611.

3

- S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffuer); Llanuras. Los Charcos (Est. de S. Luis Potosí), Julio 2 de 1891 (C. G. Pringle, 4022).
- Zinnia angustifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 251. var. Campos cerca de la Barca (Est. DE JALISCO), Septiembre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3866).
- Zinnia elegans, Jaco. Coll. m. p. 152, et Ic. Pt. Par. t. 589; Bot. Mag. t. 527. var. flava.
 - Valle de Túxpan (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena).
- Zinnia linearis, Benth. Pl. Hartw. p. 17.
 - S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Cerros, cerca de Guadalajara, Noviembre 20 de 1889 (C. G. Pringle, 2738).
- Zinnia maritima, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 251.
 - Cerros, Tequila (Est. De Jalisco), Septiembre 21 de 1893 (C. G. Pringle, 5389); Cañadas, cerca de Guadalajara, Octubre 3 de 1889 (C. G. Pringle, 2313).
- Zinnia palmeri, Gray in hb. Pringle.
 - Campos de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 7 de 1893 (C. G. Pringle, 4557).
- Zinnia pauciflora, Linn. Sp. Pl. p. 1269; Lamk. III. t. 685, fig. 1; DC. Prodr. v. p. 535.
 - N. V. Malojo.
 - Chapultepec y Cerro de Guadalupe (Valle de México), Septiembre de 1885 (M. Urbina); Llanos, cerca de Chihuahua, Septiembre de 1885 (C. G. Pringle,)
 - var. a rubra.
- La Barranca, Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena). Zinnia verticillata, And. Bot. Rep. t. 189.
 - Cerro de Guadalupe (Valle de México), Septiembre de 1886 (M. Urbina). Probablemente un estado robusto y cultivado de la Z. elegans.
- Sanvitalia angustifolia, Engelm. ex A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 112.
 - Cerros. Las Sedas, á 6,000 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4864).
- Sanvitalia ocymoides, DC. Prodr. v. p. 628.
 - Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2650).

Sanvitalia procumbens, Lamk. Journ. d'Hist. Nat. II. p. 176, t. 33; III. t. 686; Bot. Reg. t. 707.

Sanvitalia villosa, CAV. Ic. 1v. t. 35.

Lorentea atropurpurea, ORT. Dec. p. 41, t. 5.

N. V. Ojo de Gallo.

Chapultepec, Cerro de Guadalupe y en todo el Valle, Septiembre 8 de 1883 (M. Urbina).

Heliopsis annua, Hemsl. n. sp. Biol. Cent. Am. Bot. ц. р. 156. Campos. Cárdenas (Est. de S. Luis Ротоsí), Noviembre 3 de 1891 (С. G. Priugle, 3927).

Heliopsis buphthalmoides, Dun. in Mem. Mus. v. p. 57; DC. Prodr. v. p. 550.

Heliopsis canescens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 212; Bot. Reg. t. 592.

Anthemis ovalifolia, ORT. Dec. p. 73.

Authemis buphthalmoides, JACQ. Hort. Schenb. t. 151.

Andricuxia mexicana, DC. Prodr. v. p. 559; Deless. Ic. Scl. iv. t. 31.

N. V. Yerba amarilla. Se dice que es venenosa.

S. Juan del Río (Est. de Querétaro), Septiembre 6 de 1884 (A. Herrera); De 2-3 piés. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4835).

Aganippea bellidiflora, DC. Prodr. vi. p. 3; Calq. des Dess. Fl. Mex. 700; Hook. Ic. Pl. t. 1117.

Heliogenes longifolia, Benth. Pl. Hartw. p. 42.

N. V. Estrella de agua.

Escuela de Agricultura y en las Lagunas del Valle de México. Mayo 20 de 1881 (M. Urbina).

Rumfordia floribunda, DC. Prodr. v. p. 550; Deless. Ic. Sel. 1v. t. 30.

De 5 á 8 piés de altura; leñoso hacia abajo.

Montañas cerca de Pátzcuaro (Еsт. DE Місноаса́я), Noviembre 26 de 1891 (С. G. Pringle, 3940).

Siegesbeckia orientalis, Linn. Sp. Pl. p. 1269; Hort. Cliff. t. 23. Siegesbeckia cordifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 283.

Вот.—39.

Siegesbeckia jorullensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1oc. cit., p. 284; Bot. Reg. t. 1061.

Siegesbeckia droseroides, Sweet. Brit. Fl. Gard. t. 203.

En lugares cenagosos. S. Ángel y Arcos de la Tlaxpana (Valle DE México), Octubre 5 de 1883 (M. Urbina); Calimaya (Est. DE México), Octubre de 1888 (M. Villada); Sierra de las Cruces (Est. DE México), Octubre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 5267).

Siegesbeckia repens, Rob. et Greenm. n. sp.

En los arroyos fríos, praderas de la Sierra de Clavellinas, a 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 16 de 1894 (C. G. Pringle, 4987).

Jægeria calva, Schz. Bib. in hb. Pringle.

Lugares arenosos cerca de Guadalajara, Octubre 21 de 1889 (C. G. Pringle, 2950).

Jægeria hirta, Less. Syn. p. 223; DC. Prodr. v. p. 544.

Acmella hirta, Lag. Nov. Gen. et. Sp. p. 30.

Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4279).

Jægeria macrocephala, Less. Syn. p. 223; Linnæa ix. p. 270.

Por los arroyos, cerca de Pátzeuaro (Est. DE Michoacán), Julio 28 de 1892 (C. G. Pringle, 4166).

Jægeria pedunculata, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 299.

Cerca del Agua. Guadalajara, Noviembre 1.º de 1893 (C. G. Pringle,....)

Eclipta alba, Hassk. in hb. Pringle.

Cerca de Guadalajara, Septiembre 29 de 1891 (C. G. Pringle, 5178).

Axiniphillum tomentosum, Benth. in Hook. Ic. Pl. sub. t. 1118.

Cerros cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4826).

Zaluzania anthemifolia, Rob. et Greenm. n. sp.

Barranca, Guadalajara. Septiembre 23 de 1893 (C. G. Pringle, 5156).

Zaluzania angusta,* Schz. Bib. in Flora, 1861, p. 563.

Zaluzania megacephala, Scuz. Bib. loc. cit.

Ferdinanda angusta, Lag. Gen. et Sp. Nov. p. 31, t. 2.

Ferdinanda lutescens, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. i. p. 30. Chrysophania fastigiata, Kuntii. in Less. Syn. p. 224.

N. V. Limpia tunas, Cenicilla.

Cerro de Guadalupe, Octubre de I883 (M. Urbina); Cañon de Río Hondo (Est. de México), Agosto 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3144).

Zaluzania asperrima, Schz. Bib. in Flora, 1864, p. 218.

Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 5,800 piés. Octubre 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4928).

Zaluzania coulteri, Hemsl. Diag. Sp. Nov. pars altera, p. 33; Biol. Cent. Am. Bot. H. p. 159, t. XLVI.

Cimas de los cerros, cerca de Paso de Carneros, á 10,000 piés (Est. de Coanulla), Septiembre 8 de 1889 (C. G. Pringle, 2398).

Zaluzania globosa, Schz. Bib. in Flora, 1861, p. 564.

Anthemis globosa, Ort. Dec. p. 46; Jacq. Hort. Schoenb. III. t. 371.

Chiliophyllum globosum, DC. Prodr. v. p. 554.

Zaluzania myriophylla, Scuz. Bib. in Flora, 1861, p. 565.

Escuela de Agricultura y Hac. de la Ascención (Valle de Mexico), Julio de 1884 (M. Urbina); Praderas bajas (Valle de Mexico), Julio 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3204).

Zaluzania mollissima, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 35. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Zaluzania resinosa, Wars. n. sp. in hb. Pringle.

Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. De Nuevo León), Agosto 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2412).

Sabazia glabra, Wats. n. sp. in hb. Pringle.

Lagunas cerca de la Sierra Madre (Est. DE Chihuahua), Septiembre 27 de 1887 (C. G. Pringle, 1295).

Sabazia humilis, Cass. Dict. xlv1. p. 481; DC. Prodr. v. p. 496.
Eclipta Immilis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 264, t. 394.
Praderas humedas, á 11,000 piés, Nevado de Toluca (Esr. de Mexico), Septiembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4245).

^{*} Esta planta lleva el nombre de Limpia tunas porque nace generalmente al pie de los nopales y sirve para quitar las espinas à las tunas.

Sabazia michoacana, Rob. in hb. Pringle.

Montañas cerca de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Octubre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4264); Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. De Oaxaca), Septiembre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4921).

Sabazia microglossa, DC. Prodr. v. p. 497.

Valle de México, Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Sabazia subnuda, Rob. et Sea. n. sp. in hb. Pringle.

En los bosques de pinos, á 12,000 piés, Nevado de Toluca (Est. DE México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4226).

Gymnolomia canescens, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Llanuras alcalinas, Hae. de la Angostura (Est. de S. Luis Potosf), Junio 27 de 1891 (C. G. Pringle, 3763).

Gymnolomia decumbens, Rob. n sp. in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, Tultenango (Est. de México), Septiembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3263).

Gymnolomia ghiesbreghtii, HEMSL. n. sp. Biol, Cent. Am. Bot.

De 3 á 5 piés de altura. Cerros de arbolados, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3339); Cerros cerca de Oaxaca, de 6-7,000 piés Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4963).

Gymnolomia multiflora, Венти. et Ноок. Gen. Pl. п. р. 364. Sierra Madre, á 9,500 piés (Еsт. DE Симианиа), Octubre 7 de 1887 (С. G. Pringle, 1573).

Gymnolomia patens, A Gr. in Proc. Am. Acad. v. p. 182.

Wedelia cordata, Hook, et Arn. Bot. Beceh. Voy. p. 435. Sta. Cruz (Est. de Jalisco), Julio de 1886 (M. Barceua).

var. abbreviata, Rob. et Greenm. n. var.

De 3 á 5 piés de altura. Barrancas de Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4595); Terrenos bajos. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 31 de 1891 (C. G. Pringle, 3937).

Gymnolomia rudis, GRAY.

var. minor, Rob. et Greenm. n. var.

Cerros pedregosos, cerca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 7 de 1893 (C. G. Pringle, 4584).

Gymnolomia squarrosa, Benth. et Hook. Gen. Pl. n. p. 362. Zaluzania squarrosa, Schz. Bib. in Flora, 1864, p. 217. Bancos de las barrancas, cerca de Guadalajara, Octubre 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2474).

Gymnolomia triloba, Pers. in hb. Pringle.

Llanuras, Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosi), Julio 2 de 1891 (C. G. Fringle, 4026).

Sclerocarpus uniserialis, Bentu, et Hook, Gen. Pl. II, p. 364. Gymnobsis uniserialis, Hook, Ic. Pl. t. 145.

Sta. Cruz (Est. de Jalisco), Julio de 1886 (M. Barcena); Cerros cerca de Monterrey (Esr. de Nuevo León). Junio 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2707).

Montanoa arborescens, DC. Prodr. v. p. 505.

Montanog atriplicifolia, Scuz. Bib. in Seem. Bot. Vov. "Herald," p. 304.

Verbesina atriplicifolia, Juss. et Desf. ex DC. Prodr. v. 613. Cerros de Zacatecas, Octubre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 3935). Montanoa floribunda, DC. Prodr. v. p. 564.

Eriocoma floribunda, H.B.K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 267. t. 396. N. V. Zuapatli. Mex. Cihuapatli.

Barranca del Salto, Amecameca (Est. pe México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Montanoa frutescens, MAIRET; DC. Prodr. v. p. 565.

Cañadas frias de las montañas, cerca de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Octubre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4270).

Montanoa grandiflora, DC. Prodr. v. p. 565.

Barranca de Malinaltenango (Est. DE México), Enero de 1886 (M. Villadà); De 6 à 10 piés de altura. Cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 22 y Noviembre 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3306).

Montanoa patens, A. Gr. in lib. Pringle.

Flor grande.

Valle de Tuxpan, Sta. Cruz, Octubre 3 de 1886; La Barranca (Est. De Jalisco), Julio de 1886 (M. Barcena); Barranca (Est. DE JALISCO), Septiembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 4042).

Montanoa tomentosa, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. u. p. 11; DC. Prodr. v. p. 564.

Montanoa heterophylla, Schrad, in Linnæa x. Literatur, p. 70. Eriocoma fragaus, Sweet, Brit. Fl. Gard, ser. 2, t. 44. N. V. Zuapatli.

Chapultepec y Cerro de Guadalupe (Valle de Mèxico), Septiembre de 1883 (M. Urbina); Cerros pedregosos cerca de Cárdenas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3307); Cañada de Río Hondo (Est. de Mêxico), Agosto 21 de 1890 (C. G. Pringle, 3155); De 5-8 piés. Monte Albán, á 5,800 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4969).

Rudbeckia columnaris, Pursh. Fl. Bor. Am. n. p. 575; Bot. Mag. t. 1601.

Obeliscaria columnaris, DC. Prodr. v. p. 559.

Llanuras, Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 2 de 1891 (C. G. Pringle, 4023).

Rudbeckia tagetes, A. GRAY in hb. Pringle.

Paso del Norte (Est. de Chihuahua), Mayo 30 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Tetragonotheca texana, Enc. et Gray in hb. Pringle.

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 1.º de 1889

(C. G. Pringle, 2653).

Mirasolia scaberrima, Benth. et Hook. Gen. Pl. n. p. 368.

Tithonia scaberrima, Benth. in Vidensk. Meddel. 1852, p. 91.

Anual: varas floribundas

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena); La Barranca, Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena); Un arbusto de 3-10 piés. Cerro del Borrego, Orizaba, á 4,500 piés (Est. de Veracruz), Enero 20 de 1895 (C. G. Pringle, 6087).

Iostephane heterophylla, BENTII. in Benth. et Hook. Gen. Pl. II. p. 368.

Coreopsis heterophylla, CAV. Ic. t. 268.

Echinacea heterophylla, Don in Sweet. Brit. Fl. Gard. ser. 2. t. 32.

Lígulas rojas y obscuras.

Sta. Cruz, Valle de Tuxpan (Est. de Jalisco), Julio de 1886 (M. Búrcena); Bajo las encinas, cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Agosto de 1893 (C. G. Pringle, 4480).

- Iostephane trilobata, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 169.
 Sierra de Clavellinas, á 8,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre
 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4978).
- Borrichia frutescens, DC. Prodr. v. p. 489.

Diomedea bidentata, Cass. Dict. xm. p. 283; Dill. Hort. Elth. 1. t. 38, fig. 44; Catesb. Carol. 1. t. 93.

Trimetra ficoidea, Moc. DC. Prodr. vn. p. 262; Calq. des Dess. Fl. Mex. 676?

Praderas alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosi), Junio 27 de 1891 (C. G. Pringle, 3757).

Aspilia angustifolia, GRAY in hb. Pringle.

De 3 á 5 piés. Cerros de Tequila (Est. De Jalisco), Septiembre 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4614).

Aspilia mexicana, Bentu. et Hook. Gen. Pl. n. p. 372.

Wirtgenia mexicana, Scuz. Bib. in Scem. Bot. Voy. "Herald," p. 304.

Barranca de Beltrán (Est. de Jalisco), Enero de 1886 (M. Bárcena).

Zexmenia aurea, Bentu. Gen. Pl. II. p. 373.

Wedelia? aurea, D. Don. Bot. Mag. 3384.

Verbesina aurea, DC. Prodr. v. p. 613.

Praderas, Flor de María (Est. DE México), Septiembre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3239).

Zexmenia brevifolia, GRAY Pl. Wright. 1. p. 112.

Sierra de la Silla (Est. de Nuevo León), cerca de Monterrey, Junio 5 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Zexmenia ceanothifolia, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 305.

Verbesina ceanothifolia, Will. Sp. Pl. III. p. 2225.

Lipochæta umbellata, DC. Prodr. v. p. 610; Deless. Ic. Sel. iv. t. 36.

Cerros cerca de Guadalajara, Septiembre 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2301).

Zexmenia fasciculata, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 172. Lipochæta fasciculata, DC. Prodr. v. p. 610.

Barranca de las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 23 de de 1891 (C. G. Pringle, 3753).

Zexmenia greggii, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 113.

Barranca cerca de Guadalajara, Noviembre 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2742).

Zexmenia lantanifolia, Scuz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 305.

Lipochæta lantanifolia, Schauer in Linnæa xix. p. 729.

Capas calizas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosú, Julio 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3062).

Oyedæa ovatifolia, A. Gr. in Proc. Am. Acad. v. p. 183.

Un arbusto trepador de 10 á 20 piés de largo.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 6 de 1890 (C. G. Pringle, 3212).

Wyethia mexicana, WATSON in hb. Pringle.

Faldas de la Sierra Madre (Est. de Nuevo León), Junio 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2704).

Tithonia brachypappa, Ros.

De 6-10 piés. Cerros calizos. Las Palmas (Est. de S. Luis Potosi), Abril 27 de 1894 (C. G. Pringle, 6143).

Tithonia macrophylla, Watson n. sp. in hb. Pringle.

Flor de color naranjado.

La Barranca (Est. DE JALISCO), Octubre de 1886 (M. Barcena), loc. cit. Septiembre 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2798 y 4601).

Tithonia tubæformis, Cass. Dict. xxxv. p. 277; DC. Prodr. v. p. 584.

Helianthus tubæformis, ORT. Dec. p. 101; Bot Reg. t. 1519.

N. V. Girasol, Acahuatl.

Chapultepec (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Viguiera blepharolepis, Gray in hb. Pringle.

Cerros pedregosos, cerca de Tequila (Est. DE JALISCO), Octubre 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4546).

Viguiera buddleiæformis, Bentil. et Hook. Gen. Pl. II. p. 375. Helianthus buddleiæformis, DC. Prodr. v. p. 588.

Tithonia angustifolia, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 435.

Chapultepec y S. Ángel (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de

1883 (M. Urbina); Cañada de Tultenango (Est. de México), Octubre 17 de 1890 (C. G. Pringle, 3314).

Viguiera cordifolia, A. Gr. Pl. Wright, I. p. 107; II. p. 88. Cerros (Est. de Chinuanua), Junio 3 de 1885 (C. G. Pringle,)

Viguiera decurrens, GRAY in hb. Pringle.

Montañas cerca de Chihuahua, Septiembre 29 de 1886 (C. G. Pringle, 1063).

Viguiera dentata, Spreng. Syst. m. p. 15; DC. Prodr. v. p. 579.

Helianthus dentatus, Cav. Ic. m. p. 10, t. 220.

Escuela de Agricultura (Valle de México), Agosto de 1883 (M. Urbina).

Viguiera excelsa, Велтн. et Ноок. Gen. Pl. II. p. 375. Helianthus excelsus, Willd. Sp. Pl. III. p. 2243.

Tithonia excelsus, DC. Prodr. v. p. 585.

Helianthus giganteus, Cav. Ic. t. 219, non Linn. nee Lour. S. Ángel (Valle de México), Octubre de 1886 (M. Urbina).

Vigueria grammatoglossa, DC. Prodr. v. p. 580.

Gruta de Cacahuamilpa (Est. de Guerrero), Enero de 1886 (M. Villada).

Vigueria helianthoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 226, t. 379.

Viguiera laxa, DC, Prodr. v. p. 580; A. Gr. Pl. Wright, II. p. 89. Viguiera brevipes, DC, Prodr. v. p. 579.

Vigniera texana, Torr. et Gray Fl. N. Am. II. p. 318.

S. Angel (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Viguiera linearis, Schz. Bib. MSS. in hb. Kew. Leighia linearis, DC. Prodr. v. p. 581.

Helianthus linearis, Cav. Ie. 111. p 9, t. 218; Bot. Reg. t. 523. Helianthus squarrosus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. t. 377.

N. V. Romerillo: sirve para techar y como forraje.

Cerros de Guadalupe y S. Ángel (Valle de México), Septiembre 15 de 1885 (M. Urbina); Llanuras cerca de Chihuahua, Noviembre 11 de 1886 (C. G. Pringle, 898).

Viguiera pringlei, Rob. et Greenn. n. sp. in hb. Pringle.
Arbusto de 5 à 10 piés de altura. Cerros cerca de Zapotlán
(Est. de Jalisco), Mayo 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4365).

Viguiera quinqueradiata, GRAY in hb. Pringle.

Cerros pedregosos cerca de Guadalajara, Septiembre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 4043).

Viguiera tenuis, GRAY in hb. Pringle.

Laderas cerca de Guadalajara, Octubre 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2719).

Helianthus annus, LINN.

N. V. Maiz de Tejas; Girasol.

Aclimatada en los jardines.

Tula (Est. de Hidalgo), Noviembre de 1883 (M. Urbina).

Helianthus ciliaris, DC. Prodr. v. p. 587; A. Gr. in Proc. Am. Acad. 1862, p. 164.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Helianthus laciniatus, GRAY Pl. Fendl. p. 84.

Paso del Norte (Est. de Chihuahua), Junio 8 de 1892 (C. G. Pringle, 5237).

Helianthus cernua, Венти. et Ноок. Gen. Pl. и. р. 376.

Flourensia cernua, DC. Prodr. v. p. 593.

Llanos (Est. de S. Luis Potosi), Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 5243).

Perymenium cervantesii, DC. Prodr. v. p. 609.

Salamanca (EST. DE GUANAJUATO), Septiembre de 1884 (D. Cano); Cuautla (EST. DE MORELOS), Agosto de 1885 (M. Urbina); Flor de María (EST. DE MÉXICO), Agosto 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3169).

Perymenium discolor, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gcett. 1830; DC. Prodr. v. p. 608, excl. syn.

De 10 á 15 piés. Faldas de la Sierra de S. Felipe, á 6,000 piés (Est. De Oaxaca), Septiembre 7 de 1894 (C. G. Pringle, 4650).

Perymenium mendezii, DC. Prodr. v. 608.

Lomas de las Cañadas, cerca de Guadalajara, Octubre 11 de 1889 (C. G. Pringle, 2338).

Perymenium parvifolium, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 36. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Perymenium tenellum, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 36. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Melanthera hastata, Rich. in Michx. Fl. Bor-Am. II. p. 106; DC. Prodr. v. p. 545.

Rascón (Est. de S. Luis Potosí), Junio 22 de 1891 (C. G. Pringle, 5294).

Melanthera deltoidea, Rich in Michx, Fl. Bor-Am. u. p. 106 (sub *Melananthera*); DC. Prodr. v. p. 545.

Calca aspera, JACQ. Ic. Pl. Rar. t. 583.

N. V. Canilla de mulito; Mulito.

Alrededores de S. Juan Bautista (Est. de Tabasco), Abril 12 de 1888 (J. N. Rovirosa).

Encelia amplexicaulis, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 183. Simsia amplexicaulis, Pers. Ench. n. p. 478; DC. Prodr. v. p. 578.

Coreopsis amplexicaulis, Cav. Descr. Pl. p. 226; Ait. Hort. Kew. v. p. 134.

Chapultopoc (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Encelia cordata, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 183.

Simsia cordata, Cass. Dict. lix. p. 137; DC. Prodr. v. p. 578. Ximenesia cordata, H. B. K. Nov. Gen. ct Sp. iv. p. 228.

Anual: varas gruesas floribundas.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bürcena).

Encelia glutinosa, Rob. et Greenm. n. sp.

De 10-15 piés. Cañón de las Hoyas, á 4,500 piés (Est. De Oaxaca), Noviembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 6024).

Encelia hypargyrea, Rob. et Greenm. n. sp.

De 5-15 piés. Capas calizas. Cañón de La Hoya, á 5,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 6 (42).

Encelia lagascæformis, A. Gr. in litt.

Simsia lagascæformis, DC. Prodr. v. p. 577 S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Encelia mexicana, Mart. ex DC. Prodr. v. p. 578.

Simsia auriculata, DC. Prodr. v. p. 577.

N. V. Acahuatl.

De 3 á 8 piés. Chapultepec (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de 1883 (M. Urbina); Campos y bosques de Tequila (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1883 (C. G. Pringle, 4602, 4622).

Encelia rhombifolia, Rob. et Greenm. n. sp.

De 3-4 piés. Cerros calizos y secos. Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4813).

Encelia sanguinea, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 185. Simsia sanguinea, Gray Pl. Wright, t. p. 107. Herbácea de flores moradas.

La Barranca, cerca de Guadalajara, Octubre de 1886 (M. Bárcena); Septiembre de 1891 (C. G. Pringle, 4044).

Encelia subaristata, A. Gr. in litt.

Simsia subaristata, A. Gr. Pl. Fendl. p. 84.

Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 1.º de 1889 (C. G. Pringle,)

Helianthella mexicana, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 37. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Helianthella pringlei, GRAY in hb. Pringle,

Cuestas cerca de Chihuahua, Septiembre 18 de 1886 (C. G. Pringle, 1056).

Verbesina alata, Linn. Sp. Pl. p. 1270; DC. Prodr. v. p. 617; Bot. Mag. t. 1716).

Hamalium alatum, Cass. Dict. xx. p. 261.

Arbusto ramoso,

N. V. Capitaneja.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena).

Verbesina capitaneja, Nees. in Linnæa xix. p. 729.

Actinomeris pedunculosa, DC. Prodr. v. p. 576.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Cuestas pedregosas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3215).

Verbesina chihuahuensis, GRAY in hb. Pringle.

Montañas, Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Septiembre 15 de 1889 (С. G. Pringle, 2782).

Verbesina coahuilensis, GRAY in hb. Pringle.

Capas calizas, Montañas de Paso de Carneros (Est. de Coauula), Septiembre 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3268).

Verbesina crocata, Less. Synop. p. 232; DC. Prodr. v. p.

Bidens crocata, CAV. Ic. t. 99.

Spilanthes crocata, Sims. Bot. Mag. t. 1627.

Platypteris crocata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 201.

N. V. Capitaneja; Mex. Nahuitiput.

Ajusco (Valle de México), Junio de 1886 (M. Urbina).

Verbesina encelioides, BENTH. et HOOK. Gen. Pl. H. p. 380.

Ximenesia encelioides, Cay, Ic. 11. p. 60, t. 178.

S. Diego. Sur de S. Luis Potosi, Diciembre de 1881 (D. Cano).

Verbesina fraseri, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 187, t. Slylli (*Platypteris*).

Atlixeo (Est. de Puebla), Noviembre de 1886 (J. M. Velasco).

Verbesina oncophora, Rob. et Sea n. sp.

Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4310).

Verbesina persicifolia, DC. Prodr. v. p. 614.

Cañon de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), Junio 13 de 1890 (C. G. Pringle, 3078).

Verbesina pinnatifida, Cav. Ic. 1. p. 67, t. 100; DC. Prodr. v. p. 615.

Verbesina nicaraguensis, Benth. in Vidensk. Meddel. 1852, p. 97.

Arbusto de hojas grandes, de 25 á 30 centímetros.

Barranca de Beltrán (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Barcena); Cuestas cerca de Patzeuaro (Est. de Michoacáx), Noviembre 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3475).

N. V. Ocotiol. En el Estado de Morelos. (Altamirano).

Verbesina platyptera, KLATT? in hb. Pringle.

Cañadas fértiles, montañas cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Diciembre 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3983).

Verbesina potosina, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Mesas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosi), Julio de 1891 (C. G. Pringle, 5113).

Verbesina pringlei, Rob. n. sp.

Sitios agrestes y pedregosos de la Barranca, cerca de Guadalajara (Esr. de Jalisco), Septiembre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3845).

Verbesina salicifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 205. Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 29 de 1889 (C. G. Prin-

gle, 2730).

Verbesina sericea, Kuntii et Bouche in Ind. Sem. Hort. Berol. 1848; Walp. Ann. II. p. 867.

Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 5,800 piés. Septiembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4863).

Verbesina serrata, Cav. Ic. III. p. 7, t. 214; DC. Prodr. v. p. 613.

N. V. Palo ceniso.

S. Juan del Río (Est. de Querétaro), Septiembre 6 de 1884 (M. Urbina).

Lomas que limitan el Lago de Cuitzeo (Est. de Michoacán), Agosto 5 de 1892 (C. G. Pringle, 4114).

Verbesina sinuata, Ell.

Arbusto de flor blanca y tallo alado.

Nevado de Colima, Octubre de 1886 (M. Bárcena).

Verbesina sphærocephala, A. Gr. in hb. Pringle.

N. V. Capitaneja.

El Gachupín, La Barranca (Est. DE JALISCO), Octubre de 1886 (M. Bárcena); Cuestas cerca de Guadalajara, Octubre 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2734).

Verbesina stricta, GRAY in hb. Pringle.

Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Agosto 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3464); Entre las encinas, cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Agosto 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4136).

Verbesina tetraptera. A. Gr. in hb. Pringle.

Cuestas. Cañada de Río Hondo (Est. de México), Agosto 26 1890 (C. G. Pringle, 3151).

Verbesina virginica, L.

García, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 5298).

Verbesina wrightii, GRAY in hb. Pringle.

Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Septiembre 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2640).

Otopappus acuminatus, Watson sp.

La Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3837).

Otopappus alternifolius, Rob. n. sp.

Cerros calizos, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3310).

Spilanthes alba, Willd. Sp. Pl. III. p. 1714; DC. Prodr. v. p. 625.

Bidens ocymifolia, LAMK. III. t. 668, fig. 3.

Monte León (Est. de Michoacán), Noviembre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4340).

Spilanthes beccabunga, DC. Prodr. v. p. 622.

Flor de María (Est. de México), Agosto 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3043).

Spilanthes bicolor, Benth, et Hook, Gen. Pl. 11, p. 381.

Mendezia bicolor, DC. Prodr. v. p. 553; Deless. Ic. Sel. iv. 1,29.

S. Pedro, Llano de Belén (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena).

Spilanthes botterii, Watson in hb. Pringle.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Noviembre 10 de 1892 (C. G. Pringle, 4341).

Spilanthes karwinskiana, DC. Prodr. v. p. 623.

S. Ángel (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1886 (M. Urbina).

Spilanthes sp.

N. V. Tripa de pollo; Peritre.

Atzcapotzalco y en todo el Valle. Octubre de 1884 (M. Urbina).

Salmea grandiceps, Cass. Dict. xLvn. p. 88; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 375.

Salmea cupatoria, et scandens, DC. Prodr. v. p. 493.

Bidens scandens, Linn. Bot. Mag. t. 2062.

Sta. Cruz, Valle de Túxpam (Est. DE Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena).

Salmea palmeri, Warson in hb. Pringle.

Cañadas cerca de Guadalajara, Octubre de 1889 (C. G. Pringle, 2345).

Salmea sp.

Planta de 2 á 3 metros, erguida, común en el camino de S. Juan Bautista (Est. de Tabasco), Marzo 25 de 1888 (J. N. Rovirosa).

Hymenostephium mexicanum, Benth. et Hook. Ic. Pl. t. 1154. Arbusto de flor amarilla.

La Barranca, cerca de Guadalajara, Octubre 3 de 1886 (M. Bárcena).

Synedrella vialis, A. Gr. in hb. Pringle.

Planta rastrera: en las calles de Guadalajara y Cañada de Querétaro, Agosto de 1886 (M. Bárcena); Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosí), Agosto 29 de 1891 (C. G. Pringle, 3899).

Heterospermum pinnatum, Cav. Ic. 111. t. 267; DC. Prodr. v.. p. 632.

Tacubaya y Cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Heterospermum tagetinum, A. GR.

Cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Agosto de 1884 (M. Urbina).

Coreopsis linearifolia, DC. Prodr. v. p. 570.

S. Ángel (Valle de México), Noviembre de 1885 (M. Urbina). Coreopsis mutica, DC. Prodr. v. p. 571.

Faldas del Volcán de fuego (Est. de Colima), Enero de 1887 (M. Bárcena),

Coreopsis petrophyla, A. Gr. in hb. Pringle.

Sitios agrestes y pedregosos del Rio Grande de Santiago, cerca de Guadalajara, Septiembre 30 de 1889 (C. G. Pringle, 2303).

Leptosyne mexicana, GRAY in hb. Pringle.

Por los arroyos, cerca de Guadalajara, Septiembre 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3841).

Leptosyne pinnata, Ros. in hb. Pringle.

Praderas húmedas, Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 19 de 1892 (C. G. Pringle, 4194).

Leptosyne pringlei, Rob. et Greenm. n. sp.

Sierra de S. Felipe, a 7,000 pies (Est. de Oaxaca), Agosto 7 de 1894 (C. G. Pringle, 4871).

Dahlia coccinea, Cav. Ic. III. p. 33, t. 266; Bot. Mag. t. 362.

Georgina coccinea, WILLD. Hort. Berol. II. t. 96.

Georgina frustranea, DC. Ann. du Mus. xv. p. 310.

Dahlia bidentifolia, SALISB. Parad. Lond. t. 19. Dahlia cervantesii, LAG. in DC. Prodr. v. p. 494?

Georgina cervantesii. Sweet. Brit. Fl. Gard. ser. 2. 1, t. 22?

Bordes y bancos, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Agosto de 1890 (C. G. Pringle, 3166).

Dahlia dissecta, Watson n. sp.

Capas calizas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosf), Julio de 1890 (C. G. Pringle, 3167).

Dahlia merckii, Lunm. Delect. Sem. Hort. Hamb. 1839; Linnæa xiv, Literaturb. p. 130.

Dahlia glabrata, Lindl. Bot. Reg. 1840, t. 29; Bot. Mag. t. 3878.

Dahlia minor, Visiaxi Nuovi Saggia della Acad. Sc. Fis. de Padova v. p. 263.

Dahlia decaisneana, Verlot. in Rev. Hort. 1864, p. 31, eum icone col.

Capas frias de la cima, Montañas cerca de Pátzeuaro (Est. de Michoacán), Julio 29 de 1892 (C. G. Pringle, 4162).

Dahlia pubescens, Warson n. sp.

Praderas calizas, Flor de María, Agosto 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3164).

Dahlia variabilis, Desp. Cat. Hort. Par. ed. 3, p. 182; DC. Prodr. v. p. 494.

Georgina variabilis, Willd. Hort. Berol. II, tt. 93-95.

Dahlia superflua, Air. Hort. Kew. ed. 2. v. p. 87.

Dahlia crocata, LAG. Elench. p. 31.

Georgina superflua, DC. in Ann. du Mus. xv. p. 310.

Dahlia pinnata, CAV. Ic. Pl. 1. t. 80.

Dahlia rosea, Cav. Ic. Pl. III. t. 275.

Dahlia sambucifolia, Salisb. Parad, Lond. t. 16,

Corcopsis georgina, Cass. Dict. xviii. t. 441.

N. V. Dalia silvestre & Charahueso.

Barranca del Salto, Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina); Faldas del Volcán de Fuego (Est. de Colma), Octubre de 1886 (M. Bárcena); Cuestas, Cañada de Rio Hondo (Est. de México), Agosto 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3165).

Hidalgoa ternata, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. i. p. 15; Less. in Linnæa vi. p. 213.

Hidalgoa lessingii, DC. Prodr. v. p. 511.

Melampodium? ternatum, DC. Prodr. v. p. 521.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Cosmos bipinnatus, Cav. Ic. Pl. 1. p. 2, t. 14; DC. Prodr. v. p. 606.

Georgia bipinnata, Spreng. Syst. Ht. t. 611.

Coreopsis formosa, Bonato in Diss. Pisaur. p. 21, t. 2.

Bidens formosa, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 307. var. alba.

Вот.-43

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena).

var. parviflorus, A. Gr. Pl. Wright. II. p. 90; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 241 (species).

Bidens humboldtii, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 307.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Cosmos caudatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 240; DC. Prodr. v. p. 606.

Bidens caudata, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 308. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Cosmos crithmifolius, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 242. Terrenos secos, cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacan), Oc-

tubre 10 de 1892 (C. G. Pringle, 4259).

Cosmos purpureus, Benth. et Hook. Gen. Pl. 11. p. 387.

Bidens purpurea, DC. Prodr. v. p. 604.

El Gachupín (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena). Cosmos scabiosoides. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 242.

Bidens scabiosoides, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 308.

Sta. Cruz, Valle de Túxpan (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena); Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 4263).

Cosmos sulphurens, Cav. Ic. Pl. I. p. 56, t. 79; DC. Prodr. v. p. 606.

Coreopsis artemisiæfolia, JACO. Ic. Pl. Rar. 111. t. 595.

Bidens sulphurea, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 308,

N. V. Girasol amarillo.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Barcena); Cuestas cerca de Guadalajara, Septiembre 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4516).

Cosmos tenuifolius, Lindl. Bot. Reg. t. 2007.

Bidens lindleyi, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy.;"Herald," p. 307. N. V. Mirasol.

Arroyo de Enmedio (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena).

Bidens angustissima, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 233; DC. Prodr. v. p. 601.

N. V. Cinco llagas.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Barcena).

Bidens anthriscoides, DC. Prodr. v. p. 600.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Bidens dahlioides, Watson.

Cuestas de S. Juan del Estado, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 2 de 1894 (C. G. Pringle, 4777).

Bidens decolorata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 233.

Cerro de las Campanas (Est. de Querétaro), Noviembre 25 de 1885 (M. Urbina).

Bidens ferulæfolia, DC. Prodr. v. p. 603.

Coreopsis ferulæfolia, Jaco. Hort. Schænb. t. 375; Bot. Mag. t. 2059).

Sierra de S. Felipe, á 10,300 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 4915).

Bidens fœniculifolia, DC. Prodr. v. p. 603.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1881 (D. Cano).

Bidens grandiflora, Balb. Cat. Hort. Taur. 1812, p. 19; DC. Prodr. v. p. 602.

Bidens odorata, Dum. Cours. Bot. Cult. IV. p. 241, nec Cav.

Coreopsis diversifolia, Jacq. Elog. p. 80, t. 54.

Cosmea lutea, Sims. Bot. Mag. t. 1689.

Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4313).

Bidens helianthoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 230; DC. Prodr. v. p. 595.

Kerneria helianthoides, Cass. Diet. xxiv. p. 399.

Chapultepec (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Bidens heterophylla, Orr. Dec. p. 99, t. 12; DC. Prodr. v. p. 597. Bidens arguta, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 231.

Huertas de Querétaro, Septiembre 1.º de 1884 (M. Urbina); Praderas húmedas (Est. de Chihuanua), Septiembre 27 de 1886 (C. G. Pringle, 758).

Bidens inermis, Watson n. sp.

Base de la Sierra Madre (Est. DE Chihuanua), Octubre 2 de 1888 (C. G. Pringle, 1638).

Bidens ludens, GRAY n. sp.

Cerros de Chihuahua, Octubre 31 de 1885 (C. G. Pringle, ...)

Bidens ostruthioides, Scuz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 308.

Delucia ostruthioides, DC. Prodr. v. p. 633; Deless. Ic. Sel. Iv. t. 40.

Hac. de la Ascensión (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Bidens palmeri, GRAY in hb. Pringle.

Cerros cerca de Guadalajara (Est. de Jalisco), Noviembre 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2348).

Bidens pilosa, Linn. Sp. Pl. p. 1166; DC. Prodr. v. p. 597.

Bidens leucantha, Willis. Sp. Pl. III. p. 1719; DC. Prodr. v.

p. 598.

N. V. Té de milha blanco.

Chapultepec y todo el Valle de México, Septiembre de 1883 (M. Urbina); Volcán de fuego, á 3,500 metros (Est. de Colma), Septiembre de 1886 (M. Bárcena); S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Bancos sombreados, Sierra Madre (Еst. de Сишчануа), Septiembre 17 de 1887 (С. G. Pringle, 1574); De 4-6 piés. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 16 de 1894 (С. G. Pringle, 6050).

Bidens procera, Don. in Bot. Reg. t. 684; DC. Prodr. v. p. 603. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Bidens tenuisecta, GRAY.

Sierra Madre (Est. de Chimuanua), Octubre 4 de 1888 (C. G. Pringle, 3046).

Bidens tereticaulis, DC. Prodr. v. p. 598.

Bidens squarrosa, Less. in Linnæa v. p. 156.

Bidens coreopsides, DC. Prodr. vn. p. 599.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), Noviembre 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3373).

Bidens tetragona, DC. Prodr. v. p. 596.

Coreopsis tetragona, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. 1. p. 31. N. V. Të de milpa amarillo.

Chapultepec y todo el Valle, Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Chrysanthellum procumbens, Pers. Syn. Pl. u. 471; DC. Prodr. v. págs. 630, 631, species 4; Deless. Ic. Sel. iv. t. 39; Reich. Icon. Exot. t. 66.

Chrysanthellum integrifolium, Steetz in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 160?

La Presa (Est. DE Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bárcena, 120, 160); Bancos de las Barraneas, cerca de Guadalajara, Septiembre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3259).

Gallinsoga parviflora, Cav. Ic. Pl. III. p. 41, t. 281; DC. Prodr. v. p. 677.

N. V. Estrellita.

Chapultepec y faldas del Cerro de Guadalupe, Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Calea albida, A. Gr. in Proc. Amer. Acad. xv. p. 38. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Calea axillaris, DC. Prodr. v. p. 673.

Mociuna serrata, Lag. Nov. Gen. p. 31.

N. V. Ponchishui o Yerba de la rabia,

Muy amarga y parecida en su acción medicinal al Sacachichic. Soconusco (Est. de Chiapas), Octubre de 1883 (Montes de Oca).

Calea cacosmoides, Less. in Linnæa v. p. 157; DC. Prodr. v. p. 674.

N. V. Jarilla.

Se usa para formar nidos á las gallinas y evitar los corucos. Jalapa (Est. de Veracruz), Enero de 1885 (Montes de Oca).

Calea elegans, DC. Prodr. v. p. 674.

Oteiza acuminata, Llav. Reg. Trim. Mex. 1832, p. 41.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffuer); Cañada de Tultenango (Est. de México), Octubre 31 de 1892 (C. G. Pringle, 4297).

Calea integrifolia, HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. 11, p. 205.

Allocarpus integrifolius, DC. Prodr. v. p. 676.

Arbusto de 6-8 piés. Sierra de S. Felipe, á 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Enero 3 de 1895 (C. G. Pringle, 6111).

Calea manicata, Benth. et Hook. Gen. Pl. II. p. 391.

Tetrachyron manicatum, Schl. in Linnæa xix. p. 744.

Cerro del Borrego, arriba de Orizaba, á 4,500 piés (Est. de Veracruz), Febrero 7 de 1895 (C. G. Pringle, 6133).

Calea scabrifolia, Bentil. et Hook. Gen. Pl. iv. p. 391.

Allocarpus scabrifolius, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 300.

Ferdinanda oppositifolia, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 303, errore Zaluzania, Benth. et Hook. loc. cit.

Atlixco (Est. de Puebla), Noviembre de 1886 (I. M. Velasco).

Calea palmeri, Gray in Proc. Am. Acad. xxii. p. 430.

Cerros cespitosos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4125).

Calea peduncularis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 295, t. 408. Calydermos peduncularis, DC. Prodr. v. p. 669.

Calebrachys peduncularis, Cass. Dict. Lv. p. 257.

Calydermos longifolius, LAG. Nov. Gen. p. 24?

Calydermos scaber, LAG. loc. cit?

var. longifolia, Gray in Proc. Am. Acad. xxII. p. 430.

Bancos arenosos y húmedos de las cañadas, cerca de Guadalajara, Octubre 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2326).

Calea salmiæfolia, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 206.

Calydermos salmiæfolius, DC. Prodr. v. p. 670.

Cerros calizos, Las Canoas (Est. de Jalisco), Octubre 30 de 1891 (C. G. Pringle, 3936).

Calea urticæfolia, DC. Prodr. v. p. 674.

Caleacte urticæfolia, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. p. 109.

N. V. Yerba de la paloma; Otomí, Pashcuanc,

Entre Tejupilco y Luvianos (Est. DE México), Febrero de 1886 (M. Villada); Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2729),

Calea zacatechichi, Schl. in Linnæa ix. p. 589.

N. V. Sacachichic.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Septiembre de 1881 (D. Cano); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Enero de 1887 (M. Barcena, 484); Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 14 de 1889 (C. G. Pringle, 2475).

Tridax balbisioides, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 39.

Galinsoga balbisioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 253. t. 386.

Sogalgina balbisioides, Cass. Dict. xLix. p. 398.

Arcos de la Tlaxpana (Valle de Mèxico), Octubre de 1883 (M. Urbina).

var. tenuifolia, GRAY.

Bancos pedregosos y húmedos, cerca de Guadalajara, Mayo 3 de 1889 (C. G. Pringle, 2556).

Tridax bicolor, Gray P1. Fendl. p. 104.

Cerros cerca de Chihuahua, Septiembre de 1886 (C. G. Pringle, 948).

Tridax coronopifolia, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 207.

Ptilostephium coronopifolium, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 255, t. 387.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Tridax leptophylla, Gray in hb. Pringle.

Cerros secos de Chihuahua, Octubre 9 de 1886 (C. G. Pringle, 769).

Tridax palmeri, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 38.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina).

var. indivisum, Rob. et Sea, n. var. in hb. Pringle.

Tallos de 2 á 3 piés.

Bordes de las cañadas, montañas cerca del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Noviembre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4332).

Tridax procumbens, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 900; DC. Prodr. v. p. 679.

Amellus pedunculatus, Ort. ex Willd.

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 20 de 1889 (C. G. Pringle, 2714).

Tridax trifida, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 39.

Ptilostephium trifidum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 255, t. 388.

var. alboradiata, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 39.

Cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de 1881 (M. Urbina); La Piedad (Est. DE MICHOACÁN), Septiembre 18 de 1892 (C. G. Pringle,.....); Praderas húmedas, cerca de Guadalajara, Agosto 22 de 1893 (C. G. Pringle, 4498).

Tridax trilobata, Hensl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 208.

Galinsoga trilobata, CAV. Ic. Pl. III. p. 42, t. 282; Bot. Mag. t. 1895; SWEET. Brit. Fl. Gard. t. 56.

Sogalgina trilobata, Cass. Dict. xLix. p. 397; DC: Prodr. v. p. 678.

Escuela de Agricultura (Valle de México), Mayo de 1881 (M. Urbina); Sitios agrestes y calizos, Flor de María (Est. de México), Agosto 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3148), (aquenio sin vilano); Campos cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacan), Octubre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4271).

TRIBUS VI. HELENIOIDEÆ.

Jaumea peduncularis, Benth. et Hook. Gen. Pl. 11. p. 397.

Espejoa mexicana, DC. Prodr. v. p. 360.

Huellas arenosas de las corrientes, cerca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 15 de 1893 (C. G. Pringle, 4577).

Eutetras palmeri, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 40; Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 209, Tab. xlm, figs. 6-13.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1884 (D. Cano).

Eutetras sp. nov?

Acámbaro (Est. de Guanajuato), Noviembre de 1883 (D. Cano).

Perityle jaliscana, GRAY in hb. Pringle.

En las hendeduras de rocas graniticas, cerca de Guadalajara, Agosto 24 de 1893 (C. G. Pringle, 5382).

Perytile microcephala, GRAY n. sp. in hb. Pringle.

Cerros sombreados (Est. DE CHINUAHUA), Octubre 18 de 1886 (C. G. Pringle, 764).

Bæria gracilis, Gray var. in hb. Pringle.

Llanos (Est. de Sonora), Abril 4 de 1884 (C. G. Pringle, . . .)

Hecubæa scorzoneræfolia, DC. Prodr. v. p. 665; Deless. Ic. Sel. iv. t. 43.

Helenium scorzonerafolia, var. ghiesbreghtii, A. Gr. in Proc. Am. Acad. vii. p. 359.

Praderas húmedas, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4207),

Baileya multiradiata, Harv. ct Gray in A. Gr. Pl. Fendl. p. 106.

N. V. Palancapatli, usada para curar las ulceraciones.

Chihuahua, Septiembre de 1888 (P. Canseco); Paso del Norte (Est. DE Синианиа), Abril 25 de 1893 (С. G. Pringle,...)

Riddellia tagetina, Nutr. in Trans. Am. Phil. Soc. ser. 2, vu. p. 371, ex Torr. &. Gr. Fl. N. Am. H. p. 362; Torr. in Emory's Rep. App. t. 5.

García, cerca de Monterrey, Noviembre 5 de 1892 (C. G. Pringle, 5299).

Hymenopappus flavescens, A. Gr. Pl. Fendl. p. 97.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Cerros arenosos cerca del Paso del Norte (Est. de Chinuanua), Septiembre 23 de 1886 (C. G. Pringle, 759).

Bahia absinthifolia, Benth. Pl. Hartw. p. 18.

var. dealbata, GR. in hb. Pringle.

Paso del Norte (Est. de Chinuanua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,....)

Bahia anthemoides, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 40.

Achyropappus anthemoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 259, t. 390.

Campos, Estación de Río Hondo (Est. DE México), Agosto 21 de 1890 (C. G. Pringle, 3143).

Bahia neo-mexicana, Gray in hb. Pringle.

Cerros áridos (Est. de Chihuahua), Octubre 9 de 1886 (C. G. Pringle, 773).

Bahia schaffneri, Watson.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel);
S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Mesas arenosas, cerca de S. Luis Potosi, Septiembre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3266).

Bahia schkuhrioides, Gray in hb. Pringle.

Valle de Lerma, eerca de la Piedad (Est. DE MICHOACÁN), Septiembre 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3281).

Bahia sinuata, Less. in Linnea vi. p. 160; DC. Prodr. v. p. 656. Bahia nepetæfolia, A. Gr. in Proc. Am. Acad. v. p. 184.

Capas montañosas y estériles, Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosí), Junio 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3096).

Schkuhria abrotanoides, Rотн. Catal. г. р. 116; DC. Prodr. v. р. 654.

N. V. Anisillo.

Tlalpam (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1889 (M. Urbina).

Вот.-45.

Schkuhria glomerata, Rob. et Sea n. sp. in hb. Pringle.

Cerros de Rio Hondo (Est. de México), Septiembre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4289).

Schkuhria hopkirkia, GRAY Pl. Wright. II. p. 94.

Mesas (Est. de Chinuanua), Octubre 15 de 1886 (C. G. Pringle, 772).

Schkuhria platyphylla, Rob. et Greenm. n. sp.

Monte Albán, á 5,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4975).

Schkuhria pringlei, Warson n. sp. in hb. Pringle.

Llanos altos (Est. DE CHIIIUAIIUA), Octubre 8 de 1888 (C. G. Pringle,)

Schkuhria virgata, DC. Prodr. v. p. 654.

N. V. Anisillo.

Rio de los Morales (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina); Cerros calizos cerca de Etla, á 5,300 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4881).

Schkuhria wrightii, A. Gr. Pl. Wright. II. p. 96.

Mesas cerca de Carretas (Est. De Сишилнил), Septiembre 19 de 1888 (С. G. Pringle, 2001).

Hymenothrix palmeri, GRAY in hb. Pringle.

Suelo delgado y seco, montañas cerca de Chihuahua, Octubre de 1886 (C. G. Pringle, 762).

Florestina pedata, Cass. Dict. xvii. p. 155, t. 86; DC. Prodr. v. p. 655.

Stevia pedata, CAV. Ic. Pl. IV. t. 356.

Achyropappus pedatus, Less. Syn. Comp. p. 239.

Ageratum pedatum, ORT. Dec. p. 38.

Hymenopappus pedatus, LAG. Nov. Gen. p. 28.

Lomas de Tacubaya (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Palafoxia (polypteris) lindeni, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 120. N. V. Tostón en Cuba.

Se asegura que la semilla mata á los pollos. Laguna de Cocos (Est. de Veracruz), en terrenos arenosos á la orilla del mar, Febrero de 1883 (I. Ochoa).

Palafoxia texana, Gray in hb. Pringle.

Llanuras arenosas, Laredo (Texas), Julio 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2655).

Galeana hastata, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. i. p. 12; DC. Prodr. vii. p. 257.

Bancos de las barrancas, cerca de Guadalajara, Septiembre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3455).

Sartwellia mexicana, Gray in hb. Pringle.

Llanos de Jiménez (Est. de Cumuanua), Septiembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 5264).

Flaveria angustifolia, Pers. Ench. II. p. 489; DC Prodr. v. p. 635.

Milleria angustifolia, CAV. Ic. Pl. m. t. 223.

N. V. Yerba de la Barranca.

Anual. Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bârcena); Campos cerca de Puebla, Julio 27 de 1894 (C. G. Pringle, 4749).

Flaveria longifolia, Gray Pl. Fendl. p. 88.

Praderas alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Julio 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3767).

Flaveria repanda, Lag. Nov. Gen. p. 33.

Broteroa trinervata, Pers. Ench. II. p. 498; DC. Prodr. v. p. 635. Valle cerca de Irapuato (Est. de Guanajuato), Mayo 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2688).

Porophyllum coloratum, DC. Prodr. v. p. 650.

Kleinia colorata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 158; MART. Amœn. Monac. p. 23, t. 15.

N. V. Papaloquelite.

S. Cristóbal (Valle de México), Septiembre 23 de 1888 (F. Altamirano); Sitios agrestes y arenosos, cerca de Guadalajara, Octubre 31 de 1889 (C. G. Pringle, 2446); Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Septiembre 9 de 1883 (C. G. Pringle, 2397).

Porophyllum erbendbergii, Gray in hb. Pringle.

De 4 á 6 piés de altura.

Cerros pedregosos, Queréndaro (Est. DE MICHOACÁN), Octubre 25 de 1892 (C. G. Pringle, 4292).

Porophyllum filifolium, GRAY.

Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coanulla), Agosto 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3462).

Porophyllum macrocephalum, DC. Prodr. v. p. 648.

Cerros cerca de Cárdenas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3299).

Porophyllum pringlei, Rob. n. sp.

Barranca cerca de Guadalajara, Octubre 3 de 1891 (C. G. Pringle, 5168).

Porophyllum scoparium, Gray Pl. Wright. 1. p. 119.

Montañas de Jimuleo (Est. de Coahulla), Abril 9 de 1886 (C. G. Pringle, 866).

Porophyllum tagetoides, DC. Prodr. v. p. 650.

Kleinia tagetoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 158.

N. V. Papaloquilitl; Yerba del Venado.

Cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Porophyllum viridiflorum, DC. Prodr. v. p. 658.

Kleinia viridiflora, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 157.

Zuacuapan (Est. De Oaxaca), Abril de 1893 (F. Altamirano); Cerros cerca de Guadalajara, Diciembre 13 de 1888 (C. G. Pringle, 2461).

Dysodia appendiculata, LAG. Elench. Hort. Matr. Gen. et Sp. Nov. p. 29; DC. Prodr. v, p. 640.

Clomenocoma aurantia, Cass. Dict. Ix. p. 416; DC. Prodr. v. p. 641; Relig. Houst. (Aster). t. 18.

Chorrera, Río del Bobo, Cempoala (Est. de Veracruz), Enero de 1891 (M. Villada).

Dysodia cancellata, GRAY.

Llanuras cerca de Chihuahua, Septiembre 24 de 1885 (C. G. Pringle, 307%).

Dysodia chrysanthemoides, LAG. Hort. Matr. Gen. et Sp. Nov. p. 29; DC. Prodr. v. p. 640.

Dysodia tagetiflora, LAG. loc. cit.

Dysodia fastigiata, DC. Prodr. v. p. 640.

Bæbera chrysanthemoides, WILLD. Sp. Pl. 111. p. 2125.

Bæbera fastigiata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 198.

Tagetes papposa, VENT. Hort. Cels. t. 36.

Dysodia glandulosa, CAv. Dem. Bot. p. 202.

N. V. Flor del muerto.

Río de los Morales (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina); Llano del Carrizal (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro); Jimulco (Est. de Coahulla), Mayo 13 de 1885 (C. G. Pringle, 123); Cerros de Acámbaro (Est. de Guanajuato), Octubre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 5266).

Dysodia grandiflora, DC. Prodr. v. p. 640.

Comaclinium aurantiacum, Scheidw. et Planch. in Fl. des Serres, t. 756.

Clomenocoma montana, Benth. Pl. Hartw. p. 86; Bot. Mag. t. 5310.

Barranca de Malinaltenango (Est. DE México), Enero de 1886 (M. Villada).

Dysodia porophylloides, CAV.

Llanuras de Guadalajara, Noviembre 19 de 1889 (C. G. Pringle, 2745).

Dysodia pubescens, Lag. Elench. Hort. Matr. Gen. et Sp. Nov. p. 29; DC. Prodr. v. p. 640.

Dysodia integerrima, LAG. loc. cit.

Dysodia incana, DC, Prodr. v. p. 640.

Bæbera incana, Lindl. Bot. Reg. t. 1602.

Aster pinnatus, CAV. Ic. III. p. 6, t. 212.

Clomenocoma? pinnata, DC. Prodr. v. p. 641.

Entre Huehuetoca y Hac. de la Guiñada (Est. de México), Septiembre 23 de 1888 (F. Altamirano); Cerros de Zacatecas, Octubre 25 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Syncephalanthus decipiens, BARTL. Ind. Sem. Hort. Gœtt. 1836; DC. Prodr. vii. p. 262.

De 1-3 piés. Valle de Oaxaca, cerca de Etla, á 5,300 piés. Septiembre 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4882).

Hymenatherum acerosum, A. Gr. Pl. Wright. I. p. 115.

Dysodia (Aciphyllæa) acerosa, DC. Prodr. v. p. 641.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Mesas calizas, Los Charcos (Est. de S. Luis Potosí), Julio 1.º de 1891 (C. G. Pringle, 4025).

Hymenatherum berlandieri, DC. Prodr. v. p. 642.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Hymenatherum gnaphaliopsis, Gray Pl. Fendl. p. 115; Pl. Wright, r. p. 116

Cerros calizos cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2644).

Hymenatherum greggii, GRAY.

Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. DE COAHUILA), Septiembre 1.º de 1889 (C. G. Pringle, 2385).

Hymenatherum polychætum, A. GR.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); Llanuras cerca de Chihuahua, Noviembre 8 de 1886 (C. G. Pringle, 901).

Hymenatherum pentachætum, DC. Prodr. v. p. 642.

Cerros (Est. de Chihuahua), Abril 9 de 1885 (C. G. Pringle, 223).

Hymenatherum serratifolium, Hemls. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 221.

Dysodia serratifolia, DC. Prodr. v. p. 641.

Hymenatherum tenuifolium, Cass. Dict. xxII. p. 313; A. Gr. Pl. Wright, I. p. 118.

Hymenatherum tenuilobum, DC. Prodr. v. p. 642.

Llanuras arenosas, Laredo (Texas), Julio 5 de 1891 (C. G. Pringle, 4020).

Thymophyllum greggii, A. Gr. Pl. Fendl. p. 92; Pl. Wright. I. p. 119.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner).

Tagetes erecta, Linn. Sp. Pl. p. 1249; DC. Prodr. v. p. 643; La-MARK Ill. t. 684; Schk. Hand. t. 251.

Tagetes major, GÆRNT. Fr. t. 172.

N. V. Cempoalxóchitl grande.

Flor muy usada por los indios para adornar sus túmulos y muy apreciada por su esencia.

Cultivada en los jardines (VALLE DE MÉXICO), Noviembre de 1883 (M. Urbina).

Tagetes filifolia, LAG.

Montes de Ajusco (Valle de Mèxico), Septiembre de 1883 (M. Urbina); Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Septiembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3829).

Tagetes fœtidissima, DC. Prodr. v. p. 645.

Cerros cerca de Toluca (Est. de México), Octubre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4276).

Tagetes lucida, CAV. Ic. Pl. III. p. 33, t. 264; DC. Prodr. v. p. 643; Bot. Mag. t. 740; Andr. Bot. Rep. t. 359.

Tagetes florida, Sweet. Brit. Fl. Gard. ser. 2, t. 35.

N. V. Flor de Pericón.

Cerro del Pino (Valle de México), Octubre de 1884 (M. Urbina); Hac. de Flor de María (Est. de México), Octubre de 1892 (C. G. Pringle, 5262).

Tagetes lunulata, Ort. Dec. p. 44; DC. Prodr. v. p. 647.

N. V. Ciuco llagas.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Septiembre 20 de 1881 (M. Urbina).

Tagetes micrantha, Cav. Ic. Pl. Iv. p. 31, t. 352; DC. Prodr. v. p. 646.

Tugetes congesta, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 299.

N. V. Anisillo.

S. Ángel (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina); Base de la Sierra Madre (Est. de Chihuaiua), Septiembre 27 de 1888 (C. G. Pringle, 3047).

Tagetes patula, Linn. Sp. Pl. p. 1249; DC. Prodr. v. p. 643; Bot. Mag. t. 150.

Tagetes coryunbosa, Sweet. Brit. F1. Gard. t. 151.

Tagetes tenuifolia, H. B. K. non CAV.

N. V. Tlemolitos; Pastora.

Cultivada en las Huertas del Valle de México, Septiembre de 1884 (M. Urbina).

Tagetes peduncularis, Lag. et Rob. in Ann. Sc. Nat. v. p. 74; DC. Prodr. v. p. 644.

N. V. Cempoalxóchitl pequeño.

Chapultepec (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Urbina).

Tagetes pussilla, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 152.

N. V. Anisillo.

Cerro de Guadalupe (Valle de México), Septiembre de 1884 (M. Urbina).

Tagetes subulata, LLAV. et LEX. Nov. Veg. Descr. I. p. 31?
Zapópan (EST. DE JALISCO), Octubre de 1886 (M. Bárcena);
Llanuras de Guadalajara, Noviembre 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2750).

Tagetes tenuifolia, Cav. Ic. Pl. II. p. 54, t. 159; Bot. Mag. t. 2045. La Barranca (Est. DE Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena): Sitios agrestes sombrios y húmedos, cerca de Guadalajara, Octubre 4 de 1889 (C. G. Pringle, 2488).

Chrysactinia mexicana, A. Gr. Pl. Fendl. p. 93.

N. V. Damiana; Romerillo.

S. Agustín Mezquititlan (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner); S. Bartolo (Valle de México), Septiembre de 1888 (M. Urbina); Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Septiembre 3 de 1889 (C. G. Pringle, 2641).

Chrysactinia pinnata, Watson, n. sp.

Capas pedregosas de las montañas, cerca de Monterrey (Est. DE NUEVO LEÓN), Mayo 28 de 1889 (C. G. Pringle, 2524).

Chrysactinia truncata, Watson.

Rocas calizas, Paso de Carneros (Est. DE COAHUILA), Agosto 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3463).

Pectis angustifolia, Torr. in Ann. Lyc. N. York. n. p. 214; A. Gray Pl. Wright. I. p. 82.

Pectidopsis angustifolia, DC. Prodr. v. p. 98.

Pectis fastigiata, A. Gr. Pl. Fendl. p. 62.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Pectis diffussa, Hook et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 296.

Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 31 de 1889 (C. G. Pringle, 2723).

Pectis jaliscana, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 296.

Pectis filipes, A. Gr. Pl. Fendl. p. 62.

Piedras negras (Est. De Jalisco), Marzo de 1886 (M. Barcena). Pectis prostrata, Cav. Ic. Pl. Iv. p. 12, t. 324; DC. Prodr. v.

p. 100.

Cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1881 (M. Urbina); Ameca (Est. DE JALISCO), Octubre de 1886 (M. Bárcena).

Pectis sessiliflora, Less. in Linnæa vi. p. 711.

Atemajac (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena).

Pectis tenella, DC. Prodr. v. p. 99.

Llanos arenosos, Laredo (Texas), Julio 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2637).

Helenium mexicanum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 299.

N. V. Yerba de las ânimas; Chapuz; Rosilla.

Llano de S. Pedro, Guadalajara, Abril de 1886 (M. Bárcena); Pantanos, Flor de María (Est. de México), Septiembre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3241).

Helenium amphibolum, A. Gr. in Proc. Am. Acad. Ix. p. 202.S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner).

Helenium ooclinium, A. Gr. in Proc. Am. Acad. IX. p. 202.

N. V. Yerba cabezona o Yerba de la vibora.

Pantanos cerca de Cusihuiriachie (Est. de Chimuahua), Septiembre de 1888 (C. G. Pringle, 3036); Entre S. Juan del Rio y Tequisquiápan, Septiembre 6 de 1884 (A. Herrera).

Helenium quadridentatum, Labill. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. I, p. 22, t. 4; Bot. Reg. t. 598.

Rudbeckia alata, JAcq. Ic. Pl. Rar. t. 593.

N. V. Manzanilla.

Mayito, cerca de S. Juan Bautista (Est. de Tabasco), Abril de 1888 (J. N. Rovirosa).

Gaillardia mexicana, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xix. p. 34. S. Luis Potosí, Septiembre de 1876 (G. Schaffner).

Capas calizas, Villar (Est. DE S. Luis Potosi), Julio 14 de 1893 (C. G. Pringle, 5368).

Gaillardia pinnatifida, Torr. in Ann. Lyc. N. York. 11. p. 214.

Bachimba (Est. de Chimuanua), Abril 2 de 1885 (C. G. Pringle,....)

Gaillardia pulchella, Foucier in Mém. Acad. Sc. Par. 1786; DC. Prodr. v. p. 652.

Galardia bicolor, LAM. Dict. II. p. 585, Ill. t. 718.

Calomea pulcherrima, Висноz, Ic. t. 126.

Los Médanos (Est. de Chimuahua), Septiembre 13 de 1886 (C. G. Pringle,....)

Actinella linearifolia, Torr. et Gr.

Cerca de Monterrey (Est. DE NUEVO LEÓN), Junio 7 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Actinella odorata, A. Gr. Pl. Fendl. p. 101.

Hymenoxis odorata, DC. Prodr. v. p. 661.

Cephalophora anthemoides, Less. in Linnæa, vr. p. 518. Valle cerca de Chihuahua, Abril de 1885 (C. G. Pringle, 99).

Hymenoxis chrysanthemoides, DC. Prodr. v. p. 661.

Actinea chrysanthemoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 298, t. 411.

Entre Tehuacán y Esperanza (Esr. DE PUEBLA), Septiembre de 1884 (R. Montes de Oca).

TRIBUS VII. ANTHEMIDEÆ.

Achillea millefolium, Linn. Sp. Pl. p. 1267; DC. Prodr. vi. p. 24; Fl. Dan. t. 737.

N. V. Milefolio; Mil en rama; Plumajillo.

Amecameca (Est. de México), Agosto de 1881 (M. Urbina); S. Francisco Acuautia, Belia Vista, á 2,500 metros (Est. de México), Mayo 1.º de 1890 (F. Altamirano).

Chrysanthemum parthenium, SMITH.

N. V. Yerba de Sta. Maria.

Cultivada en 10s jardines del Valle de México, Abril de 1881 (M. Urbina).

Matricaria chamomilla, Linn.

N. V. Manzanilla del país.

Aclimatada y cultivada en el Valle de México y Est. de Puebla, Septiembre de 1888 (M. Urbina).

Artemisia dracunculina, Wats. n. sp.

Bajo los peñascos calizos, Sierra Madre (Est. de Chihuaniua), Octubre 18 de 1887 (C. G. Pringle, 1309).

Artemisia filifolia, A. Gr.

Artemisia laciniata, F1. Mex. In.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner).

Artemisia ludoviciana, Nutt. var?

Llanuras cerca de Chihuahua, Septiembre 11 de 1885 (C. G. Pringle, 625).

Artemisia mexicana, Willd. Spreng. Syst. nr. p. 490; DC. Prodr. vi. p. 114; Less. in Linnæa, v. p. 163?

N. V. Estafiate; Mex. Yxtauyiatl.

Chapultepec (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1883 (M. Urbina);

Cañón de Tultenango (Est. de México), Octubre 31 de 1892 (C. G. Pringle, 5272).

var, augustifolia, Schz. Bib.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner).

Artemisia redolens, A. Gr.

N. V. Estafiate.

Huirambo (Est. De Michoacáx), Junio de 1891 (M. Martinez); Sitios fríos bajo los peñascos; montañas de Chihuahua, Septiembre 18 de 1886 (C. G. Pringle, 1059).

TRIBUS VIII. SENECIONIDEÆ.

Liabum cervinum, Ros. n. sp.

Sitios agrestes de las barrancas, S. Marcos (Est. de Jalisco), Junio 9 de 1893 (C. G. Pringle, 4398).

Liabum discolor, Bentu. et Hook, Gen. Pl. H. p. 436.

Sinclairia discolor, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 433; Hook. Ic. Pl. v. p. 451.

Cañadas cerca de Guadalajara, Noviembre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 5302).

Liabum klattii, Rob. et Greenm. n. sp.

Arbusto de 15-20 piés. Las hojas caen antes que la flor aparezca. Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Noviembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 6059).

Liabum palmeri, Gray.

Cerros cerca de Guadalajara, Septiembre 24 de 1891 (C. G. Pringle, 2328).

Schistocarpa bicolor, Less. in Linnæa, vi. p. 409; Link. Kl. et Otto Ic. Pl. Rar. t. 37.

Descabezadero, Actópan (Est. DE HIDALGO), Enero 12 de 1891 (M. Villada); Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Porosi), Junio 9 de 1891 (C. G. Pringle, 5117); De 3 á 5 piés. Cerros arriba de Orizaba, á 4,500 piés (Est. DE VERACRUZ), Febrero 9 de 1895 (C. G. Pringle, 6134).

Erechtites hieracifolia, RAF. DC. Prodr. vi. p. 294.

Sierra de Reyes, á 6,000 piés (Est. De OAXACA), Noviembre 10 de 1894 (C. G. Pringle,....)

Cacalia amplifolia, DC. Prodr. vi. p. 328.

Senecio amplifolius, Hemsl.

Sierra de S. Felipe, de 7,500-10,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4785).

Cacalia cervariæfolia, DC. Prodr. vi. p. 328.

Mesoneuris bipinnalifida, A. Gr. in Proc. Am. Acad. viii. p. 661.

Odontotricum cirsiifolium, Zucc. Pl. Nov. in Abhandl. Caier. Akad. Wiss. 1832, p. 311.

Sciadoseris vaginata, Kunze in Bot. Zeit. 1851, p. 349.

Senecio cervariefolius, HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 237, t. LI.

N. V. Matarique; Güereña.

Chihuahua, Mayo de 1888 (M. Bárcena); Quebradas secas de las montañas, cerca de Sta. Inés del Monte, á 8,500 piés (Est. De Oaxaca); Octubre 27 de 1894 (C. G. Pringle, 4984).

Cacalia cordifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 168, t. 360.

Senecio cardiophyllus, Hensl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 237.

Teoloyúcan (Est. de México), Agosto de 1886 (M. Villada); De 3 á 6 piés de altura, Cerros de Pátzcuaro (Est. de Miculacán), Noviembre 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3332).

Cacalia decomposita, A. Gr. Pl. Wright. II. p. 99.

Senecio grayanus, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 241. Lugares fríos, montañas de Mapula (Est. de Chihuahua), Octubre 30 de 1886 (C. G. Pringle, 767).

Cacalia hederæfolia, A. Gr.

Senecio hederæfolius, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. II. p. 241. Entre Tejupilco y Hac. de Luvianos (Est. de México), Marzo de 1886 (M. Villada).

Cacalia jatrophoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 169; DC. Prodr. vi. p. 328.

Senecio jatrophoides, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 242. Cerros cerca de Acámbaro (Est. de Guanajuato), Octubre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4262).

Cacalia longipetiolata, Rob. et Greenm. n. sp.

Sierra de S. Felipe, á 7,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre de 1894 (C. G. Pringle, 5828).

Cacalia napeæfolia, DC. Prodr. vi. p. 328.

Senecio napeæfolius, HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 244. Tallos de 6–8 piés; corimbos de 12–18 pulgadas de ancho.

Sierra de S. Felipe, á 10,200 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4778).

Cacalia paucicapitata, Rob. et Greenm. n. sp.

Lugares secos bajo las encinas, Sierra de Clavellinas, á 7,000 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 25 de 1894 (C. G. Pringle, 6018).

Cacalia peltata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 170, t. 361.

Psacalium peltatum, Cass. Dict. xlm. p. 461.

Scnecio peltiferus, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 245.

Cacalia peltigera, Rob. et SEA.

Sitios agrestes de las barrancas, cerca de Guadalajara, Julio 13 de 1893 (C. G. Pringle, 4627).

Cacalia poculifera, Ros.

Laderas pedregosas, bajo las encinas, cerca de Guadalajara, Julio 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4414).

Cacalia prenanthoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p.

En los bosques de pinos, Nevado de Toluca, de 10-12,000 piés de altura (Est. de México), Septiembre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4302).

Cacalia pringlei, WATSON.

Cuestas cerca de Guadalajara (Est. DE JALISCO), Noviembre 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2736).

Cacalia racemosa, Sch. Bib. MSS?

Senecio helodes, Benth. Pl. Hartw. p. 42.

N. V. Moradilla.

En las ciénegas de Calimaya (Est. DE México), Octubre de 1884 (F. Altamirano).

Cacalia radulæfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. Iv. p. 169.

Seuecio radulæfolia, HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 246.
Llanuras de Guadalajara, Noviembre 13 de 1889 (C. G. Pringle, 2746).

Cacalia schaffneri, Gray.

Cuestas cespitosas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3566).

Cacalia sinuata, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. i. p. 29; DC. Prodr. vi. p. 327.

Senecio calophyllus, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. u. p. 237. N. V. Mano de León.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena); Praderas, Valle de Toluca (Est. de México), Octubre 3 de 1892 (C. G. Pringle, 4274).

Вот.-48.

Cacalia tussilaginoides, H. B. K?

Cuestas húmedas, cerca de Guadalajara, Septiembre 14 de 1891 (C. G. Pringle, 4048).

Senecio angustifolius, DC. Prodr. vi. p. 431.

Atotonilo el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Francisquito (Est. de México), Enero de 1885 (M. Urbina); Bosques de abetos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Diciembre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 4362).

Senecio barba-johannis, DC. Prodr. vi. p. 430.

Senecio grahami, BENTH. Pl. Hartw. p. 18.

De 6 á 10 piés. S. Francisquito (Est. de México), Enero de 1885 (M. Urbina); Bosques de pinos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Diciembre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 4363).

Senecio berlandieri, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 236.

De 15 á 20 piés: trepadora sobre arbustos y árboles. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Noviembre 30 de 1890 (C. G. Pringle, 3371).

Senecio calcareus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 184. N. V. Jarilla.

Serranía de las Cruces (Est. de México), Febrero de 1886 (M. Urbina); Montes de Zavaleta (Est. de México), Febrero de 1890 (M. Villada).

Senecio chapalensis, Watson, n. sp.

Cañadas frías de boscaje: montañas cerca del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Noviembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 2419 y 5238).

Senecio cinerarioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. IV. p. 183. Chapultepec (Valle de México), Septiembre de 1883 (M. Ur-

bina).
Senecio deformis, F. W. KLATT.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner); Por los arroyos, Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 24 de 1892 (C. G. Pringle, 4204).

Senecio douglasii, DC. Prodr. vi. p. 431.

Valle de Bocas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 21 de 1890 (C. G. Pringle, 3468).

Senecio canicida, Moc. et Sesse. Fl. Mex. In. Senecio erbenbergii.

Senecio sinuatus? H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 180.

Senecio lineolatus? DC. Prodr. vi. p. 427.

N. V. Yerba de la Puebla; Mex. Ixcuinpatli.

Usada para envenenar á los perros, coyotes, &. Puebla, Septiembre de 1887 (M. Villada).

Senecio gracilipes, Rob. et Greenm. n. sp.

Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. De Oaxaca), Octubre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 6010).

Senecio grandifolius, Less. in Linnæa v. p. 162.

Senecio ghiesbreghtii, Regel. Ind. Sem. Hort. Petrop. in adnot. Bot. p. 36; Gartenfl. in. p. 230, t. 296.

Especie arborescente en Orizaba (Est. DE Veracruz), cultivada en la Escuela N. Preparatoria, Septiembre de 1885 (M. Urbina).

Senecio guadalajarensis, Rob. n. sp.

Lugares fértiles de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3280).

Senecio jaliscana, Watson.

De 8 a 10 piés de altura. Cañadas frias de boscaje de las montañas, cerca del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Noviembre 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4329).

Senecio lineolatus? DC. Prodr. vi. p. 427.

Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 25 de 1889 (C. G. Pringle, 2718).

Senecio lobatus, Pers. Torr. et Gr. Fl. N. Am. II. p. 437.

Valle de Ortiz (Est. de Chihuahua), Abril 16 de 1887 (C. G. Pringle,)

Senecio longilobus, Benth. Pl. Hartw. p. 18. S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner).

Senecio monterreyana, WATSON.

Capas pedregosas de las montañas, eerca de Monterrey (Est. DE NUEVO LEÓN), Junio 1.º de 1889 (C. G. Pringle, 2699).

Senecio multidentatus, Schz. Bib. MSS. in hb. Kew; Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 243.

Por los arroyos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4205).

Senecio platanifolius, Benth.

Bosques de pinos, Sierra de las Cruces (Est. DE México), Diciembre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 4364).

Senecio petasitis, DC. Prodr. vi. p. 431.

Cineraria petasitis, Sims. Bot. Mag. t. 1536.

Cineraria platanifolia, Schrank Pl. Rar Hort. Monac. t. 95; Coll. Hort. Ripul. App. p. 2, t. 12.

Cerro del Pino, Ayotla (Est. de México), Noviembre 1.º de 1888 (M. Urbina).

Senecio præcox, DC. Prodr. vi. p. 431.

Cineraria præcox, CAv. Ic. Pl. III. t. 244.

N. V. Palo loco.

Escuela de Agricultura (VALLE DE MÉXICO), Marzo 2 de 1882 (M. Urbina); Barranca cerca de Guadalajara, Mayo 20 de 1891 (C. G. Pringle, 5160).

Senecio procumbens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iv. p. 177; DC.

Nevado de Toluca, cerca del límite de los pinos, de 12,000-13,500 piés (Est. de México), Septiembre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4246).

Senecio roldana, DC. Prodr. vi. p. 431.

Roldana lobata, LLAV. et LEX. Nov. Veg. Desc. 11. p. 10. N. V. Burro.

Produce varas de tres metros de altura; flor amarilla. La Barranca (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena).

Senecio salignus, DC. Prodr. vi. p. 430.

Senecio vernus, DC. loc. cit.

Cineraria angustifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 189. Cineraria salicifolia, H. B. K. loc. cit. p. 188?

N. V. Jarilla.

Tlalpam y Chapultepec (Valle de México), Marzo de 1884 (M. Urbina); Valle de Irapuato (Est. de Guanajuato), Mayo 24 de 1889 (C. G. Pringle, 2693).

Senecio sanguisorbæ, DC. Prodr. vi. p. 427.

Ajusco (Valle de México), Marzo de 1884 (M. Urbina); Cimas frías de las montañas, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Agosto 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4129).

Senecio sinuatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 180.

Senecio lineolatus, DC. Prodr. vi. p. 427.

Sierra de las Cruces (Est. DE México), Octubre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4311).

Senecio stechadiformis, DC. Prodr. vi. p. 429.

Arbusto de 3 á 4 piés.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1881 (D. Cano);

Cañadas de las montañas, cerca del Lago de Chapala (Est. DE JALISCO), Noviembre 22 de 1882 (C. G. Pringle, 4334).

Senecio tolucanus, DC. Prodr. vi. p. 428.

N. V. Rabanillo.

Ajusco (Valle de Mêxico), Abril de 1886 (M. Urbina).

var. modestus, Schz. Bib.

Nevado de Colima, de 10,000-12,000 piés (Est. DE JALISCO), Mayo 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4374).

Senecio vulneraria, DC. Prodr. vi. p. 428.

Senecio pauciflorus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 176, t. 365; non. Pursh.

N. V. Mex. Palancapatli; Calomopotl,

Ajusco (Valle de México), Abril de 1886 (M. Urbina); S. Francisco Acuautia, á 2,700 metros (Est. de México), Mayo 1.º de 1890 (F. Altamirano); Nevado de Toluca, á 13,000 piés (Est. de México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 5332).

Senecio sp.

Llano del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro).

TRIBUS IX. CALENDULACEÆ.

Calendula officinalis, LINN. Sp. Pl. 1304.

N. V. Mercadela.

Cultivada en los jardines, Abril 15 de 1884 (M. Urbina).

TRIBUS XI. CYNAROIDEÆ.

Echinops sphærocephala, Linn. Sp. Pl. 1314.

N. V. Planta de la Abeja.

Aclimatada en la Escuela de Agricultura, Julio de 1891 (R. Barba).

Cnicus acantholepis, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 251. Sitios agrestes y calizos, Flor de María (Est. de México), Agosto 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3237).

Вот.-- 49.

Cnicus imbricatus, Rob. et Greenm. n. sp.

De 3-5 piés. Praderas húmedas, Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre de 1894 (C. G. Pringle, 6006).

Cnicus excelsior, Rob. n. sp.

De 6 á 10 piés de altura. Entre los arbustos, terrenos bajos, Hac. de 1a Angostura (Esr. de S. Luis Porosí), Julio 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3768).

Cnicus jorullensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 22.

Cirsium jorullense, Spreng. Syst. III. p. 376; DC. Prodr. vi. p. 650.

Praderas húmedas, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4214).

Cnicus linearifolius, Watson, n. sp.

Praderas húmedas cerca de la ciudad de México, Agosto 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3145).

Cnicus mexicanus, HEMSL. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 251.

Cirsium mexicanum, DC. Prodr. vi. p. 636.

C. lanceolatus, Hoffm?

N. V. Cardo santo.

Tiolinca, Acuautla (Est. de México), á 3,000 metros, Mayo 1,0 de 1890 (F. Altamirano); Alameda de Guadalajara, Abril de 1886 (M. Bárcena); De 3 á 8 piés de altura, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 16 de 1891 (C. G. Pringle, 8726); Bosques de pinos, sitios frios, Nevado de Tolyca (Est. de México), Septiembre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4301).

Cnicus nivalis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1v. p. 23.

Cirsium cernuum, Lag. Elench. Nov. Gen. p. 24; DC. Prodr. vi. p. 639.

Cirsium nivale, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 312. Cerca del cráter del Nevado de Toluca, á 13,000 piés (Est. de México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4252).

Cnicus rhaphilepis, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. H. p. 252.

N. V. Cardo santo.

Lago de Chalco (Valle de México), Agosto de 1888 (M. Urbina); Terrenos bajos cerca de Guadalajara, Mayo 17 de 1890 (C. G. Pringle, 3109).

Cnicus reglensis, KLATT.

En grandes grupos, praderas cenagosas, Santa Ana (Est. de Jalisco), Junio 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4406).

Cnicus subcoriaceus, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. н. р. 252.

Cardnus subcoriaceus, Less. in Linnæa v. p. 130.

Cirsium subcoriaceum, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 312.

Cirsium heterolepis, Bentu. Pl. Hartw. p. 87.

Cirsium maximum, Benth. Pl. Hartw. p. 289.

Cirsium platicephalum, Benth. in Vidensk. Meddel. 1852, p. 110.

Cnicus heterolepis, A. Gr. in Proc. Am. Acad. x. p. 44, in adnot.

Cnicus cernuus, A. Gr. in Proc. Am. Acad. x. p. 44, in adnot. Sierras cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 24 de 1891 (C. G. Pringle,); Planta de 6 á 8 piés y de 5 á 8 ramas monocéfalas. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 6119).

Cnicus tolucanus, Rob. et Sea. n. sp.

Cañadas de boscaje, Sierra de las Cruces (Esr. de México), Agosto 28 de 1892 (C. G. Pringle, 4308).

Cnicus velatus, Wars. n. sp.

Praderas bajas, Flor de María (Esr. De México), Agosto 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3228).

Cynara carduunculus, Linn. Sp. Pl. 1159.

N. V. Alcahucil.

Cultivado, S. Ángel (VALLE DE MÉXICO), Abril de 1881 (M. Urbina).

TRIBUS XII. MUTISIACEÆ.

Chaptalia nutans, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. H. p. 255.

Leria nutans, DC. in Ann. Mus. Par. xix. p. 68; DC. Prodr. yii. p. 42.

Gerbera mitans, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 313.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner); Arroyo de Tapijulaya (Est. De Tabasco), Marzo de 1888 (J. N. Rovirosa); Sierras, Paso de Carneros (Est. De Coahulla), Septiembre 14 de 1889 (C. G. Pringle,)

Chaptalia seemanni, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. u. p. 255.

Gerbera seemanni, Schz. Bib. in Seem. Bot. Voy. "Herald."
p. 313.

Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 5283).

Gochnatia hypoleuca, A. Gr.

Arbol pequeño. Cuestas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Porosi), Julio 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3061).

Perezia adnata, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 127.

N. V. Mex. Pipitzahuac.

Entre Tenancingo y Tenango del Valle (Est. de México), Septiembre de 1886 (M. Villada); Cerro del Pino (Valle de México), Septiembre de 1889 (M. Urbina); Cerros pedregosos, Tultenango (Est. de México), Septiembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3244).

Perezia coulteri, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 40.

Cuestas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 16 de 1890 (C. G. Pringle, 3178).

Perezia dugesii, Gray.

Sierras cerca de Guadalajara, Noviembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 5254).

Perezia hebeclada, Gray, Pl. Wright. I. p. 127.

Acourtia hebeclada, DC. Prodr. vn. p. 66; Deless. Ic. Sel. iv. t. 95.

Perdicium cordatum, LLAV. et LEX. Nov. Veg. Descr. 1. p. 27? Pedregal de S. Ángel (Valle de México), Diciembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4360).

Perezia michoacana, Rob. n. sp.

De 4 á 6 piés de altura. Cerros cerca de Pátzcuaro (Еsт. de Michoacán), Diciembre 20 de 1891 (С. G. Pringle, 3988).

Perezia nana, A. Gr. Pl. Fendl. p. 111, et Pl. Wright. I. p. 125. S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner).

Perezia nudicaulis, A. Gr. Pl. Wright, I. p. 127.

Cerros calizos y secos, Las Sedas, á 6,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 30 de 1894 (C. G. Pringle, 6015).

Perezia oxylepis, Scuz. Bib.; A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 41.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner).

Perezia parryi, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xv. p. 40.

Entre S. Juan del Río y Tequisquiápan (Est. DE QUERÉTARO), Septiembre 6 de 1884 (M. Urbina); Mesas calizas, Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 2 de 1891 (C. G. Pringle, 4027).

Perezia platyphylla, GRAY. Pl. Fendl. p. 111; Pl. Wright. r. p. 127. Lugares frios, montañas cerca de Chihuahua, Octubre de 1886 (C. G. Pringle, 766).

Perezia reticulata, A. Gr. Pl. Wright. 1. p. 128.

Proustia reticulata, LAG. ex Don. in Trans. Linn. Soc. xvi. p. 200.

Cerros cerca de Acámbaro (Est. de Guanajuato), Octubre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4324).

Perezia rigida, A. Gr. Pl. Wright. I. p. 127.

Acourtia rigida, DC. Prodr. vII. p. 66.

Acourtia formosa, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 437, et Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 122, non DC. nec Don. ex A. Gr.

Trixis latifolia, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 300. S. Luis Potosi. 1876 (G. Schaffner).

Perezia schaffneri, A. Gr.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 376).

Perezia thyrsoidea, A. Gr. in Torr. Bot. Unit. Stat. et Mex. Bound. Surv. p. 104, in adnot.

N. V. Cola de Zorra; Yerba del Zorrillo.

Planta con olor muy pronunciado de almizele. Entre Quiroga y Morelia (Esr. de Michoacán), Diciembre 1.º de 1877 (M. Villada); De 4 á 5 piés de altura. Cerros cerca de Pátzcuaro (Esr. de Michoacán), Diciembre 19 de 1891 (C. G. Pringle, 3985).

Perezia Wislizeni, A. Gr. Pl. Fendl. p. 111; Pl. Wright. I. p. 126. Sierra Madre (Est. de Chihuahua), Octubre de 1887 (C. G. Pringle,....)

var. macrocephala, GR.

Cerros cerca de Guadalajara (Esr. DE JALISCO), Octubre 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2290).

Perezia vernonioides, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xxII. part. II, p. 433.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena).

Perezia sp.

Cerro de Sta. Cruz, Valle de Ahualulco (Est. De Jalisco), Enero de 1887 (M. Bárcena).

Trixis angustifolia, DC. Prodr. vii. p. 69.

N. V. Falsa árnica.

Hac. de Sta. Catarina, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1883 (D. Cano); Cerros y mesas, Bocas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 17 de 1891 (C. G. Pringle, 4007).

var. latiuscula, A. GR.

S. Juan del Río y Querétaro, Septiembre de 1884 (M. Urbina); Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 6 de 1891 (C. G. Pringle,....)

Trixis frutescens, P. Browne, Jam. p. 312, t. 33, f. 1; DC. Prodr.

vII. p. 68.

Las Palmas (Est. de S. Luís Potosí), Abril 28 de 1894 (C. G. *Pringle*, 5766).

Trixis hyposericea, WATSON.

Monte de Pozo, Tenancingo (Est. de México), Enero de 1884 (M. Villada); La Barranca, cerca de Guadalajara, Octubre 30 de 1888 (C. G. Pringle, 1741).

Trixis involucrata, Don. in Trans. Linn. Soc. xvi. p. 193; DC. Prodr. vii. p. 68.

Entre Tejupilco y Luvianos (Est. de México), Marzo de 1886 (M. Villada).

TRIBUS XIII. CICHORIACEÆ.

Hieracium crepidispermum, FRIES. Symb. p. 153; Epicris. p. 157.

Cuestas, Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 17 de 1892 (C. G. Pringle, 4183).

Hieracium mexicanum, Less. in Linnæa v. p. 133.

Ajusco (Valle de México), Julio 20 de 1888 (M. Urbina); Cerros pedregosos, cerca de Chihuahua, Agosto de 1885 (C. G. Pringle, 592).

var. niveopappum, GRAY.

Cerros cerca de Guadalajara, Mayo 25 de 1891 (C. G. Pringle, 5133).

Cerca de la var. niveopappum, Gr.

Bancos arcnosos y sccos, cerca de Guadalajara, Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4461).

Hieracium præmorsiforme, Schz. Bib. in Bonplandia, 1861, p. 327; Fries Epicris, Hierac, p. 148,

Bosques secos de pinos, a 9,500 piés, Nevado de Toluca (Est. de México), Septicmbre 28 de 1892 (C. G. Pringle, 4284).

Hieracium pringlei, GRAY.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner); La Bufa, arriba de Cusihuiriachic (Еsт. de Синианиа), Scptiembre 1.º de 1887 (С. G. Pringle, 1585).

Taraxacum officinale, Wigg. Prim. Fl. Hols. p. 56 (1780). Taraxacum dens-leonis, Desr. Fl. Atl. п. р. 228. Taraxacum mexicanum, DC. Prodr. vн. р. 146. N. V. Diente de León.

Cerro del Tepeyae (Valle de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina).

Pyrrhopappus multicaulis, DC. Prodr. vn. p. 144. S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner); Valle cerca de Chihuahua, Junio 2 de 1885 (C. G. Pringle, 117).

Calycoseris wrightii, A. Gr. Pl. Wright. n. p. 104, t. 14. Paso del Norte (Est. de Chihuanua), Abril 25 de 1893 (C. G. $Pringle, \ldots$)

Lactuca intybacea, Jacq. Ic. Pl. Rar. I. t. 162; Collec. I. p. 53; Less, in Linnæa vi. p. 724.

Phænixopus intybaceus, Less. Synop. p. 137.

Brachyramphus intybaceus, DC. Prodr. vii. p. 177.

Colomitos (Est. DE Jalisco), Abril de 1886 (M. Barcena); Capas pedregosas, Las Palmas (Est. DE S. Luis Potosi), Junio 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3090).

Picridium vulgare, Desf. Fl. Atl. II. t. 221.

N. V. Escorzonera,

Escuela de Agricultura (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Sonchus oleraceus, Linn. Sp. Pl. p. 1117.

Escuela de Agricultura (VALLE DE MÉXICO), Octubre de 1883 (M. Urbina).

Pinaropappus roseus, Less. Syn. p. 143; DC. Prodr. vii. p. 99. Achyrophorus roseus, Less. in Linnea v. p. 133, t. 2, fig. 5. N. V. Motita morada.

Lomas de Tacubaya y Cerro de Guadalupe (Valle de México), Octubre de 1883 (M. Urbina).

ADDENDA.

Ageratella microphylla.

var. palmeri, A. GR.

Cerros pedregosos cerca de Guadalajara, Octubre 26 de 1889 (C. G. Pringle, 2720).

Golionema heterophyllum, Watson, n. gen.

Agua superficial, Del Río (Est. de México), Agosto 30 de 1890 (3230).

Geissolepis suædæfolia, Rob. n. gen.

Llanuras alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosi), Junio 27 de 1891 (C. G. Pringle, 3762).

Oaxacania malvæfolia, Rob. et Greenm. n. g.

Pendientes secas, Cañón de Tomellín, á 3,000 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre 22 de 1894 (C. G. Pringle, 6117).

Mallinoa corymbosa, Coult. in hb. Pringle.

Bancos secos, Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 17 de 1894 (C. G. Pringle, 6055).

ORDO XCIX. LOBELIACEÆ.

TRIBUS I. LOBELLÆ.

Laurentia ovatifolia, Rob. n. sp.

Terrenos sombríos y calizos, cerros cerca de Cárdenas (Est. DE S. Luis Porosi), Septiembre 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3302).

Palmerella tenera, GRAY.

Suelo húmedo de las montañas, cerca de Guadalajara, Noviembre 15 de 1888 (C. G. Pringle, 2163).

Lobelia angustifolia, H. B. K.

β. angustifolia, DC. Prodr. vn. p. 383; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 3.

Lobelia cavanillesii, Mart. Croix. Pl. Jard. Mun. p. 12, t. 9; Bot. Mag. t. 3600.

Lobelia persicæfolia, CAV. Ic. v1. t. 518, non Lam.

N. V. Jarritos.

Querétaro, Abril de 1886 (M. Urbina); En las montañas cercanas á S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 738); En Moroleón (Est. de Guanajuato), Abril de 1892 (A. Dugês).

Lobelia berlandieri, DC. Prodr. vu. p. 367.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 119); Capas calizas de las montañas cerca de Cárdenas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3301); S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1881 (D. Cano).

Lobelia cliffortiana, Linn. Sp. Pl. ed. 3, II, p. 1320; Hort. Cliff. p. 426, t. 26.

Lobelia xalapensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 315.

var. xalapensis, Gray.

Cerro del Borrego, Orizaba (Est. DE VERACRUZ), Marzo de 1891 (P. Toro): Bancos calizos, Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosí), Noviembre 30 de 1890 (C. G. Pringle,

Вот.-51.

3369); Bancos sombríos, Orizaba, á 4,000 pies (Est. de Verracruz), Febrero 3 de 1895 (C. G. Pringle, 6125).

var. brachypoda, Gray.

Ortiz (Est. de Chinuahua), Mayo 26 de 1887 (C. G. Pringle, ...)

Lobelia fenestralis, Cav. Ic. t. 512, f. 1; DC Prodr. vii. p. 360;

Bot. Reg. xxiv, t. 47.

Lobelia pectinata, Engelm. in Wisliz. Rep. p. 108.

Lobelia spicata, Moc.; G. Don. Gen. Syst. III. p. 705.

Lobelia stricta, Mart. et Gall. in Bull. Acad. Brux. ix. (reprint. p. 12)?

N. V. Gusanillo; Talclote,

Ozumba (Est. de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina); Colomitos (Est. de Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bürcena, 74, 742 y 749).

Lobelia fulgens, Willd. Hort. Berol. 11, t. 85; DC. Prodr. vii. p. 382; Walpers Rep. 11. p. 707; Andr. Bot. Rep. t. 659.

Lobelia splendens, Willd. Hort. Berol. II. t. 86; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 3; Bot. Mag. t. 4960 (var. ignea).

Lobelia formosa, Rem. et Sch. Syst. v. p. 50.

Lobelia texensis, RAF. in Ann. Nat. 1833, p. 20.

Lobelia ignea, PAXT. Mag. Bot. vi. p. 247, cum ic. color.

Rapuntium splendens et fulgens, Prest, Prodr. Lob. p. 26.

S. Juan de Xico (Lago de Chalco), Agosto 12 de 1888 (M. Urbina); Por las corrientes, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2645).

Lobelia hartwegii, A. DC. in Pl. Hartw. p. 16.

Lobelia velutina, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. IX.

Lugares secos bajo las encinas enanas, Sierra de Clavellinas, á 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 6003).

Lobelia laxiflora, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 311; DC. Prodr. vII. p. 383.

Rapuntium laxiflorum, Prest. Prodr. Lob. p. 26.

Lobelia rigidula, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. m. p. 311.

Lobelia ovalifolia, lanceolata y angulato-dentata, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. pp. 300, 301.

Syphocampylus bicolor, Don. in Sweet's. Brit. Fl. Gard. ser. 2, t. 389.

N. V. Cúralo todo, En Jalisco; Mex. Pipiloxochitl.

Zapópan; Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Marzo de 1887

(M. Bárcena, 89, 209, 500, 501, 502); Cerro de S. Cristóbal, Orizaba (Est. de Veracrez), Abril de 1891 (P. Toro); Tlatmanalco, á 2,400 metros (Est. de México), Mayo de 1890 (F. Altamírano); Bancos cerca de Guadalajara, Mayo 21 de 1890 (C. G. Pringle, 3112).

Lobelia novella, Rob. n. sp.

Capas frías y bancos arenosos, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porosi), Octubre 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3288).

Lobelia parviflora, Mart. et Gal? in Bull. Acad. Brux. 1x. (reprint. p. 13); Walp. Rep. 11. p. 707.

Laurentia michoacana, Rob. n. sp. in hb. Pringle.

Cerros cerca de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Noviembre 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3337).

Lobelia picta, Rob. et Sea, n. sp.

Praderas de manantiales fríos, Sierra de las Cruces (Est. DE México), Octubre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4305).

Lobelia sp.

Planta acuática.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Marzo de 1887 (M. Bárcena, 575).

Heterotoma arabidoides, Bent. et Hook. Gen. Pl. 11. p. 553.

Lobelia arabidoides, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 301,
t. 66.

Bancos húmedos, cerca de Guadalajara, Noviembre 14 de 1892 (C. G. Pringle, 5224).

Heterotoma tenella, Marr. et Gal. ex Benth. et Hook. Gen. Pl. II. p. 553.

Lobelia cordifolia, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 301.

Cañadas cerca de Guadalajara, Diciembre 8 de 1888 (C. G. Pringle, 2165); Bancos húmedos, arriba de Orizaba, á 4,000 piés (Est. de Veracruz), Enero de 1895 (C. G. Pringle, 6084).

Nemacladus oppositifolius, Rob. n. sp.

Sitios agrestes secos y catizos, cerca de Cárdenas (Est. de S. Luis Potosf), Octubre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3300).

ORDO CI. VACCINIACEÆ.

TRIBUS II. EUVACCINIÆ.

Vaccinium geminiflorum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 267, t. 252; DC. Prodr. vii. p. 573.

Nevado de Colima, á 12,500 piés (Est. de Jalisco), Mayo 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4375).

ORDO CII. ERICACEÆ.

TRIBUS I. ARBUTEÆ.

Arbutus densifiora, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 280, t. 260.

De 20-30 piés, Sierra de S. Felipe, de 6-9,000 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre 31 de 1894 (C. G. Pringle, 6110).

Arbutus varians, Benth. Pl. Hartw. p. 77.

N. V. Madroño.

Ajusco (Valle de México), Enero de 1882 (M. Urbina); Montañas cerca de Guadalajara, Diciembre 17 de 1889 (C. G. Pringle, 2444).

Arctostaphyllos glaucescens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 278; DC. Prodr. vii. p. 584.

Comarostaphyllis glaucescens, Zucc. ex Kl. in Linnæa xxiv. p. 76.

Forma matorrales chicos y llega hasta cerca de la lava, á 3,500 metros. Volcán de fuego (Est. de Jalisco), Marzo de 1887 (M. Bárcena, 402).

Arctostaphyllos oaxacana, DC. Prodr. vii. p. 585.

Comarostaphyllis oaxacana, Klotzsch, in Linnæa xxiv. p. 77.

Arbutus xalapensis, Hook. Ic. Pl. t. 27, nec H. B. K.

Cerros cerca de Guadalajara, Septiembre 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 4524); Faldas de la Sierra de S. Felipe, á 7,000 piés (Est. DE OAXACA), Mayo 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4653).

Arctostaphyllos polifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 277, t. 258; Bentu. Pl. Hartw. p. 44.

Comarostaphyllis polifolia, Zucc. ex Kl. in Linnæa xxiv. p. 77. Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

Arctostaphyllos pungens? H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 278, t. 259; Bot. Mag. t. 3927; Bot. Reg. xxx. t. 17; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 28.

Arctostaphyllos tomentosa, β. Lindl. Bot. Reg. sub. t. 1791. Daphnidostaphyllis pungens, Kl. in Linnea xxiv. p. 80.

N. V. Pingüica.

Acuautla, Bella Vista, á 2,500 metros (Est. de México), Mayo 1.º de 1891 (F. Altamirano); De 5-10 piés, Sierra de S. Felipe, á 7,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 7 de 1894 (C. G. Pringle, 4758).

Arctostaphyllos rupestris, Rob., n. sp.

De 5 á 15 piés. Cerros pedregosos y secos cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 14 de 1892 (C. G. Pringle, 4318).

Arctostaphyllos serratifolia.

N. V. Madroño borracho.

S. Francisco Acuautla, Bella Vista, á 2,700 metros (Est. DE MÉXICO), Mayo de 1891 (F. Altamirano); Volcán del Nevado de Colima, Marzo de 1887 (M. Bárcena, 442).

Arctostaphyllos sp.

Tlalmanalco, á 2,400 metros (Est. de México), Mayo 4 de 1890 (F. Altamirano).

Pernettya ciliaris, Don. Gen. Syst. III. p. 837; DC. Prodr. vII. p. 587.

Gaultheria ciliata, Cham et Schl. in Linnæa v. p. 126, ex Klotzsch. in Linnæa xxiv. p. 84.

Bordes de Ia cima de las montañas, cerca de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Julio 29 de 1892 (C. G. Pringle, 4115); Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4643).

Pernettya pilosa, Don. Gen. Syst. III. p. 387; DC. Prodr. vII. p. 587.

Arbutus pilosa, GRAH. Bot. Mag. t. 3177.

Gaultheria hirsuta, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. IX. p. 15; Walp. Rep. II. p. 727.

Límite de la vegetación en el Volcán del Nevado de Colima. Enero de 1887 (M. Bárcena, 441).

TRIBUS II. ANDROMEDEÆ.

Gaultheria hirtiflora, Benth. Pl. Hartw. p. 66; WALP. Rep. II. p. 727; Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 281 (t. LIII. β. figg. 4-6). Gaultheria cordata, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. IX (reprint, p. 15).

Bosques secos, Sierra de S. Felipe, de 8-10,000 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 31 de 1894 (C. G. Pringle, 4679).

TRIBUS IV. RHODOREÆ.

Bejaria mexicana, Benth. Pl. Hartw. p. 15; Seem. Bot. Boy. "Herald," p. 317, t. 57.

Cerros cerca de Guadalajara, Septiembre 24 de 1891 (C. G. Pringle, 5339).

TRIBUS V. PYROLEÆ.

Pyrola liebmannii, Lance in Vidensk. Meddel. 1867, p. 113, t. 1. Sierra de S. Felipe, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4669).

Pyrola secunda, Linn. Sp. Pl. p. 567; DC. Prodr. vn. p. 774; Fl. Dan. t. 402; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 46.

Actinocyclus secundus, Klotzsch. in Monatsb. Berl. Akad. 1857, p. 14.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Chimaphyla maculata, Pursh. Fl. Am. Sept. I. p. 300; A. Gr. Synop, Fl. N. Am. II. p. 45.

Pyrola maculata, Linn. Bot. Mag. t. 897.

Sierra de S. Felipe, á 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Julio 30 de 1894 (C. G. Pringle, 4756).

Chimaphyla menziesii, Spreng.

Sierra Madre (Est. de Chinuanua), Octubre 9 de 1888 (C. G. Pringle.....)

Chimaphyla umbellata, Nutt. Gen. 1. p. 74; Bart. Mat. Med. 1. t. 1; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 45.

Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 20 de 1892 (C. G. Pringle, 5305).

Clethra mexicana, DC. Prodr. vii. p. 590.

Clethra kowalewskii, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863), p. 233.

Clethra serrulata, Turcz. loc. cit?

Kowalcwskia integerrima, Turcz. et K. serrulata, Turcz? in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1859, t. p. 263.

Barraneas cerca de Guadalajara, Mayo 20 de 1891 (C. G. Pringle, 4014).

Clethra pringlei, Watson, n. sp.

Un árbol de 40 piés. Montañas del Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Porosí), Junio 14 y Octubre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3098).

ORDO CIII. MONOTROPEÆ.

Monotropa uniflora,* Linx. Sp. Pl. p. 555; Prodr. vii. p. 781; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. п. p. 49; Torr. Fl. N. York. t. 71; Ноок. Exot. Fl. n. t. 85.

Monotropa coccinea, Zucc. Walp. Rep. vi. p. 437; Lange in Vidensk. Meddel. 1867, p. 117, t. 2.

^{*} La Monotropa uniflora es planta parásita sobre la raíz de los árboles: el color del ovario es rosado y los pétalos blancos.

S. Ángel (Valle de México), Julio de 1881 (M. Urbina); Sierra de las Cruces (Est. de México), Septiembre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 5285).

Monotropa hypopithys, LINN.

Sierra Madre (Est. de Chinuanua), Octubre 1.º de 1887 (C. G. Pringle,)

ORDO CVI, LENNOACEÆ.

Lennoa madreporoides, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. I. p. 7; Solms. in DC. Prodr. xvii. p. 38; et Lennoaceæ t. 2. Parásita sobre varias compuestas. Cuestas cerca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4621).

ORDO CVII. PLUMBAGINEÆ.

Tribus II. PLUMBAGEÆ.

Plumbago pulchella, Boiss in DC. Prodr. XII. p. 662.

Plumbago rhomboidea, Lodd. Bot. Cav. t. 1536. non Hook.

N. V. Jiricua en Guanajuato, Pañete; Mex. Ticpatli.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 727); Huehuetoca (Est. de México), Septiembre de 1884 (M. Urbina); La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre 3 de 1887 (M. Bárcena, 132).

Plumbago scandens, Linn. Sp. Pl. p. 215; Boiss. in DC. Prodr. xii. p. 692; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. H. p. 55; Mart. Fl. Brass. fasc. Lxxx. t. 46.

Plumbago mexicana, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 221. Cempoala (Est. de Veracruz), Enero 14 de 1891 (M. Villada).

ORDO CVIII. PRIMULACEÆ.

TRIBUS II. PRIMULEÆ.

Androsace cinerascens, Rob. n. sp.

Llanuras alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosf), Julio 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3765).

TRIBUS III. LYSIMACHIEÆ.

Anagallis arvensis, Linn.

N. V. Jabonera, Coralillo, Verdolaguilla. Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 141); S Ángel

(Valle de México), Abril 16 de 1884 (M. Urbina); Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Octubre 3 de 1887 (M. Bårcena, 756); En tierra húmeda, Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 25 de 1893 (C. G. Pringle,....)

Centuneulus minimus, Linn. Sp. Pl. p. 169; DC. Prodr. viii. p. 72; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 64; Fl. Bras. x. t. 23.

Cerca de los Morales, en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 124); Lugares húmedos cerca de Guadalajara, Octubre 7 de 1891 (C. G. Pringle, 5333).

TRIBUS IV. CORIDEÆ.

Samolus ebracteatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 223, t. 129; A. Gr. Synop, Fl. N. Am. 11. p. 64.

Samodia ebracteata, Bando in Ann. Sci. Nat. serie 2, xx. p. 350. Pantanos de aguas saladas, cerca de Monterrey (Est. De Nuevo León), Junio 19 de 1889 (C. G. Pringle,....)

Вот.-53.

ORDO CIX. MYRSINEÆ.

TRIBUS II. EUMYRSINEÆ.

Parathesis crenulata, Ноок. f. in Benth. et Hook. Gen. Pl. п. p. 645.

Ardisia crenulata, Vent. Choix. t. 5; DC. Prodr. viii. p. 120, nec Lodd. Bot. Cab. t. 2.

Llano del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro); Bancos húmedos, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3101).

Ardisia pickeringia, Torr. et Gray: DC. Prodr. viii. p. 124; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 65.

De 6 á 10 piés de altura. Selvas de Palmeras, Rascón (Est. de S. Luis Porosf), Junio 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3313).

Ardisia revoluta, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111, p. 246; DC. Prodr. viii. p. 125.

N. V. Capulín manso.

Barranca de S. Jerónimo, cerca de Tenancingo (Est. de México), Marzo de 1886 (M. Villada); Cempoala (Est. de Veracruz), Enero 8 de 1891 (M. Villada).

TRIBUS III. THEOPHRASTEÆ.

Jacquinia ruscifolia, Jacq. Amer. t. 57; DC. Prodr. viii. p. 151. N. V. Siche.

Alrededores del pueblo de Atasta (Est. de Tabasco), Febrero 12 de 1888 (J. N. Rovirosa).

ORDO CX. ZAPOTACEÆ.

Tribus VI. BUMELIEÆ.

Bumelia cuneata, Sw. Fl. Ind. Occ. I. p. 496; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 68.

Sideroxylon cuneatum, A. DC. Prodr. viii, p. 181.

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2787).

Ordo CXII. STYRACEÆ.

Symplocos pringlei, Rob. n. sp.

Volcán del Nevado de Colima (Est. de Jalisco), Marzo de 1886 (M. Bárcena, 433); Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3345).

Styrax jaliscana, Warson.

Capas graníticas, Sierra de S. Estéban, cerca de Guadalajara, Junio 27 y Agosto 24 de 1893 (C. G. Pringle, 4416).

Ordo CXIII. OLEACEÆ.

TRIBUS I. JASMINEÆ.

Menodora coulteri, A. Gr. in Silliman's Journ. ser. 2, xiv. p. 44; WALP. Ann. v. p. 487.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schäffner, 67).

Menodora helianthemoides, Humb. et Bonpl. Pl. Œquin. II. p. 98, t. 110; Walp. Ann. v. p. 487.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 68).

Menodora scoparia, Engelm. Bot. Calif. 1. p. 471; A. Gr. Synop. F1. N. Am. 11. p. 78.

Cerros, Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Septiembre 8 de 1889 (C. G. Pringle,.....)

TRIBUS III. FRAXINEÆ.

Fraxinus cuspidata, Torr. Bot. U. E. &. Mex. Bound. Surv. p. 166; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II, p. 74.

Montañas de Sta. Eulalia (Est. de Chihuahua), Junio 6 de 1886 (C. G. Pringle, 851).

Fraxinus greggii, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xii. p. 64; Synop. Fl. N. Am. ii. p. 74.

Fraxinus schiedeana, var. parvifolia, Torr. Bot. U. E. &. Mex. Bound. Surv. p. 166.

Capas calizas, Paso de Carneros (Est. de Coanulla), Septiembre 19 de 1890 (C. G. Pringle, 3253).

Fraxinus viridis, Michx. f. Sylv. t. 120, excl. fruct. ex A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 75.

var. berlandieriana, A. Gr. 10c. cit.; DC. Prodr. vIII. p. 278 (species).

Fructifica en Mayo. Cerca de Guadalajara, Mayo 2 de 1895 (C. G. Pringle, 6137); Valle de Oaxaca, á 5,000 piés, Diciembre 21 de 1894 (C. G. Pringle, 6120).

Tribus IV. OLEINEÆ.

Forestiera phillyreoides, Torr. Bot. U. E. &. Mex. Bound. Surv. p. 177; A. Gr. Synop. F1. N. Am. II. p. 77.

Bancos de lava, Zapotlán (Est. DE Jalisco), Mayo 20 de 1893 (C. G. Pringle, 5370).

Forestiera racemosa, Wats. n. sp.

Base de la Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2394).

Forestiera tomentosa, Wats. n. sp.

Sitios agrestes pedregosos del Río Grande de Santiago, cerca de Guadalajara, Mayo 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3715).

ORDO CXV. APOCINACEÆ.

Tribus II. PLUMERIEÆ.

Vallesia glabra, Cav. Ic. Pl. III. p. 50, t. 297; DC. Prodr. vIII. p. 349.

Vallesia dichotoma, Ruiz et Pav. Fl. Per. II. p. 26, t. 151. f. B.

Vallesia chiococcoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 233,
t. 241.

Vallesia symbæfolia, Ort. Dec. p. 58.

Arbusto de 10 á 20 piés. Canón de Tomellín, á 2,000 piés (Est. DE OANACA), Enero 12 de 1895 (C. G. Pringle, 6102).

Vallesia mexicana, Müll. Arg. in Linnæa, xxx. p. 393. Cemponla (Est. de Venacruz), Enero 12 de 1891 (M. Villada).

Rauwolfia heterophylla, Rœm. et Sch. Syst. iv. p. 105; Hook. Ic. Pl. t. 366; DC. Prodr. viii. p. 338. Bordes del río de Tomellín, á 2,000 piés (Est. de Oaxaca), Sep-

tiembre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4861).

Thevetia neriifolia, Juss.; DC. Prodr. viii. p. 343; Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (errore laurifolia); Jacq. Amer. t. 47; Descour. Fl. Ant. iii. t. 158.

Cervera thevetia, Linn. Sp. Pl. p. 304; Bot. Mag. t. 2309. Un árbol pequeño. En terrenos bajos, Rascón (Est. de S. Luis Potosí), Junio 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4107).

Thevetia yoyotli, A. DC. Prodr. viii. p. 343. (errore iccolli).

Cervera thevetioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iii. p. 223.

N. V. Codo de fraile, Mex. Yoyotli.

Soconusco (Est de Chiapas), 1883 (R. Montes de Oca).

Vinca rosea, Linn.

Cultivada en los jardines del Fortín, cerca de Orizaba (Est. DE VERACRUZ), Abril 18 de 1890 (P. Toro).

Vinca minor, LINN.

N. V. Cielo raso.

Chimalixtac, S. Ángel (Valle de México), Abril de 1882 (M. Urbina).

Вот.-54

Plumeria lambertiana, Lindl. Bot. Reg. t. 1378; DC. Prodr. vin. p. 391.

Plumeria gouani, D. Don; G. Don, Gen. Sys. IV. p. 94.

Plumeria mexicana, Lodd. Bot. Cab. t. 1024.

Un árbol pequeño. Florece en Mayo y fructifica en Septiembre. Lugares de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 28 de 1891 (C. G. Pringle, 3712).

Stemmadenia mollis, Bentil. Bot. Voy. "Sulphur." p. 125. Arbusto de 10 á 15 piés. Bancos de lava, cerca de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 19 de 1893 (C. G. Pringle, 4370).

Stemmadenia palmeri, Kosc. in hb. Pringle.

Barranca de Guadalajara, Junio 25 de 1892 (C. G. Pringle, 5363 y 5945).

TRIBUS III. ECHITIDEÆ.

Thenardia galeottiana, BAILL.

Cañadas de las montañas, cerca de Oaxaca, á 6,500 piés. Agosto 20 de 1894 (C. G. Pringle, 4822).

Trachelospermun stans, A. GR.

N. V. Yerba de la Cucaracha.

Tenancingo (Est. de México), Septiembre de 1884 (M. Villada); S. Francisco Acuautla (Est. de México), Septiembre de 1889 (F. Altamirano); Cañadas (Est. de Сипианиа), Octubre 14 de 1885 (C. G. Pringle,....); Paso Monte León (Est. de Michoacán), Mayo 29 de 1891 (C. G. Pringle, 4012).

Echites secundiflora, A. DC. Prodr. vnt. p. 457; Calq. des Dess. Fl. Mex. 798.

Temnadenia secundiflora, MIERS. Apoc. S. Amer. p. 211.
Capas secas de las faldas de los cerros, arriba de Oaxaca, á
6,000 piés. Mayo 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4662).

Echites tubiflora, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. p. 358.

Amblyauthera tubiflora, Müll. Arg. in Linnæa. xxx. p. 454.

Barranca, Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 8 de 1893 (C. G. Pringle, 5422).

Macrosiphonia berlandieri, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 83. Echites macrosyphon, Torr. Bot. U. E. & Mex. Bound. Surv. p. 158, t. 53.

Cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 15 de 1889 (C. G. Pringle,....)

Macrosiphonia brachysiphon, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 83.

Echiles brachysiphon, Torr. Bot. U. E. &. Mex. Bound. Surv. p. 158.

N. V. Mex. Cacaloxóchitl.

Mineral del Guadalcázar (Est. DE S. Luis Potosf), Junio de 1892 (M. Villada).

Macrosiphonia hypoleuca, Müll. Arg. in Linnæa. xxx. p. 452. Echites hypoleuca, Benth. Pl. Hartw. p. 23.

Echites suaveolens, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xt. p. 356.

Rhodocalyx hypoleuca et suaveoleus, Miers. Apoc. S. Am. pp. 139, 140.

N. V. Flor de S. Juan.

Sirve para aromatizar el atole de leche.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 86), Cerros del Valle de Guadalajara, Junio de 1886 (M. Bârcena, 244); Cerros cerca de Guadalajara, Junio 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4393).

ORDO CXVI. ASCLEPIADEÆ.

TRIBUS III. CYNANCHEÆ.

Philibertia crassifolia, Hemsl. Biol. Cent. Am. II. p. 318.

Sarcostemma crassifolium, Dene. in DC. Prodr. VIII. p. 540.

Bancos de las corrientes, S. Antonio, á 2,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4849).

Philibertia cynanchoides, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 87.

Sarcostemma cynanchoides, Dene. in DC. Prodr. vIII. p. 541.

Sarcostemma bilobum, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 317.

Cercas, Ciudad Juárez (Est. De Chihuahua), Agosto 6 de 1893

(C. G. Pringle,.....)

Philibertia elegans, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 318. Sarcostemma elegans et S. bicolor, Dene. in DC. Prodr. viii.

p. 541.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 649); Cerros pedregosos, Bocas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3564); Sierras cerca de Monterrey (Est. DE Nuevo León), Junio 1.º de 1889 (C. G. Pringle,....)

Philibertia linearis, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xii. p. 64; Synop. Fl. N. Am. 11. p. 88.

Sarcostemma linearis, DCNE. in Benth. Pl. Hartw. p. 25; DC. Prodr. vIII. p. 539.

S. Juan de Xico (Lago de Chalco), Agosto 12 de 1888 (M. Urbina); Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 20 de 1893 (C. G. Pringle,....)

Philibertia pavoni, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 319. Cerros pedregosos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3227).

Oxypetalum riparium, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 197; DC. Prodr. viii. p. 582. Gothofreda cordifolia, Vent. Choix. t. 60.

Guadalajara, Julio de 1886 (M. Bárcena,....)

Gomphocarpus viridiflorus, Th. Durand Ind. p. 268.

Acerates viridiflora, Ell. ex hb. Pringle.

Sierra Madre, cerca de Monterrey (Esr. de Nuevo León), Junio 14 de 1888 (C. G. Pringle, 2259).

Asclepias arenaria, Tork.

Los Médanos (Est. de Chilluanua), Septiembre 13 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Asclepias brachystephana, Engelm. in Torr. Bot. U. E. &. Mex. Bound. Surv. p. 163; A. Gr. Synop. F1. N. Am. 11. p. 94. Llanos de Fresnillo (Est. de Zacatecas), Junio 10 de 1892 (C. G. Pringle, 5234).

Asclepias curassavica, Linn. DC. Prodr. viii. p. 566; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 90; Bot. Reg. t. 81.

N. V. Ponchishui, Plato y taza.

Barranca de Metlac (Esr. de Veracruz), Abril de 1891 (J. M.

Velasco); Sta. Cruz, Valle de Túxpan (Est. De Jalisco), Marzo de 1886 (M. Bárcena, 359 y 386).

Asclepias glaucescens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 190, t. 227; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 92.

Campos, S. Marcos (Est. de Jalisco), Junio 9 de 1893 (C. G. Pringle, 4399); Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio de 1892 (C. G. Pringle, 5279).

Asclepiás jaliscana, Rob. n. sp.

En suelo seco, llanos y cerros cerca de Guadalajara, Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4444).

Asclepias lanuginosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 193; DC. Prodr. viii. p. 564.

Chimalistac, S. Ángel (Valle de México), Abril 8 de 1892 (M. Urbina); Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Junio 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4665 y 4717).

Asclepias linaria, CAV. Ic. Pl. 1. p. 42, t. 57; DC. Prodr. viii. p. 570; Proc. Am. Acad. XII. p. 71.

N. V. Romerillo, Venenillo; Mex. Tlalayotl.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 62); Cerro del Tepeyae (VALLE DE MEXICO), Septiembre de 1881 (M. Urbina).

Asclepias longicornu, Benth. Pl. Hartw. p. 24; DC. Prodr. viii. p. 570; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 98.

Asclepias lindheimeri, Engelm et A. Gr. Pl. Lindh II. p. 42. Asclepias wnotheroides, Cham et Schl. in Linnæa. v. p. 123. Valle cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio de 1889 (C. G. Pringle, 2519).

Asclepias macroura, A. GR.

Cuestas cerca de Guadalajara, Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4467).

Asclepias melantha, DCNE. in DC. Prodr. vIII. p. 570.

Sierra de S. Felipe, de 8-9,000 piés (Est. DE OAXACA), Mayo 31 de 1894 (C. G. Pringle, 4689).

Asclepias mexicana, Cav. Ic. Pl. 1. p. 42, t. 58; A. Gr. in Proc. Am. Acad. xii. p. 71; Synop. Fl. N. Am. II. p. 96.

Asclepias fasciculata, Dene in DC. Prodr. viii. p. 569.

Asclepias macrophylla, Nutt. Pl. Gamb. p. 180.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 59); Sierra Madre, cerea de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2713).

Asclepias nyctaginifolia, Benth.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 64).

Asclepias ovata, Mart. et Gal., in Bull. Acad. Brux. xi. p. 363. Cuestas, Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 9 de 1890 (C. G. Pringle, 3070).

Asclepias pratensis, Bentu. Pl. Hartw. p. 45; DC. Prodr. vin. p. 568.

Praderas bajas que limitan el Lago de Pátzcuaro (Est. de Miсноаса́м), Julio 17 de 1892 (С. G. Pringle, 4128).

Asclepias rosea, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 189; DC. Prodr. VIII. p. 569.

Cerros cerca de Guadalajara, Mayo 22 de 1889 (C. G. Pringle, 2564).

Asclepias schaffneri, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xvi. p. 103. S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 56).

Asclepias setosa, Benth. Pl. Hartw. p. 24; DC. Prodr. viii. p. 567.

N. V. Contraverba.

Procedente de Michoacán, Septiembre de 1877 (N. León); Cerros de Guadalajara, Julio 19 de 1893 (C. G. Pringle,....)

Asclepias verticillata, Linn. Done. in DC. Prodr. viii. p. 569. excl. \(\beta\). linifolia; A. Gr. in Proc. Am. Acad. x11, p. 71; Synop. Fl. N. Am. II. p. 97; Hook. Fl. Bor. Am. II. p. 144; Lodd. Bot. Cab. t. 1067; Svett. Brit. Fl. Gard. t. 144.

Asclepias galioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 188. var. subverticillata, GRAY.

Paso del Norte (Est. de Chimuanua), Mayo 30 de 1888 (C. G. Pringle)

Asclepias sp.

Capas secas y calizas, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosi). Julio 25 de 1891 (C. G. Pringle, 3786).

Asclepias sp.

Escuela de Agricultura (VALLE DE MÉXICO), Junio de 1892 (M. Urbina).

Asclepias sp.

Volcán del Nevado de Colima, Julio de 1887 (M. Bárcena, 444). Asclepias sp.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Julio de 1887 (M. Barcena, 537).

Asclepias sp.

Cerro del Tepeyac (VALLE DE MÉXICO), Julio de 1890 (M. Villada).

Asclepiodora circinalis, Fourn.

Capas secas bajo los pinos. Sierra de S. Felipe, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4678).

Metastelma angustifolium, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1852, n. p. 315.

Cañadas. Sierra de S. Felipe, á 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4657).

Metastelma barbigerum, Scheele in Linnaa xxi, p. 760; A. Gr. Synop, Fl. N. Am. n. p. 101.

Cerca de Monterrey (Est. DE NUEVO LEÓN), Junio 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2836).

Metastelma multiflorum, Watson.

Cerros pedregosos cerca de Guadalajara, Noviembre 11 de 1889 (C. G. Pringle, 2749).

Metastelma palmeri, Wars. var.

Flores muy grandes en la variedad.

Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosi), Julio 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3138).

Metastelma schlechtendalis, DCNE. in DC. Prodr. VIII. p. 514.

Metastelma parviflorum, SCIII. in Linnæa VI. p. 731, et VIII.
p. 518, non R. Br.

Cerros arriba de Oaxaca, á 6,000 piés, Agosto 7 de 1894 (C. G. Pringle, 4766).

Metastelma sp.

Valle de Ahualulco (Est. De Jalisco), Mayo de 1886 (M. Bárcena, 497).

Enslenia ligulata, Benth. Pl. Hartw. p. 290.

En bosques espesos sobre bancos fríos, cerca de Guadalajara, Agosto 19 de 1893 (C. G. Pringle, 4494).

Cynanchum mexicanum, Th. Durand, Gen. Phan. Ind. p. 270.

Vincetoxicum mexicanum, Wats. in Proc. Am. Acad. xviii.
p. 115.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 652 in part.). Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada); Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí). Planta voluble de 10 á 15 piés, Julio 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3120).

TRIBUS IV. GONOLOBEÆ.

Dictyanthus ceratopetalus, Donnell Smith.

Cerros arriba de Oaxaca, á 6,000 piés, Agosto 6 de 1894 (C. G. Pringle, 4768).

Dyctyanthus pavonii, Dcne. in DC. Prodr. viii. p. 605; Bot. Mag. t. 4750).

Dyctyanthus campanulatus, REICB. Select. Sem. Hort. Dresde, 1850, coll. p. 4; WALP. Ann. III. p. 60.

Tympananthe suberosa, HASSK. in Flora xxx. p. 758.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Agosto de 1887 (M. Bárcena, 536); Barranca cerca de Guadalajara, Julio 20 de 1893 (C. G. Pringle, 4468).

Dictyanthus tuberosus, Rob.

Lugares cespitosos y secos, cerca de Guadalajara, Agosto 15 de 1893 (C. G. Pringle, 4482).

Gonolobus atratus, Gray.

Sitios agrestes de las barrancas, cerca de Guadalajara, Julio 11 de 1893 (C. G. Pringle, 4417); Lugares secos, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3562).

Gonolobus chihuahuensis, GRAY, n. sp.

Mesas (Est. De Синианиа), Julio 22 de 1886 (С. G. Pringle,....)

Gonolobus congestus, DCNE. in DC. Prodr. VIII. p. 597.

Bancos húmedos, cerca de Guadalajara, Agosto 25 de 1893 (C. G. Pringle, 4489).

Gonolobus diadematus, EDWARD.

Barranca de Tepic (Est. de Jalisco), Octubre 10 de 1893 (C. G. Pringle, 5429).

Gonolobus erianthus, DCNE. in DC. Prodr. VIII. p. 592.

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2673).

Gonolobus fraternus, Schl. in Linnæa xhl. p. 521; DC. Prodr. vill. p. 592.

Cerro de Guadalupe, Valle de México, Julio 18 de 1889 (M. Urbina); Capas calizas, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3076).

Gonolobus jaliscensis, Rob. et Greenm, n. sp.

Cerros pedregosos y secos, cerca de Guadalajara, Junio 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4402).

Gonolobus nemorosus, Dene, in DC. Prodr. viii. p. 596.

Valle de Oaxaca, á 5,000 piés. Mayo 14 de 1894 (C. G. Pringle, 4636).

Gonolobus niger, R. Br. in Mem. Wern. Soc. 1, p. 35; DC. Prodr. vin. p. 597; Bot. Mag. t. 2799.

Capas calizas, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3075).

Gonolobus nigrescens, Scut. in Linnæa viii. p. 522; DC. Prodr. viii. p. 597.

Lugares sombrfos y secos, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Julio de 1890 (C. G. Pringle, 3208).

Gonolobus nummularius, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 332. Chthamalia nummularia, Dene. in DC. Prodr. vIII. p. 665.

Cerros. Flor de María (Est. de México), Octubre 3 de 1892 (C. G. Pringle, 5263); Llanuras arenosas, cerca de Guadalajara, Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4471).

Gonolobus pilosus, Benth. Pl. Hartw. p. 289.

Cerca de los Morales (Est. de S. Luis Potosi), 1877 (G. Schaffner, 650); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Julio de 1887 (M. Barcena, 539).

Gonolobus prostratus, R. Br. in Mem. Wern. Soc. I. p. 35.

Lachnostoma prostratum, Dene. in DC. Prodr. viii. p. 602.

Cynanchum prostratum, Willd; Cav. Ic. 1. t. 7.

Chapultepec, Valle de México, Agosto de 1881 (M. Urbina); Tlalpam, Valle de México, Julio de 1889 (A. Herrera); Cerro de Guadalupe, Julio de 1890 (M. Villada).

Gonolobus reticulatus, Engelm. in Proc. Am. Acad. xii. p. 75.

Gonotobus granulatus, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Survey p. 165, non Scheele.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 6 de 1891 (C. G. Pringle,.....)

Gonolobus schaffneri, A. Gray, MSS; Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 334; Proc. Am. Acad. xviii. p. 116.

Montañas cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 651).

Gonolobus sororius, GRAY.

Sitios agrestes y pedregosos arriba de Tcquila (Est. DE JALISCO), Julio 3 de 1893 (C. G. Pringle, 4435).

Pherotrichis balbisii, Gray.

Cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 28 de 1892 (C. G. Pringle, 4152).

Pherotrichis leptogenia, Rob. n. sp.

Lugares secos cerca de Guadalajara, Julio 25 de 1893 (C. G. Pringle, 4466).

TRIBUS V. MARSDENIEÆ.

Marsdenia coulteri, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 336.

Cañada del Río, S. Antonio, á 2,500 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre de 1894 (C. G. Pringle, 4860).

Marsdenia maculata, Hook. Bot. Mag. t. 4299; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 422.

Capas calizas, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3077).

Marsdenia zimapanica, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 338. Barranca cerca de Guadalajara, Junio 25 de 1892 (C. G. Pringle, 4108).

INCERTÆ SEDIS.

Urostephanus gonoloboides, Rob. et Greenm. nov. gen. Cerros arriba de Oaxaca, á 6,000 piés, Agosto 6 de 1894 (C. G. Pringle, 4753).

ORDO CXVII. LOGANIACEÆ.

TRIBUS II. EULOGANIEÆ.

- Spigelia humboldtiana, Cham. et Schl. in Linnæa I. p. 200, v. p. 122, vI. p. 387; Mart. Fl. Bras. vI. p. 261.
 - Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Julio 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3106).
- Spigelia scabrella, Benth. Pl. Hartw. p. 45.
 - Sta. Cruz, Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Junio de 1886 (M. Barcena, 626); Laderas cespitosas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 6 de 1890 (C. G. Pringle, 3198).
- Spigelia speciosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 186, t. 226; DC. Prodr. IX. p. 4.
 - Cañadas sombrías y fértiles, Sierra de S. Felipe, a 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4652).
- Polypremum procumbens, Linn. Act. Ups. 1741, p. 78; DC. Prodr. iv. p. 435, ix. pp. 12 et 560; Lam. Ill. Pl. t. 71; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. it. p. 109.
 - Polypremum linnæi, Michx. Fl. Bor. Am. i. p. 83.
 - Polypremum schlechtendalii, Valp. in Nov. Act. Acad. Cæs. Leop. Carol. xix. Suppl. 1. p. 350; Rep. vi. p. 56.
 - Montes Morales, en S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 117); Cerca de Guadalajara, Septiembre 18 de 1891 (C. G. Pringle,....)
- Buddleia americana, Linn. Sp. Pl. p. 162; DC. Prodr. x. p. 438; Ruiz et Pav. Fl. Per. i. p. 53, t. 82, fig. b.
 - Buddleia occidentalis, Ruiz et Pav. loc. cit. t. 82, fig. a. Buddleia callicarpioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. 350. Buddleia decurrens, Cham. et Schl. in Linnaa v. p. 105.

Buddleia rufescens, Willib, ex Roem, et Schult, Syst. iii. Mant. p. 97.

N. V. Teposán.

Cerro de Xico (Lago de Chalco), Agosto 12 de 1888 (M. Urbina); De 8-12 piés: por las corrientes. Orizaba, á 4,000 piés (Est. de Veracruz), Enero 19 de 1895 (C. G. Pringle, 6104).

Buddleia chapalensis, Rob.

De 1-3 pies. Colgando de las hendeduras de los peñascos secos y sombríos. Cañadas de las montañas, cerca del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Noviembre 17 de 1892 (C. G. Pringle, 4350).

Buddleia floccosa, Ktn. in Abhandl. Akad. Wiss. Berl. 1844, p. 64; Linnæa xvn. p. 500.

Por las corrientes, Las Sedas, á 6,000 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4925, 6139).

Buddleia humboldtiana, Ræm. et Schult, Syst. in. Mant. p. 93; DC. Prodr. x. p. 438; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. ii. p. 109. Buddleia acuminata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. ii. p. 349, t. 187.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 635); Sierra de las Cruces (Est. de México), Diciembre 12 de 1892 (C. G. Pringle, 4315); Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3951); Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 2 de 1899 (C. G. Pringle, 2652).

Buddleia lanceolata, Венти. Pl. Hartw. p. 48; DC. Prodr. х. p. 437.

N. V. Tepozán cimarrón 6 de cerro; Mex. Mixpatli.

Tetecala y Miacatlán (Est. de Morelos), Septiembre de 1884 (M. Garcla); Cerro del Pino, cerca de Ayotla, Valle de México, Noviembre 1.º de 1888 (M. Urbina).

Buddleia macrophylla, Kuntu. in Abhandl. Akad. Wiss. Berl. 1844, p. 67; Linnæa xvin. p. 500.

S. Francisco Acuautia, cerca de Ayotia (Est. de México), Noviembre de 1886 (M. Urbina).

Buddleia marrubiifolia, BENTH. in DC. Prodr. x. p. 441; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 109.

Querétaro, Abril de 1886 (M. Urbina).

Buddleia perfoliata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 346; DC. Prodr. x. p. 441.

Buddleia sperantha, CHAM. et Schl. in Linnæa v. p. 104.

En las montañas, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 634); Cerro de Xico (Lago de Chalco), Agosto 12 de 1888 (M. Urbina); Cerros calizos entre Tehuacán y Esperanza, á 8,000 piés (Est. de Puebla), Enero 12 de 1895 (C. G. Pringle, 6103).

Buddleia pringlei, A. Gr.

Barranca de S. Jerónimo, Tenancingo (Est. DE MÉXICO), Encro de 1886 (M. Villada); Chapultepec (VALLE DE MÉXICO), (Dr. A. Dugès).

Buddleia scordioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 345, t. 183: DC. Prodr. x. p. 442; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 109.

N. V. Escobilla & Yerba de las escobas.

En los montes, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 633); Bocas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 21 de 1890 (C. G. Pringle, 3470).

Buddleia verticillata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 346, t. 184; DC. Prodr. x. p. 441.

N. V. Tepozán, Tepuza, Tepozancillo, Salvia.

En los montes, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 632); Chapultepec (Valle de México), Marzo de 1882 (M. Urbina); Llano de S. Pedro (Valle de Guadalajara), Abril de 1887 (M. Bárcena, 215); Guanajuato, Marzo de 1891 (Dr. A. Dugès); Cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 28 de 1891 (C. G. Pringle, 4067).

Buddleia sp.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosi, Diciembre de 1881 (D. Cano). Buddleia sp.

N. V. Salvia.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Marzo de 1886 (M. Bárcena, 489).

Buddleia sp.

N. V. Salvia.

Planta característica de terreno propio para el Mexcal. Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Marzo de 1886 (M. Bárcena, 490).

Buddleia sp.

Coatepec, cerca de Ayotla (Est. de México), Noviembre 2 de 1888 (M. Urbina).

ORDO CXVIII. GENTIANEÆ.

TRIBUS II. CHIRONIEÆ.

Leianthus nigrescens, Griseb. Gen. et Sp. Gentian. p. 199; Bot. Mag. t. 4043.

Petasostylis nigrescens, GRISEB. in DC. Prodr. IX. p. 71.

Lisianthus nigrescens, Cham. et Schl. in Linnæa vi. p. 388.

Lisianthus cuspidatus, Bertol. Fl. Guat. t. 37.

Leianthus cuspidatus, GRISEB. in DC. Prodr. IX. p. 82.

Cerro de S. Cristóbal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro).

Erythræa calicosa, Buckley in Proc. Acad. Philad. 1862, p. 7; A. Gr. Synop. F1. N. Am. 11. p. 113.

Cerros calizos y secos cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Mayo 28 de 1889 (C. G. Pringle, 2508).

var. Bancos de arroyos, Ortiz (Est. de Chinuahua), Mayo 21 de 1887 (C. G. Pringle, 1560).

Erythræa divaricata, Schaffner ex Schl. in Bot. Zeit. 1855, p. 920.

Erythræa chilensis, Benth. Pl. Hartw. p. 87, non Pursh?

Cerros en lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Diciembre 11 de 1889 (C. G. Pringle, 2436); Suelo húmedo cerca de Orizaba, á 4,200 piés (Est. de Veracruz), Febrero 2 de 1895 (C. G. Pringle, 6122).

Erythræa macrantha, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 438.

Erythræa mexicana, Griseb. ex Hook. et Arn. Ioe. cit. p. 302?

Girandra chironioides, Griseb. in DC. Prodr. ix. p. 44?

Erythræa chironioides, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 156, pro parte?

Montañas cerca del Lago de Chapala (Est. DE Jaliseo), Diciembre 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2422).

Erythræa madrensis, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 346. Lugares húmedos: cerros cerca de Guadalajara, Noviembre 20 de 1889 (C. G. Pringle, 2597). Erythræa setacea, Benth. Voy. "Sulphur," p. 128.

Grietas de cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Noviembre 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2596).

Erythræa speciosa? DC.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 79).

Erythræa stricta, Schiede ex Schl. in Bot. Zeit. 1855, p. 918. N. V. Canchalagua.

Barranca del Salto, Amecameca (Est. DE México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Erythræa tetramera, Schiede ex Schl. in Bot. Zeit. 1855, p. 918. N. V. Tlanchalagua 6 Canchalagua.

Entre Tetecala y Miacatlán (Est. DE Morelos), Septiembre de 1884 (P. García).

Geniostemon schaffneri, Engelm. et Gray. in Proc. Am. Acad. xvi. p. 104; Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 347, t. Lvii. B. figg. 6-8.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 80); Bancos y capas calizas y secas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 16 de 1890 (C. G. Pringle, 3172).

Sabbatia gracilis, Salisb?

Praderas alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 4 de 1891 (C. G. Pringle, 3810).

Schultesia mexicana, Watson, n. sp.

Lugares húmedos, llanuras cerca de Guadalajara, Octubre 19 de 1889 (C. G. Pringle, 2598).

Eustoma silenifolia, Salisb.

Bancos de Ribera, Rascón (Est. de S. Luis Potosí), Junio 22 de 1892 (C. G. Pringle, 5304).

Lisianthus sp.

N. V. Pitillo.

Chihuahua, Septiembre de 1888 (M. Garcilaso).

TRIBUS III. SWERTIEÆ.

Gentiana adsurgens, Cervantes; Griseb. Gent. p. 286; DC. Prodr. ix. p. 113.

Pneumonanthe bicuspidata, G. Don. Gen. Syst. Iv. p. 194?

Ixtapalapam (Valle de México), Julio de 1886 (M. Villada);
Praderas húmedas, Valle de Toluca (Est. de México), Octubre 30 de 1892 (C. G. Pringle, 4309).

Gentiana amarella, Linn. var. acuta, Hook f. in Trans. Linn. Soc. xxIII. p. 334; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 118.

Gentiana acuta, Michx. F1. Bor-Am. 1. p. 177.

Lugares arenosos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4277).

Gentiana angustifolia, Michx. Fl. Bor-Am. 1. p. 177; DC. Prodr. 1x. p. 144; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 124.

En las ciénegas, Calimaya (Valle de Toluca), Septiembre de 1887 (F. Altamirano).

Gentiana calyculata, Llav. et Lex. Nov. Gen. Descr. 1. p. 118; DC. Prodr. 1x. p. 112.

Coilanthe moçini, G. Don. in G. Don's Syst. Iv. p. 185?

Barranca del aire. Cerro del Pino, cerca de Ayotla (Est. de México), Noviembre 1.º de 1888 (M. Urbina).

Gentiana lanceolata, GRISEB. in DC. Prodr. 1x. p. 102.

Leianthus lanceolatus, Benth. Pl. Hartw. p. 24.

Montañas cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3941).

Gentiana spathacea, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 195. Ericala spathacea, G. Don. Gen. Syst. 1v. p. 191.

N. V. Flor de hielo,

S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1883 (D. Cano); Cerro del Pino, cerca de Ayotla (Est. de México), Noviembre 1.º de 1888 (M. Urbina); Lugares cespitosos. Cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Міснолсям), Noviembre 28 de 1891 (C. G. Pringle, 3982).

Gentiana wislizeni, ENGELM. in Trans. Acad. St. Louis, II. p. 215, t. 7; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 119.

Lugares fríos. Sierra Madre (Est. de Синианиа), Septiembre 24 de 1887 (C. G. Pringle, 1328).

Gentiana wrightii, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 118.

Praderas húmedas (Valle de Toluca), Agosto 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4196).

var. Praderas húmedas (Nevado de Toluca), á 11,000 piés, Septiembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 4237).

Halenia crassicula, Rob. et Sea., n. sp.

Cimas estériles alpinas (Nevado de Toluca), á 14,000 piés, Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4229).

Halenia longicornu, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xt. 1, p. 370; Walp. Rep. vi. p. 508.

Sierra de S. Felipe, à 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 15 de 1894 (C. G. Pringle, 4908).

Halenia plantaginea, GRISEB. Gent. p. 327; DC. Prodr. IX. p. 139. Swertia plantaginea, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 175.

En los bosques de pinos del Nevado de Toluca, Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4224); Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 23 de 1894 (C. G. Pringle, 4720).

Halenia parviflora, Don. Gen. Syst. IV. p. 177.

Exadenus parviflorus, Griseb. in DC. Prodr. ix. p. 128.
Swertia parviflora, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 174.
Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 14 de 1889 (C. G. Pringle, 2735).

Halenia pringlei, Rob. et Sea. n. sp.

Praderas ricas, Sierra de las Cruces (Est. DE México), Agosto 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4209).

Halenia rothrocki, A. Gr. in Proc. Am. Acad. xi. p. 84; Rothr. in Wheeler's Rep. t. 21.

Sierra Madre (Est. de Chinuahua), Septiembre 24 de 1887 (C. G. Pringle, 1329).

TRIBUS IV. MENYANTHEÆ.

Limnanthemum humboldtianum, GRISEB. Gent. p. 347; DC. Prodr. IX. p. 140.

Villarsia humboldtiana, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 187.

Menyanthes indica, Aubl. Pl. Guian. I. p. 118; Descourt. Fl.

Antill. 1. p. 112, t. 24.

Pantanos cerca de Guadalajara, Junio 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2573).

ORDO CXIX. POLEMONIACEÆ.

Collomia cavanillesiana, Dox. Gen. Syst. IV. p. 247; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 136.

Phlox pinnata, Cav. Ic. Pl. t. 528, fig. 1.

Cantua glomeriflora, Juss. in Ann. Mus. III. p. 119.

Gilia glomeriflora, BENTH. in DC. Prodr. IX. p. 314.

Faldas de la Sierra Madre (Еsт. DE Синиания), Septiembre 7 de 1887 (С. G. Pringle, 1331).

Collomia longiflora, A. Gr. Proc. Am. Acad. viii. p. 261; Synop. Fl. N. Am. II. p. 136.

Gilia longiflora, Don. Gen. Syst. IV. p. 245; DC. Prodr. IX. p. 314; TORR. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 146.

Cantua longistora, Torr. in Sitgreave's Rep. t. 7.

Los médanos (Est. de Chihuahua), Septiembre 13 de 1888 (C. G. Pringle,)

Gilia floccosa, A. GR.

Paso del Norte (Est. de Chihuahua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,)

Gilia incisa, Benth. in DC. Prodr. IX. p. 312; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 149; Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 146. Montañas cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio de 1889 (C. G. Pringle, 2785).

Gilia polycladon, Torr.

Mesas secas, Paso del Norte (Est. de Сипиания), Abril 25 de 1893 (С. G. Pringle, 4411).

Gilia pringlei, n. sp.

Cerros y mesas (Est. DE Синианиа), Septiembre de 1886 (С. G. Pringle, 774).

Pelemonium mexicanum, Cerv. in Lag. Gen. et Sp. Nov. p. 10; DC. Prodr. 1x. p. 317.

Lerma (Est. de México), Julio de 1890 (F. Altamirano); Sierra de las Cruces (Est. de Michoacán), Julio 10 de 1892 (C. G. Pringle, 5283).

Lœselia cærulea, Don. Gen. Syst. Iv. p. 248; DC. Prodr. Ix. p. 319.

Hoitzia cærulea, CAV. Ic. Pl. IV. t. 366.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 639); Ixtapalápam (VALLE DE MÉXICO), Junio de 1886 (M. Urbina); Valle de Ahualulco (Est. DE JALISCO), Marzo de 1886 (M. Bårcena, 494).

Lœselia ciliata, Linn. Sp. Pl. p. 875; DC. Prodr. Ix. p. 319; Lank.
III. t. 527.

Hoitzia aristata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 164.

Læselia aristata, Don. Gen. Syst. IV. p. 248.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Marzo de 1886 (M. Bârcena, 495).

Lœselia coccinea, Don. Gen. Syst. Iv. p. 247; DC. Prodr. Ix. p. 318; Regel's Gartenfl. t. 643.

Hoitsia coccinea, CAV. Ic. Pl. IV. t. 365.

Hoitzia mexicana, Lam. Dict. III. p. 134.

N. V. Espinosilla, Mcx. Huitsitzilin.

En las montañas cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 638); Tlálpam (Valle de México), Enero de 1881 (M. Urbina); Cerro de Sta. Cruz (Est. de Jalisco), Febrero de 1886 (M. Bárcena, 493); Cerros cerca de Guadalajara, Noviembre 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2662).

Lœselia glandulosa, Don. Gen. Syst. IV. p. 248; DC. Prodr. IX. p. 319.

Hoitzia glandulosa, CAv. Ic. Pl. t. 367.

Læselia cervantesii, conglomerata, et nepetæfolia, Don. Gen. Syst. IV. p. 248.

Hoitzia cervantesii et conglomerata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. pp. 164 et 165.

Hoitsia elata, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 441.

Hoitsia spicata, et capitata, WILLD. in Roem. et Schult. Syst. IV. D. 370.

Hoitsia nepetæfolia, Chamb. et Schl. in Linnæa vi. p. 385.

Pedregal de S. Ángel (VALLE DE MÉXICO), Diciembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 5218).

Bonplandia geminiflora, Cav. in Ann. Hist. Nat. п. р. 131, t. 20; Ic. Pl. t. 532.

Caldasia heterophylla, Willd. Hort. Berol. t. 71; DC. Prodr. ix. p. 320; Bot. Reg. t. 92.

Capas calizas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 30 de 1891 (C. G. Pringle, 4062).

Cobæa scandens, Cav. Ic. Pl. 1. p. 15, tt. 16 et 17; Bot. Mag. t. 851; Fl. des Serres, t. 1647.

N. V. Flor de la campana.

Tenancingo (Est. de México), Septiembre de 1884 (M. Villada).

ORDO CXX. HYDROPHYLLACEÆ.

TRIBUS II. PHACELIEÆ.

Phacelia cærulea, GREENE.

Paso del Norte (Est. de Chihivanua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,)

Phacelia circinata, Jaco. f. Eclog. I. p. 135, t. 91; DC. Prodr. IX. p. 298; A. Gr. Synop. Fl. N. Am, II. p. 159.

Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 6 de 1892 (C.

G. Pringle, 5250).

Phacelia congesta, Hook. Bot. Mag. t. 3452; DC. Prodr. Ix. p. 299; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 160.

Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 14 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Phacelia pimpinelloides, A. Gr. in Proc. Am. Acad. x. p. 321. Eutoca pimpinelloides, Spreng. Syst. 1. p. 569.

Cosmanthus mexicanus, A. DC. Prodr. IX. p. 297.

Eutoca mexicana, Benth. in Trans. Linn. Soc. xvII. p. 277.

Eutoca and rieuxii, A. DC. Prodr. 1x. p. 294.

En los campos y montañas, cerca de Pátzcuaro (Est. DE MI-CHOACÁN), Agosto 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4165).

TRIBUS III. NAMEÆ.

Wigandia caracasana, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 128; Bot. Mag. t. 4575?; Bot. Reg. t. 1966?

Árbol pequeño. Monte Albán, cerca de Oaxaca, Noviembre 27 de 1894 (C. G. Pringle, 6014, 6060).

Wigandia scorpioides, Choissy in DC. Prodr. x. p. 184; DC. Calo, dcs Dess. Fl. Mex. 873.

N. V. Consuelda mayor.

Cerro del Borrego, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro); Teoloyúcan (Est. de México), Agosto de 1886 (M. Urbina).

Wigandia kunthii, Choissy in DC. Prodr. x. p. 184; Biol. Cent. Am. Bot. t. Lyin.

Wigandia urens, H. B. K. Nov. Gen. ct Sp. m. p. 127, non Choissy.

Cerca de la gruta de Cacahuamilpa (Est. de Guerrero), Enero de 1886 (M. Villada); De 6 à 10 piés de altura, sitios agrestes, cerca de Guadalajara, Mayo 25 de 1891 (C. G. Pringle, 2370).

Nama dichotomum, Choissy in DC. Prodr. x. p. 182; A. Gr. in. Proc. Am. Acad. v. p. 338, viii. p. 283.

Hydrolea dichotoma, Ruiz et Pav. Fl. Peruv. t. 244.

Cerros, Las Canoas (Est. DE S. Luis Potost), Septiembre 30 de 1890 (C. G. Pringle, 3312).

var. angustifolium, A. Gr. in Proc. Am. Acad. viii. p. 284; Synop. Fl. N. Am. n. p. 175.

Montes de S. Rafael, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaff-ner, 613).

Nama hirsutum, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2. p. 277 (reprint. p. 93); Walp. Rep. vi. p. 565.

Barrancas húmcdas, Sierra de S. Felipe, á 1,500 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4791).

Nama hispidum, A. Gr. in Proc. Am. Acad. v. p. 339; Synop. Fl. N. Am. II. p. 174.

Paso del Norte (Est. de Chimuanua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,)

Nama origanifolium, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 130, t. 218.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 732).

Nama palmeri, A. Gr. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 361.

N. V. Yerba de la punzada.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 77); Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

Nama sericeum, WILLD. in Rœm. et Schult. Syst. vi. p. 189.

Nama longiflorum, Cноіssy Hydrol, t. 2. f. 2; DC. Prodr. х. р. 183.

var. Peñascos secos, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3059).

Nama undulatum, H. B. K. Nov. Gcn. et Sp. 111. p. 130; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 174.

Nama echioides, Griseb. Symb. ad Fl. Argent. p. 277.

N. V. Yerba de la punzada.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 78); Guadalajara, Mayo de 1886 (M. Bárcena, 229).

TRIBUS IV. HYDROLEÆ.

Hydrolea spinosa, Linn. Sp. Pl. p. 328; Aubl. Guian. i. t. 10; Bot. Reg. t. 566; DC. Prodr. x. p. 181.

N. V. Ortiga.

Caracteriza tierra tobosa y pobre. Valle de Ahualulco (Est. DE JALISCO), Marzo de 1886 (M. Bárcena, 223).

ORDO CXXI. BORRAGINEÆ.

TRIBUS I. CORDIEÆ.

Cordia alba, REM. et SCHULT. Syst. IV. p. 466.

Varronia calyptrata, A. DC. Prodr. Ix. p. 469.

Cordia dentata, VAHL. Ecl. III. p. 5; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 70.

Terrenos bajos, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 25 de 1891 (C. G. Pringle, 3754).

Cordia brevispicata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 2. p. 231; Walp. Rep. vi. p. 553.

De 3-5 piés. Cerros calizos, cerca de Oaxaca, á 5,200 piés (Est. De Oaxaca), Mayo 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4638).

Cordia boissieri, A. DC. Prodr. Ix. p. 478; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 180.

N. V. Anacahuite.

Mesas, eerea de Monterrey (Est. de Nuevo León). Florece en Junio; 1889 (C. G. Pringle, 2682).

Cordia cana, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 2-p. 331 (reprint, p. 15); Walp. Rep. vi. p. 555.

De 5 à 15 piés de altura. Barranca de Tequila (Est. DE Ja-Lisco), Julio 4 de 1893 (C. G. Pringle, 4436).

Cordia dodecandra, A. DC. Prodr. Ix. p. 478; Calq. des Dess. Fl. Mex. t. 874.

N. V. Guallabillo, Copito.

Teocaltzingo (Est. de Guerrero), Diciembre de 1875 (F. Altamirano).

Cordia macrocephala, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 77; DC. Prodr. 1x. p. 497.

De 10-15 piés. Cañon de Tomellín, á 2,500 piés (Est. DE OAXAca), Mayo 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4630).

Cordia podocephala, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 135; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 180.

Cerros cerea de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 3 de 1889 (C. G. Pringle, 2647).

Cordia pringlei, Ros, n. sp.

Arbusto de 10 á 15 piés. Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3091).

TRIBUS II. EHRETIEÆ.

Ehretia cordifolia, Rob. n. sp.

Arbol grande. Valle de Zapotlán (Est. DE JALISCO), Mayo 19 de 1893 (C. G. Pringle, 4382).

Ehretia elliptica, DC. Prodr. IX. p. 503; MIERS. Contrib. Bot. II. p. 229.

Arbol pequeño. Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosi), Junio 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3709).

Ehretia luxiana, Donnell Smith, in hb. Pringle.

Árbol pequeño. Monte Albán, eerca de Oaxaca, a 5,800 piés. Septiembre 4 de 1894 (C. G. Pringle, 6138).

Ehretia mexicana, Watson, n. sp.

Falda de las montañas, eerca del Lago de Chapala (Est. DE Jalisco), Mayo 19 de 1890 (C. G. Pringle, 3085).

Coldenia canescens, DC. Prodr. IX. p. 559; A. GR. Synop. Fl. N. Am. II. p. 181.

Mesas calizas, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 19 de 1889 (C. G. Pringle, 2689).

TRIBUS III. HELIOTROPIEÆ.

Tournefortia hirsutissima, Linn. Sp. Pl. p. 201; DC. Prodr. ix. p. 517; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 483.

Cañón de Tamasopo (Est de S. Luis Potosí), Septiembre 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3646).

Tournefortia laurifolia, Vent. Choix. t. 2; DC. Prodr. 1x. p. 522; Griseb. F1. Brit. W. Ind. p. 484.

Montañas, Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 14 de 1892 (C. G. Pringle, 4104).

Tournefortia mexicana, Vatke Ind. Sem. Hort. Berol. 1876, App. p. 1.

N. V. Tlachichinoa; Mex. Tlepatli.

Tetecala y Miacatlán (Est. de Morelos), Septiembre de 1884 (F. Altamirano); S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1883 (D. Cano); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Marzo de 1886 (M. Bárcena, 508).

Tournefortia trichocalycina, DC. Prodr. 1x. p. 517.

De 10 á 15 piés. Surcos de labor. Valle de Oaxaca, á 5,200 piés. Agosto 6 de 1894 (C. G. Pringle, 4776).

Tournefortia velutina, H. B. K. Nov. Gen. ct Sp. 111. p. 79, t. 201; DC. Prodr. 1x. p. 524.

De 5 á 6 piés. Por las corrientes. S. Antonio, á 2,500 piés (Est. De Oaxaca), Septiembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 4855).

Heliotropium americanum, Mill. Dict. n. 11; DC. Prodr. 1x. p. 549.

N. V. Cola de Alacrán.

Cempoala (Est. de Veracruz), Enero 14 de 1891 (M. Villada).

Heliotropium angustifolium, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound.
Surv. p. 137; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 184.

Cerros calizos y secos, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 20 de 1889 (C. G. Pringle, 2711). Heliotropium curassavicum, Linx. Sp. Pl. p. 188; DC. Prodr. 1x. p. 538; Bot. Mag. t. 2669.

N. V. Cola de mico.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 724); Chapultepec (Valle de México), Mayo de 1882 (M. Urbina).

Heliotropium filiforme, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. m. p. 86, t. 204; Griseb. Fl. Brit, W. Ind. p. 486.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel);
Alrededores de S. Juan Bautista (Est. de Tabasco), Abril de 1888 (J. N. Rovirosa).

Heliotropium inundatum, Swartz, Fl. Ind. Occ. 1. p. 343; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 185.

Heliotropium procumbens, canescens, et cinereum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. pp. 88 et 89, t. 206.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 726).

Heliotropium limbatum, Benth. Pl. Hartw. p. 20; DC. Prodr. 1x. p. 543.

L'Ianuras arcnosas, cerca de Guadalajara, Agosto 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4499).

Heliotropium pringlei, Rob. n. sp.

Suelo delgado de cerros pedregosos, Las Canoas (Est. de S. Luis Porosi), Julio 16 de 1890 (C. G. Pringle, 3207).

Heliotropium sp.

Planta rastrera, Llano de S. Pedro (Est. De Jalisco), Agosto 31 de 1887 (M. Bárcena, 3); Belén, Guadalajara, Septiembre 24 de 1887 (M. Bárcena, 42).

Tribus IV. BORRAGEÆ.

Omphalodes mexicana, Watson.

Capas calizas, montañas cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 1.º de 1889 (C. G. Pringle, 2697).

Echinospermum mexicanum, Hensl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 377.

Cynoglossum mexicanum, Cham. ct Schl. in Linnæa v. p. 114; DC. Prodr. x. p. 156.

De 3-4 piés. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 22 de 1894 (C. G. Pringle, 4832).

Вот.-60.

Echinospermum redowskii, Lehm.

var. occidentalis, Warson.

Paso del Norte (Est. de Chilluanua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,....)

Eritrichium floribundum, Bent. et Hook.

Krynitzkia floribunda, A. Gr.

Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 14 de 1890 (C. G. Pringle, 3604).

Eritrichium hispidum, Buckley in Proc. Acad. Philad. 1861, p. 462; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 195.

Montes de S. Rafael, en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 73). Eritrichium jamesii, Torr. in Marcy's Rep. p. 294; Bot. U. S.

et Mex. Bound. Surv. p. 140.

Cerros arenosos cerca del Paso del Norte (Est. de Chimaniua), Septiembre 29 de 1886 (C. G. Pringle, 776).

Eritrichium linifolium, Bent. et Hook.

Krynitzkia linifolia, A. Gr.

Hoquedades musgosas de las praderas. Flor de María (Est. DE Mexico), Septiembre 9 de 1892 (C. G. Pringle, 4241).

Eritrichium micranthum, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 141; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 193. Paso del Norte, Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,)

Eritrichium pusillum, Torr. et Gray. in Pacif. Railr. Rep. n. p. 171; Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 141. Llanuras cerca de Chihuahua, Marzo 31 de 1886 (C. G. Pringle, 863).

Eritrichium sp.

N. V. Cabeza de negro.

S. Juan de Xico, Lago de Chalco (Est. de México), Agosto de 1888 (M. Urbina); Chimalhuacán (Est. de México), Septiembre de 1890 (M. Urbina).

Borrago officinalis, Linn. Sp. Pl. p. 197; DC. Prodr. x. p. 35. N. V. Borraja silvestre.

La Presa, Valle de Guadalajara, Marzo de 1887 (M. Bárcena, 241, 758).

Antiphytum floribundum, A. Gr. in Proc. Am. Acad. x. p. 55; Synop. Fl. N. Am. II. p. 199.

Eritrichium floribundum, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 140.

Montes de S. Miguelito en S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 730).

Macromeria discolor, Benth. Pl. Hartw. p. 49; DC. Prodr. x. p. 69.

Montañas boscosas arriba de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4146).

Macromeria exserta, Dox. in Edinb. N. Phil. Journ. 1832, p. 239; GEN. Syst. IV. p. 326; D.C. Prodr. x. p. 68; Bot. Reg. 1847, t. 26.

De 3-4 piés. Sierra de S. Felipe, á 7,000 piés (Est. de Oaxaca), Julio de 1894 (C. G. Pringle, 4820).

Onosmodium strigosum, Don. Gen. Syst. iv. p. 317; DC. Prodr. x. p. 69.

Onosma trinervia, Lehm. Asperif. II. p. 378, t. 9.

Onosma strigosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 93.

Ajusco (Valle de México), Julio de 1878 (М. Urbina); Amecameca (Еst. de México), Julio de 1881 (М. Urbina); Cerros arriba de Pátzeuaro (Еst. de Місноаса́я), Julio 22 de 1892 (С. G. Pringle, 4131).

Lithospermum arvense, Linn. Sp. Pl. p. 190; DC. Prodr. x. p. 74.

Ozumba (Est. de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina).

Lithospermum calcicola, Rob. n. sp.

Capas calizas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 11 de 1890 (C. G. Pringle, 3529); Bosques de encinas, en lugares secos. Cañón de las Hoyas, á 5,500 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 6026).

Lithospermum distichum, Ort. Dec. p. 8; DC. Prodr. x. p. 77; Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (reprint, p. 21).

Montes de S. Miguelito en S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 729).

Lithospermum spathulatum, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi (reprint, p. 21); DC. Prodr. x. p. 78.

Sitios agrestes, Valle de Toluca, Agosto de 1892 (C. G. Pringle, 4203).

Lithospermum strictum, Lehm. Asperif. p. 303; DC. Prodr. x. p. 78; Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brúx. xl. (reprint. p. 22).

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 76); Praderas, Flor de Maria (Est. de México), Septiembre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3245). Una variedad de hojas anchas y flores grandes, igual al número 728 de Schaffner; Praderas alcalinas, Hacienda de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Julio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3802).

Echium candicans, LINN.

Cultivada en los jardines. Marzo de 1890 (M. Urbina).

ORDO CXXII. CONVOLVULACEÆ.

TRIBUS I. CONVOLVULEÆ.

Ipomœa bracteata, Cav. Ic. Pl. v. p. 51, t. 477.

Ipomæa spicata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 112.

Exogonium spicatum, Choisy in DC. Prodr. 1x. p. 347.

Exogonium bracteatum, Don. Gen. Syst. IV. p. 264.

Exogonium olivæ, BARCENA, Viaje á la Caverna de Cacahuamilpa, p. 28, cum ic. color.

var. pubescens, Rob. et Greenm. n. yar.

Especie de parra, flojamente voluble, de 15 piés. Barranca cerca de Guadalajara, á 4,500 piés. Mayo 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4734).

Ipomœa capillacea, Don. Gen. Syst. Iv. p. 267.

Ipomæa muricata, Cav. Ic. Pl. v. p. 52, t. 478, non Jacq. Hort. Scheenb, III. t. 323.

Ipomæa armata, Ræm. et Schult. Syst. iv. p. 214.

Leptocallis quinata, Don. Gen. Syst. Iv. p. 260.

Convolvulus capillaceus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 97.

Quamoclit pedata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p. 271; Walp. Rep. vi. p. 529?

Herbacea, trepadora, flor blanca poco abierta. Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Barcena, 562); Cerros de Guadalajara, Julio 15 de 1893 (C. G. Pringle,)

Ipomœa dubia, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 386.

Calonyction dubium, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. * 2, p. 268; Walp. Rep. vi. p. 531.

Tallo más bien rastrero. Faldas de los cerros, arriba de Oaxaca, de 6-7,000 piés. Junio de 1894 (C. G. Pringle, 4693).

Ipomœa intropilosa, Rose in hb. Pringle.

Un pequeño árbol con ramas dispuestas á torcerse. Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 5,700 piés. Octubre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4965).

Ipomœa hederifolia, Linn. Sp. Pl. p. 229; Meissn. in Fl. Bras. vii. p. 218, t. 76, fig. 1.

Quamoclit russelliæflora, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p. 271; Walp. Rep. vi. p. 529?

Ipomæa coccinea, Linn.

var. heredifolia, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. u. p. 209.

Iponica sanguinea, Vahl. Bot. Reg. t. 9; Bot. Mag. t. 1769.

Ipomwa hastigera, H. B. K. Nov. Gen. et.Sp. m. p. 111.

Quamoclit hastigera, Don. Gcn. Syst. Iv. p. 259.

Quamoclit hederifolia, Choissy in DC. Prodr. 1x. p. 336, excl. syn. Ipomwa peduncularis, Bertol.

Ipomæa humboldtiana, Ræm. et Schult. Syst. iv. p. 789. N. V. Chiauco de monjas.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 622); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 551).

Ipomeea heterophylla, Ort. Dec. p 9; Jaco Fragm. t. 42, f. 4.

Pharbitis heterophylla, Choissy in DC. Prodr. ix. p. 344.

Batatas heterophylla et wildenowii, Don. Gen. Syst. iy. p. 261.

Ipomæa wildenowii, Ræm. et Schult. Syst. IV. p. 211.

Cerca de los Morales, en S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 619).

Ipomœa leptotoma, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound, Surv. p. 150; A. Gr. Synop, Fl. N. Am. H. p. 214.

Barranca de Tequila (Est. DE JALISCO), Julio 4 de 1893 (C. G. Pringle, 4439).

Ipomœa læta, A. Gr.

Cerros cerca de Guadalajara, Julio 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4456).

Ipomœa longepedunculata, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 387.

Pharbitis longepedunculata, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p. 271.

Вот.-61.

Lugares cespitosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Julio 24 de 1893 (C. G. Pringle, 4448).

Ipomœa longicuspis? Meissn. in Fl. Bras. vii. p. 227. Pharbitis speciosa, Choissy in DC, Prodr. ix. p. 343.

Pharbitis cuspidata, Don. Gen. Syst. IV. p. 263.

Xico, Lago de Chalco (Valle de México), Abril de 1881 (M. Urbina); Calimaya (Est. de México), Octubre de 1888 (F. Altamirano).

Ipomœa llaveana, Meissn. in Fl. Bras. vii. p. 219.

Morenoa grandiflora, LLAV. et LEX. Nov. Gen. 1 p. 17.

Quamoclit grandiflora, Don. Gen. Syst. IV. p. 259.

Calboa globosa, Lindl. in Journ. Hort. Soc. v. p. 83. cum ic. xylogr. nec. Morenoa globosa, Llav. et Lex.

Faldas del Volcán de Colima, Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 414).

Ipomœa madrensis, WATSON.

Cerros de Patzcuaro (Est. de Michoacán), Agosto 2 de 1892 (C. G. Pringle, 5279).

Ipomea murucoides, Rem. et Schult. Syst. IV. p. 246; DC. Prodr. IX. p. 538; Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 390, t. LXI.

Convolvulus macranthus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 95. Ipomæa macrantha, Don. Gen. Syst. Iv. p. 267.

N. V. Cazahuate, Ozote.

Cerro del Tepeyac (VALLE DE MÉXICO), Enero de 1882 (M. Urbina); Arroyo de Enmedio (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 498); Arbol pequeño. Valle de Oaxaca, 4 5,000 piés. Noviembre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 6066).

Ipomoa pedatisecta, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p. 265; Walp. Red. vi. d. 535.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 561).

Ipomœa perlonga, Rob. n. sp.

Cerros de Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 15 de 1893 (C. G. Pringle, 4519).

Ipomœa pringlei, GRAY.

Llanuras. La Honda (Est. DE ZACATECAS), Agosto 6 de 1891 (C. G. Pringle, 4070).

Ipomœa schaffneri, Wars. in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 123.
En lugares arenosos cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 621).

Ipomœa sidæfolia, Choissy in DC. Prodr. ix. p. 372; Meissy in Fl. Bras, vii. p. 267; Griseb, Fl. Brit. W. Ind. p. 468.

N. V. Yololique; Mex. Oliliuhqui.

Est. de Guanajuato, Septiembre de 1891 (A. Espinosa); Barranca de Tepic (Est. de Jalisco), Octubre 11 de 1893 (C. G. Pringle, 4549).

Ipomœa stans, Cav. Ic. Pl. III. p. 26, t. 250; DC, Prodr. IX. p. 355.

Convolvulus stans, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 96.

N. V. Tumba vaqueros, Espanta lobos.

Cerro del Tepcyae (Valle de México), Julio de 1892 (M. Urbina).

var. hirsuta, Rob. n. var.

Llanuras cerca de Guadalajara, Agosto 30 de 1893 (C. G. Pringle, 4488).

Ipomœa suffulta, Don. Gen. Syst. IV. p. 276; DC. Prodr. IX. p. 372.

Convolvulus suffultus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 102, t. 211.

Cerros calizos cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Agosto 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4755).

Ipomœa versicolor, Meissn. in Fl. Bras. vii. p. 220.

Mina lobata, LLAV. et LEX. Nov. Veg. 1. p. 3; Bot. Reg. 1842, t. 24.

Quamoclit mina, Don. Gen. Syst. IV. p. 259.

N. V. Palmira.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 111).

Ipomœa sp.

En lugares arenosos, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 620); Vatte de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 552).

Ipomœa sp.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 553).

Ipomœa sp.

N. V. Yedra.

Valle de Ahualuleo (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 558).

Ipomœa sp.

S. Pedro, Valle de Guadalajara, Marzo de 1886 (M. Bárcena, 242).

Ipomœa sp.

N. V. Chismes.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 550).

Ipomœa sp.

N. V. Yedra, Yedrita del Llano.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 360, 554, 555 y 559).

Jacquemontia smithii, Rob. et Greenm. n. sp.

De 2-3 piés. Suelo calizo, seco. S. Antonio, à 2,500 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4894).

Convolvulus arvensis, Linn.

Guadalajara, Mayo de 1887 (M. Búrcena, 227); Río de los Morales (Valle de México), Agosto de 1890 (M. Urbina).

Convolvulus incanus, Vail. Symb. III. p. 23; Meissn. in Fl. Bras. vii. p. 311; A. Gr. Sinop. Fl. N. Am. II. p. 216.

Convolvulus bonariensis et C. dissectus, Cav. Ic. Pl. v. t. 480. Convolvulus equitans, Benth. Pl. Hartw. p. 16.

Convolvulus glaucifolius, Choissy in DC. Prodr. ix. p. 412; non Spreng. ex A. Gr.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 618).

Convolvulus albiflorus? Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. p. 259; Walp. Rep. vi. p. 545.

Cerro del Tepeyac (VALLE DE MÉXICO), Julio de 1890 (M. Villada).

Evolvulus alsinoides, Linn. Sp. Pl. p. 392; DC. Prodr. ix. p. 447; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. ii. p. 218.

Evolvulus linifolius, Linn. Sp. Pl. loc. cit.; DC. Prodr. ix. p. 449. Evolvulus linoides, Moric. Pl. Nouv. d'Am. t. 83.

Evolvulus microphyllus et E. pilosissimus, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2. p. 257; Walp. Rep. vi. p. 542.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 560); Llanos de Guadalajara, Junio 27 de 1893 (C. G. Pringle,)

Evolvulus prostratus, Rob. n. sp.

Suelo delgado y seco de los cerros de Guadalajara, Julio 26 de 1893 (C. G. Pringle, 4445).

TRIBUS I. DICHONDREÆ.

Dichondra argentea, Humb. et Bonpl. ex Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. p. 297; et Hort. Berol. t. 81; Meissn. in Fl. Bras. vu. p. 359; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 208.

N. V. Oreja de ratón.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 617).

TRIBUS V. CUSCUTEÆ.

Cuscuta arvensis, Beyrich. Engelm. in Trans. St. Louis. Acad. 1. p. 494; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 223.

var. verrucosa, Engelm. ex Watson in Proc. Am. Acad. xviii. p. 124.

Parasita sobre la Ximenezia encelioides.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 780); Campos bajos y pantanos. Atequiza (Est. DE Jalisco), Mayo 17 de 1890 (C. G. Pringle, 3111).

Cuscuta corymbosa, Ruiz et Pavón; Engelm. in Trans. St. Louis Acad. 1. p. 483.

Cuscuta inclusa, Choissy Cusc. t. 2, fig. 2, et in DC. Prodr. ix. p. 455.

Cuscuta laxiflora, Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 138.

Cuscuta stylosa, Choissy in DC. Prodr. ix. p. 459.

Montañas cerca del Lago de Chapala (Est. De Jalisco), Noviembre 19 de 1892 (C. G. Pringle, 4331).

Cuscuta mitræformis, Engelm in Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars. tertia, p. 54.

Montañas cerca del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Noviembre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4330).

Cuscuta obtusiflora, H. B. K.

Cañadas boscosas de la Sierra Madre (Est. de Chihuahua), Octubre 2 de 1887 (C. G. Pringle, 1342).

Cuscuta potosina, Schaffner, MSS. ex Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 124.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 779).

Cuscuta tinctorea, Mart. Engelm. in Trans. St. Louis. Acad. 1. p. 480.

N. Mex. Zacatlaxcalli.

Parásita sobre el Árbol del Perú (Schinus molle).

En los montes cerca de S. Luis Potosi, 1877 (G. Schuffner, 781); Flores aromáticas. Cerros boscosos, cerca de Guadalajara, Septiembre 2 de 1893 (C. G. Pringle, 4529); Sierra de S. Felipe, 4 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 6 de 1894 (C. G. Pringle, 4967).

Cuscuta sp.

Valle de Río Grande, Paso del Norte (Est. de Chinuanua), Septiembre 14 de 1886 (C. G. Pringle, 785).

Cuscuta sp.

Mesas cerca de Altar (Est. DE Sonora), Agosto 26 de 1884 (C. G. Pringle, 105).

ORDO CXXIII. SOLANACEÆ.

Tribus I. SOLANEÆ.

Solanum appendiculatum, Dun. in DC. Prodr. xiii. 1, p. 39; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. iii. p. 19; Linnæa, xix. p. 274.

Trepadora sobre los árboles. De 20-30 piés, Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 4922).

Solanum cervantesii, Lac. Nov. Gen. et Sp. p. 10; DC. Prodr. xui. 1, p. 103.

Solanum pubigerum, Dun. Sol. p. 160, t. 6.

Chapultepec (Valle de México), Diciembre de 1881 (M. Ur. bina); Cañadas húmedas. Sierra de S. Felipe, á 9,500 piés (Est. de Oaxaca), Junio 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4680).

Solarum dulcamara, LINN.

N. V. Flor de Gloria.

Cultivada en los jardines.

Museo Nacional, Diciembre de 1891 (M. Urbina).

Solanum elæagnifolium, Cav. Ic. Pl. III. p. 22, t. 243; DC. Prodr хи. 1, р. 290 (varietates); A. Gr. Synop, Fl. N. Am. и. р. 230. Solamun leprosum, ORT. Dec. 1x. p. 115; Dun. Sol. t. 12. Solamum hindsianum, Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 39.

Solanum texense, Exgelm, et Gray Pl. Lindh, 1, p. 45. Solamum ræmeriamum, Scheele in Linnæa xxi, p. 767.

S. Luis Potosí 1877 (G. Schaffner, 695); Escuela de Agricultura (Valle de México), Abril de 1882 (M. Urbina); Querétaro, Abril de 1886 (M. Urbina); Llanuras y mesas cerca de Chihuahua, Agosto 16 de 1887 (C. G. Pringle, 1566).

Solanum heterodoxum, DC. ex Dun, Sol. p. 235, t. 25; DC. Prodr. xiii. 1, p. 331; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II, p. 231.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 696); Llanuras cerca de Chihuahua, Septiembre 30 de 1885 (C. G. Pringle, 604).

Solanum jamesii, Torr. in Ann. Lyc. N. York. H. p. 227; A. Gr. Synop, F1, N. Am, n. p. 227.

Bancos fríos de Guadálajara, Julio 11 de 1893 (C. G. Priugle,....)

Solanum lamberti, Dun. in DC. Prodr. XIII, 1, p. 268.

N. V. Berengena.

Márgenes del Río del Agostadero, en Cempoala (Est. DE VE-RACRUZ), Enero 14 de 1891 (M. Villada).

Solanum macrantherum, Dun. Syn. p. 16, et in DC. Prodr. xu. 1, p. 87.

Lugares bajos que limitan el Lago de Cuitzeo (Est. DE MI-CHOACÁN), Agosto 9 de 1892 (C. G. Pringle, 4188).

Solanum nigrum, Linn. DC. Prodr. xiii. 1, p. 50; Sendr. in F1. Bras. x. p. 16; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 437; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 227 (varietates).

Solamum crenato-dentatum, Dun. in DC. Prodr. XIII. 1, p. 54. Solanum pterocaulon, Dun. Sol. p. 153; Dill. Hort, Eith. t. 275.

Solamun nodiflorum, JACQ. Ic. Pl. Rar. H. t. 326. Solamını oleraceum, Rich; DC, Prodr. xiii, 1, p. 50.

N. V. Tomate, Yerba mora, Solano negro.

Chapultepec (VALLE DE MÉXICO), Abril de 1881 (M. Urbina); En lugares arenosos cerca de S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 692); Agua azul (Valle de Guadalajara), Abril de 1886 (M. Barcena, 179); Paso de Monte León (Est. DE MI-CHOACÁN), Mayo 30 de 1891 (C. G. Pringle, 4009).

var. dillenii, Gray.

Arbusto de 5-10 piés. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 6 de 1894 (C. G. Pringle, 4948).

Solanum pringlei, Rob. et Greenm. n. sp.

Sierra del Lago de Chapala (Esr. DE JALISCO), Noviembre 18 de 1892 (C. G. Pringle, 5343).

Solanum refractum, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p 304; DC. Prodr. xni. 1, p. 233.

Pedregal de Zapotlán (Est. DE Jalisco), Mayo 19 de 1893 (C. G. Pringle,)

Solanum rostratum, Dun. Sol. p. 234, t. 24; DC. Prodr. xm. 1, p. 231.

Solamum heterandrum, Pursii. Fl. Am. Sept. i. p. 156, t. 7. N. V. Mala muger.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 696).

Solanum tequilense, A. Gr.

Cerros cerca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 15 de 1893 (C. G. Pringle, 4579).

Solanum torvum, Sw. Prodr. p. 47; DC. Prodr. xiii. 1, p. 260; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 441; Dun. Sol. t. 23; Sendt. in Fl. Bras x. p. 95, t. 7, figg. 1-8.

Solanum ferrugineum, Jacq. Hort. Scheenb. 111. t. 334.

N. V. Sosa.

Chapultepec y S. Francisco Acuautla (Valle de México), Julio de 1888 (M. Urbina); Los Colomitos (Valle de Guadalajara), Abril de 1887 (M. Barcena, 218, 752); Cerros. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3901); De 4-5 piés. Cerros cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Septiembre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4891).

Solanum tuberosum, Linn. Sp. Pl. p. 282; DC. Prodr. xiii. 1, p. 31; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 227; Hemsl. in Tourn. Hort. Soc. Lond. n. s. v. p. 123.

N. V. Papa ó Patata.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 693 y 694).

Solanum sp.

Colomitos (Valle de Guadalajara), Mayo de 1887 (M. Bárcena, 220).

Solanum sp.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Julio de 1887 (M. Bárcena, 541).

Physalis angulata, Linn.; DC. Prodr. xiii. 1, p. 448; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 436; A. Gr. in Proc. Am. Acad. x. p. 64, et Synop. Fl. N. Am. II. p. 234.

Physalis linkiana, NEES in Linnæa vi. p. 471; DC. Prodr. 1. c.

N. V. Costomate; Mex. Costomatl.

Barrio de Chimalistae en S. Ángel (Valle de México), Abril de 1882 (M. Urbina).

Physalis feetens, Poir.; DC. Prodr. XIII. 1, p. 446; GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 435.

Physalis fætidissima, Lag. Nov. Gen. et Sp. p. 10.

Dc 3-5 piés. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. de Oa-xaca), Octubre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 6,001).

Physalis glutinosa, Scul. in Linnæa xix. p. 310; DC. Prodr. xiii. 1, p. 435.

Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 5315).

Physalis leptophylla, Rob. et Greenm. n. sp.

Barranca, camino de Tepic (Est. De Jalisco), Octubre 11 de 1893 (C. G. Pringle, 5455).

Physalis microphysa, A. Gr. n. sp.

Montes de Sta. Eulalia (Еsт. DE Силианиа), Septiembre 15 de 1888 (С. G. Pringle,.....)

Physalis mollis, Nutr. in Trans. Am. Phil. Soc. ser. 2, v. p. 194; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. п. p. 236.

var. cinerascens, Gray ex Watson in Proc. Am. Acad. xviii. p. 126.

N. V. Jaltomate; Mex. Xaltomatl.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 700).

Physalis sp.

Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Physalis sp.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Julio de 1887 (M. Bárcena, 510).

Physalis sp.

Jalapa (Est. de Veracruz), Marzo de 1885 (R. Montes de Oca).

Chamæsaracha coronopus, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 232.

Solanum coronopus, Dun. in DC. Prodr. xiii. 1, p. 456.

Вот.-63.

Withania? coronopus, Torr. Bot. U. E. et Mex. Bound. Surv. p. 155.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 703).

Saracha umbellata? G. Dox, Gen, Syst, iv. p. 451; DC. Prodr. xiii. 1, p. 431? ex Mart. et Gal, in Bull. Acad. Brux. xii. 2 (reprint. p. 6).

N. V. *Tinguara 6 Jaltomate:* en Guadalajara se usa como condimento.

Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina); Suburbios de la ciudad de Guadalajara, Julio de 1887 (M. Bârcena, 221).

Bassovia donnell-smihtii, Coult.

De 10 piés de altura. Barranca de Beltrán (Est. de Jalisco), Junio 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4378).

Bassovia mexicana, B. L. Rob. n. sp.

De 5 á 15 piés. Cañon de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 14 de 1890 (C. G. Pringle, 3071); Jalapa (Est. de Veracruz), Mayo de 1885 (R. Montes de Oca).

Capsicum baccatum, Linn. DC. Prodr. xiii. 1, p. 420; Fingerii.
Monog. p. 13, t. 4, fig. a; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 436; A.
Gr. Synop. Fl. N. Am. ii. p. 231.

Capsicum mycrophyllum, Dun. in DC. Prodr. xIII. 1, p. 421; FINGERH. Monog. t. 4, fig. b.

N. V. Chiltepiquín.

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 11 de 1889 (C. G. Pringle, 2706).

Brachistus pringlei, WATSON.

Capas calizas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 17 de 1891 (C. G. Pringle, 4057).

Margaranthus solanaceus, Schl. Hort. Hal. p. 1, t. 1; DC. Prodr. XIII. 1, p. 453; A. GR. Synop. Fl. N. Am. II. p. 237. Margaranthus tenuis, Miers. III. S. Am. Pl. II. p. 74, t. 57. Cerros y llanuras cerca de Chihuahua, Septiembre 30 de 1886 (C. G. Pringle, 1079). Withania? melanocystis, Rob. n. sp.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio a Octubre de 1890 (C. G. Pringle, 3285).

- Cacabus mexicanus, Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 127.
 Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 704).
- Nicandra physaloides, G.ERIN. Fruct. II. p. 237, t. 131; Bot. Mag. t. 2458.

N. V. Tomate de culebra.

Agua azul (Valle de Guadalajara), Junio de 1886 (M. Bárcena, 178, 753).

Nectouxia formosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. н., р. 11, t. 193; DC. Prodr. хил. 1, р. 480.

Nectouxia bella, Miers. Ill. S. Am. Pl. II, p. 32, t. 40.

Escuela de Agricultura (VALLE DE MÉXICO), Abril de 1882 (M. Urbina).

TRIBUS II. ATROPEÆ.

Lycium brachyantum, GRAY MSS. in hb. Kew.

"Corolla fere campanulata calycem breviter 4-dentatum vix superanti, fauce villosissima insigne." Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 426.

Llanuras. Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 1.º de 1891 (C. G. Pringle, 3749).

Lycium carolinianum, Linn.

Tallos rastreros ó trepadores, de 5 á 10 piés,

Praderas salinas que limitan el Lago de Cuitzeo (Est. DE MI-CHOACÁN), Agosto 8 de 1892 (C. G. Pringle, 4174).

Lycium pallidum, Miers, III. S. Am. Pl. II. p. 108, t. 67; Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 154; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 238.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 54).

Lycium torreyi, A. Gr. in Proc. Am. Acad. vi. p. 47; Synop. Fl. N. Am. II. p. 239.

Paso del Norte (Est. de Chihuahua), Mayo de 1888 (C. G. Pringle,....)

TRIBUS III. HYOSCYAMEÆ.

- Datura ceratocaula, Ort. Dec. p. 11; DC. Prodr. XIII. 1, p. 544; Bot. Mag. t. 3352; Bot. Reg. t. 1031; Jaco. Hort. Schoenb. III. t. 309.
 - N. V. Tornaloco, en Guadalajara: el fruto es comido por los patos en el Valle de México.
 - Potreros pantanosos de Aragón (Valle de México), Agosto de 1884 (F. Altamirano); Pantanos superficiales cerca de Morelia (Est. de Michoacán), Julio 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4130).
- Datura quercifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. ni. p. 7; DC.
 Prodr. xiii. 1, p. 541; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. ni. p. 240.
 S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 705 y 706).
- Datura stramonium, Linn/Sp. Pl. p. 179; DC. Prodr. XIII. 1, p. 540. Fl. Dan. t. 436; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 240. N. V. Toloache; Mex. Toloatzin.

Valle de México, Septiembre de 1881 (M. Urbina).

- Datura tatula, Linn. Sp. Pl. p. 256; Griseb. in Fl. Brit. W. Ind. p. 434; Desc. Fl. Antill. III. t. 173; Sweet. Brit. Fl. Gard. t. 83; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 240.
 - Datura stramonium, β. tatula, DCNE. in DC. Prodr. XIII. 1, p. 540.
 - Coatepec, cerca de Tlalmanalco (Est. de México), Noviembre 2 de 1888 (F. Altamirano).

Hyoscyamus albus, Linn.

Cultivada y naturalizada en varios estados de 1a República. N. V. Beleño blanco.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 708); Jardines, Valle de México, Julio de 1881 (M. Urbina).

TRIBUS IV. CESTRINEÆ.

Cestrum dumetorum, Schl. in Linnæa vii. p. 61; DC. Prodr. xiii. 1, p. 651.

var. phyllobotryon, Dun.

De 10-15 piés. Valle de Oaxaca, á 5,000 piés. Octubre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 6012).

Cestrum fasciculatum, Miers. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. p. 151; Linnea, xix. p. 260; DC. Prodr. xiii. 1, p. 599.

Habrothamnus fusciculatus, ENDL. in Walp. Rep. III. p. 122; Trans. Hort. Soc. Lond. n. s. III. t. 2; Bot. Mag. t. 4183; Fl. des Serres 1. p. 50.

Meyenia fasciculata, Schl. ex Linnæa vni. p. 251.

De 8-12 piés. Cerros arriba de Orizaba, á 4,200 piés. Febrero 3 de 1895 (C. G. Pringle, 6127).

Cestrum Ianatum, Marr. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2 (reprint. p. 18); DC. Prodr. xiii. 1, p. 619.

Monte Albán, cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Noviembre 23 de 1894 (C. G. Pringle, 6063).

Cestrum nitidum, Marr. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2 (reprint. p. 19); DC. Prodr. xiii. 1, p. 612.

Sierras cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 4098); De 10–20 piés. Cañadas húmedas, Sierra de S. Felipe, á 8,500 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 6073).

Cestrum terminale, Dun. in DC. Prodr. xm. 1, p. 608.

Cestrum parqui, BENTH. Pl. Hartw. p. 24, non Linn.

Chapultepec (Valle de México), Marzo de 1884 (M. Urbina); Montepozo, Tenancingo (Est. de México), Enero de 1886 (M. Villada); De 2 á 3 piés de altura. Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 14 de 1890 (C. G. Pringle, 3342).

Nicotiana repanda, Willb. Lehm. Nic. p. 40, t. 3; DC. Prodr. xiii. 1, p. 569; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 242.

Cerros de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 8 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Nicotiana rustica, Linn.

N. V. Tabaquillo.

Jaripeo (Est. de Michoacán), Diciembre de 1887 *(M. Villada)*. Nicotiana sp.

N. V. Tabaquillo.

Llano de S. Pedro (Valle de Guadalajara), Abril de 1888 (M. Bárcena, 222).

TRIBUS V. SALPIGLOSSIDEÆ.

Petunia parviflora, Juss. in Ann. Mus. Par. II. p. 216, t. 47; MIERS. III. S. Am. Pl. I. t. 23; DC. Prodr. XIII. 1, p. 575; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 243.

Nicotiana parviflora, LEHM. Nic. p. 48.

Callibrachoa procumbens, LLAV. et LEX. Nov. Veg. II. p. 3.
Leptophragma prostrata, Benth. ex Dun. in DC. Prodr. XIII.
1, p. 575.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 612); Guadalajara, Abril de 1887 (M. Barcena, 219).

Petunia sp.

Amecameca (Est. de México), Mayo de 1882 (M. Urbina).

Bouchetia erecta, DC. Prodr. XIII. 1, p. 589; BENTII. et HOOK.
Gen. Pl. II. p. 908; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 244.
Nierembergia anomala, Miers. Ill. S. Am. Pl. I. t. 20.
Nierembergia staticæfolia, SENDT. in Fl. Bras. x. p. 179.
Leucanthea ræmeriana, Scheele in Linnæa xxv. pp. 258, 259.
S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 611).

Bouchetia procumbens, DC. Prodr. XIII. 1, p. 589; Calques des Dess. Fl. Mex. 920; Benth. et Hook. Gen. Pl. II. p. 908, sub. Nierembergia.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 69).

Nierembergia angustifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 9, t. 198; DC. Prodr. XIII. 1, p. 586.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 610); Valle cerca de Morelia (Est. de Michoacán), Julio 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4149).

Leptoglossis texana, A. Gr.

Cerros cerca de Monterrey (Est. DE Nuevo León), Mayo 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2687).

Ordo CXXIV. SCROPHULARINEÆ.

TRIBUS I. LEUCOPHYLLEÆ.

- Leucophyllum minus, A. Gr. in Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 115, Synop. Fl. N. Am. II. p. 250.
 - Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Agosto 13 de 1890 (C. G. Pringle, 3460),
- Leucophyllum texanum, Benth. in DC. Prodr. x. p. 344; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 250.
 - Cerros pedregosos, cerca de Monterrey (Est. De Nuevo León).
 Junio 28 de 1888 (C. G. Pringle,....)

TRIBUS IV. CALCEOLARIEÆ.

- Calceolaria mexicana, Benth. Pl. Hartw. p. 47; DC. Prodr. x. p. 205.
 - Calceolaria trachelifolia, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. XII (reprint, p. 2); Walp. Rep. vi. p. 634.
 - Cerca del agua. Guadalajara, Mayo 6 de 1893 (C. G. Pringle,). Por 10s arroyos. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 26 de 1894 (C. G. Pringle, 4712).

TRIBUS V. HEMIMERIDEÆ.

- Alonzoa caulialata, Ruiz et Pav. Syst. Veg. Pl. Peruv. et Chil. p. 152; DC. Prodr. x. p. 256.
 - Hemimeris parviflora et mutisii, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 376.
 - De 3-5 piés. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4990).
- Angelonia angustifolia, BENTH. in DC. Prodr. x. p. 254.
 Praderas bajas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potost), Julio 15
 de 1890 (C. G. Pringle, 3226).

TRIBUS VI. ANTIRRHINEÆ.

Linaria canadensis, Dun.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 81).

Antirrhinum maurandioides, A. Gr. in Proc. Am. Acad. vii. p. 376, Synop. Fl. N. Am. II, p. 254.

Maurandia antirrhiniflora, Humb. et Bonpl. ex Willd. Hort. Berol. t. 83; DC. Prodr. x. p. 296; Bot. Mag. t. 1643; Reichb. Fl. Exol. t. 291.

Maurandia personata, LAG. Nov. Gen. et Sp. p. 19. Usteria antirrhiniflora, POR. Dict. Suppl. v. p. 105. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 749).

Maurandia barclayana, Lindl. Bot. Reg. t. 1108; Lood. Bot. Cab. t. 1381; DC. Prodr. x. p. 297.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 748).

Maurandia erubescens, A. Gr. in Proc. Am. Acad. vii. p. 377.

Lophospermum erubescens, D. Don. in Sweet's Brit. Fl. Gard1830. ser. 2, t. 75 in nota; Zucc. in Flora 1832, п. Beibl. p. 61;
DC. Prodr. x. p. 297; Bot. Reg. t. 1381.

Capas calizas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3704).

Maurandia semperflorens, Ort. Chav. Monog. p. 78; DC. Prodr. x. p. 297; Bot. Mag. t. 460; Jaco. Hort. Scheenb. III. t. 288. Usteria scandens, Cav. Ic. Pl. II. t. 116.

Maurandia scandens, Pers. Syn. II. p. 160, nec. A. Gr.

N. V. Cunde amor?

Atotoniico el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel). Grietas pedregosas, Monte Albán, á 5,800 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 14 de 1894 (C. G. Pringle, 4786).

TRIBUS VII. CHELONEÆ.

Pentstemon baccharifolius, Hook. Bot. Mag. t. 4627; A. GR. in Proc. Am. Acad. vi. p. 58; et Synop. Fl. N. Am. ii. p. 251, var. β. schaffneri, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. ii. p. 443. Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 751).

Pentstemon barbatus, Nutr. Gen. Am. Pl. II. p. 53; DC. Prodr. x, p. 329; A. Gr. in Proc. Am. Acad. vi. p. 59; Synop, Fl. N. Am. 11. p. 261; Bot. Reg. xxv. t. 21.

Chelone barbata, CAV, Ic. Pl. 111, t. 242.

Chelone ruellioides, ANDR. Bot. Rep. t. 34.

Sitios agrestes, Flor de María (Esr. DE México), Septiembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3247).

var. wislizeni, A. Gr. in Proc. Am. Acad. vi. p. 59; Synop, Fl. N. Am. II. p. 262.

Pentstemon coccineus, Engelm. in Mem. Wistiz, p. 107.

Sierra Madre (Est. de Chinahua), Septiembre de 1887 (C. G. Pringle.....

Pentstemon campanulatus, Willip, Sp. Pl. III, p. 228; DC. Prodr. x. p. 326; A. Gr. in Proc. Am. Acad. vi. p. 74; Bot. Mag. tt. 1878 et 3884; Jaco. Hort. Scheenb. nr. t. 362,

Chelone elegans, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II, p. 364.

Chelone campanulata, CAV. Ic. Pl. I. t. 29.

Chelone campanuloides, ANDR. Bot. Rep. t. 40.

Pentstemon kuntii, G. Don. Gen. Syst. IV. p. 639.

Chelone angustifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. 365, t. 173.

Chelone rosea, CERV. CX Sweet's Brit. F1, Gard. t. 230.

Pentstemon roseus, G. Don. Gen. Syst. Iv. p. 639.

Pentstemon angustifolius, Lindl. Bot. Reg. t. 1122; Lopp. Bot. Cab. t. 1420.

Pentstemon elegans, Trauty. Comm.

Chelone atropurpurea, Sweet's Brit, FI, Gard, t. 235.

Pentstemon atropurpureus, G. Don. in Lond. Hort. Brit. p. 243; Lodd. Bot. Cab. t. 1429.

Pentstemon pulchellus, Lindl., Bot. Reg. t. 1138; Lopp. Bot. Cab. t. 1429.

Volcán del Nevado de Colima, á 3,365 metros de altitud. Marzo de 1886 (M. Bárcena, 437); Jaripeo (Est. DE MICHOACÁN), Noviembre de 1887 (M. Villada); Sitios agrestes y calizos, Flor de María (Est. de México), Agosto 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3232); Cuestas sombrías, cerca de Chihuahua, Agosto 20 de 1887 (C. G. Pringle, 1570).

Pentstemon imberbis, TRAUTV. de Pentast. in Comment. Acad. Petrop. iv. 1839; DC. Prodr. x. p. 324; A. Gr. in Proc. Am. Acad. vi. p. 59.

Pentstemon humboldtii, Don. Gcn. Syst. Iv. p. 640.

Chelone imberbis, H. B. K. Nov. Gcn. et Sp. 11. p. 363.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 752); Soconusco (Est. de Cinapas), Marzo de 1883 (R. Montes de Oca).

Pentstemon perfoliatus, Brong.; DC. Prodr. x. p. 326; Proc. Am. Acad. vi. p. 74.

Pentstemon connatus, Deppe in Otto et Dietr. Allg. Gart.-z. XII. p. 276.

Pentstemon cordatus et Pentstemon verticillatus, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. XII. (reprint, pp. 3. &. 4); Walp. Rep. vI. pp. 639 et 640.

De 4-6 piés. Sierra de S. Felipe, a 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4773).

Pentstemon pumilus, Nutt.

var. incanus, Watson.

Montes Cautillas (Baja California), Julio 5 de 1882 (C. K. Orcutt. ex hb. Pringle).

Pentstemon rotundifolius, A. Gr. n. sp.

Colgando de las hendeduras de las rocas pedregosas, principalmente sobre las caras de los peñascos no expuestos al sol. Montañas de Mapula (Евт. DE Синианиа), Octubre de 1886 (С. G. Pringle, 1159).

Pentstemon stenophyllus, A. Gr. in Torr. Bot. U. S. et Mcx. Bound. Surv. p. 112, Proc. Am. Acad. vi. p. 65; Synop. Fl. N. Am. II. p. 64.

Sierra Madre (Est. de Chihuahua), Septiembre de 1887 (C. G. Pringle,....)

Pentstemon tenuifolius, BENTH. Pl. Hartw. p. 22; DC. Prodr. x. p. 322; Proc. Am. Acad. vi. p. 64.

Montes de los Morales, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 753).

Pentstemon sp.

Soconusco (Est. de Chiapas), Marzo de 1883 (R. Montes de Oca).

Russelia sarmentosa, Jacq. Amer. p. 178, t. 113; DC. Prodr. x. p. 332; Regel, Gartenfl. t. 5 (varietates plures); De 2 á 5 piés. Barranca de Metlac, á 3,000 piés (Est. de Veracruz), Enero 29 de 1895 (C. G. Pringle, 6081).

Scrophularia coccinea, LINN. Sp. Pl. p. 866.

Russelia multiflora, Sims. Bot. Mag. t. 1582.

Russelia ternifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 360.

Russelia syringæfolia. Ch. et Schl. in Linnæa, vl. p. 376.

Russelia paniculata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. 2, p. 19; Walp. Rcp. vi. p. 640.

Russelia polyedra, Zucc. Pl. Nov. vel min. Cogn. fasc. II. p. 20. Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosf), Junio de 1892 (M. Villada); Barranca, Guadalajara, Junio 20 de 1893 (C. G. Pringle,.....)

Collinsia cavanillesi, Gray.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 75).

Berendtia spinulosa, Watson, n. sp.

Capas calizas, montañas cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 17 de 1889 (C. G. Pringle, 2663).

Leucocarpus alatus, Don. in Sweet's Brit. Fl. Gard. ser. 2, t. 124; DC. Prodr. x. p. 335.

Leucocarpus perfoliatus, Bent. in DC. Prodr. x. p. 335.

Minulus perfoliatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 371; Bot.

Mag. t. 3067).

Conobea alata, Gran. in Edinb. New. Phil. Journ. 1830.

Dc 2 á 4 piés. En arena húmcda, Barranca de Atenquique (Est. DE JALISCO), Junio 10 de 1893 (C. G. Pringle, 4407).

TRIBUS IX. GRATIOLEÆ.

Mimulus glabratus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 370; DC. Prodr. x. p. 371.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 743); S. Diego, al Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1881 (D. Cano).

Mimulus sp.

Querétaro, Noviembre de 1886 (M. Urbina).

Mimulus sp.

Tlalmanalco (Est. de México), Agosto de 1890 (M. Villada).

Stemodia bartsioides, Benth. Pl. Hartw. p. 23; DC. Prodr. x. p. 384.

Praderas bajas que limitan el Lago de Cuitzeo (Est. de Mi-CHOACÁN); Agosto 8 de 1892 (C. G. Pringle, 4190).

Stemodia durantifolia, Sw. Obs. p. 240; DC. Prodr. x. p. 383; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II, p. 279.

Stemodia verticillaris, Link. Reichb. Ic. Exot. II. t. 149.

Montes de los Morales (S. Luis Porosí), 1877 (G. Schaffner, 714); Arroyos, Guadalajara, Mayo 6 de 1893 (C. G. Pringle,); De 2-3 piés. Por las corrientes, Cuicatlán, a 2,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 7 de 1894 (C. G. Pringle, 6035).

Conobea pusilla, Benth. et Hook. Gen. Pl. 11. p. 951.

Schistophragma pusilla, Benth. in DC. Prodr. x. p. 392.

var. major, BENTH. et HOOK.

Suelo seco, cerros de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 3 de 1893 (C. G. Pringle, 4574).

Herpestis auriculata, WATSON.

Oquedades húmedas, cerros cerca de Guadalajara, Noviembre 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 4623).

Herpestis rotundifolia, Pursh.

En agua superficial, cerca de Guadalajara, Octubre 10 de 1889 (C. G. Pringle, 3009).

Gratiola mexicana, Watson, n. sp.

En agua superficial, cerca de Guadalajara, Octubre 19 de 1889 (C. C. Pringle, 2468).

Hysanthes gratioloides, Benth. in DC. Prodr. x. p. 419; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. H. p. 283,

Capraria gratioloides, Linn. Sp. Pl. p. 876.

Herpestis callitrichoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 367. Cerca de Morales, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 121).

Limosella aquatica, Linn. Sp. Pl. p. 881; DC. Prodr. x. p. 426;
A. Gr. Synop. Fl. N. Am. H. p. 284; REICHB. Ic. Fl. Germ. t. 1722; Fl. Dan. I. t. 69.

Cerca de Morales, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 125).

TRIBUS X. DIGITALEA.

Sibthorpia pichinchensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. H. p. 390, t. 176; DC. Prodr. x. p. 428.

Sibthorpia retusa, H. B. K. loc. cit. p. 391, t. 177.

Sibthorpia parvifolia, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p. 25; Walp. Rep. vi. p. 644.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 83); Crestas de 1a Sierra de S. Felipe, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4681); Sierra de Clavellinas, del mismo Estado, Octubre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4992).

Scoparia annua, Cn. et Schl. in Linnea vi. p. 375; DC. Prodr. x. p. 431.

Campos arenosos cerca de Oaxaca, á 5,300 piés. Septiembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4851).

Scoparia duleis, Linn. Sp. Pl. p. 168; DC. Prodr. x. p. 431; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 426; Lamk. Ill. t. 85.

Por los arroyos, cerros cerca de Guadalajara, Diciembre 10 de 1888 (C. G. Pringle, 2130).

Veronica peregrina, LINN. Sp. Pl. p. 20; DC. Prodr. x. p. 482; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 288; Fl. Dan. III. p. 407; REICHB. Pl. Crit. I. t. 36.

Veronica xalapensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 389. Cerca de los Morales, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 723).

TRIBUS XI. GERARDIEÆ.

Escobedia linearis, Schl. in Linnea viii. p. 246; DC. Prodr. x. p. 337; Biol. Cent. Am. Bot. ii. p. 456. t. lxii.

Escobedia lævis, CH. et SCHL. in Linnæa v. p. 108.

Escobedia stricta, Zucc. in Flora, 1832, 11. Beibl. p. 100. N. V. Azafrancillo.

Lago de Chalco (Valle de México), Agosto de 1888 (M. Urbina); Pantanos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 29 de 1891 (C. G. Pringle, 3791).

Вот.--66.

Buchnera elongata, Sw. Fl. Ind. Occ. II. p. 1061; DC. Prodr. x. p. 498; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 289.

Buchnera lithospermifolia. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 341; DC. Prodr. x. p. 497?

Buchnera elongata, β. pilosa, Schl. in Linnæa viii. p. 247. Buchnera pilosa, Benth. Bot. Vov. "Sulphur," p. 144.

N. V. Romerillo: sirve para techar.

- S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 715); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Julio de 1886 (M. Bárcena, 565); Hac. de la Guiñada (Valle de México), Septiembre de 1888 (F. Altamirano); Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 9 de 1888 (C. G. Pringle, 2250).
- Seymeria virgata, Bentil. in DC. Prodr. x. p. 511; Seem. Bot. Voy. "Herald," t. 60.

Gerardia virgaia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 344. Gerardia laciniala, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x11. 2, p. 26.

Dasystoma laciniata, WALP. Rep. vi. p. 650.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 735).

Gerardia peduncularis, Bentu. in Hook. Comp. Bot. Mag. 1. p. 209; DC. Prodr. x. p. 518, cum. β. guatematensi, loc. cit. Llano de Mexicalcingo (Est. de Jalisco), Octubre 7 de 1887 (M. Bărcena, 149, 754); Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 1.º de 1891 (C. G. Pringle, 4050).

Gerardia punctata, Rob. n. sp.

Barranca de Sta. Cruz, cerca de Ayotla (Valle de México), Noviembre 2 de 1888 (F. Altamirano); Cerros de Zacatecas, Octubre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 3939); Capas calizas cerca de las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), (C. G. Pringle, 3938).

TRIBUS XII. EUPHRASIEÆ.

Castilleja angustifolia, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p. 29; Walp. Rep. vi. p. 651.

Cerros pedregosos cubiertos de pinos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 30 de 1892 (C. G. Pringle, 4168).

Castilleja arvensis, Ch. et Schl. in Linnæa v. p. 103; DC. Prodr x. p. 529.

Belen, Guadalajara, Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 58).

Campos de maíz, cerca de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Noviembre 18 de 1890 (C. G. Pringle, 3349).

Castilleja canescens, Bentu. in DC. Prodr. x. p. 533; Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 323.

Montes cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 739).

Castilleja foliolosa, Hook, et Arn.

Sierras del Norte (Baja California), Abril 7 de 1882 (C. G. Pringle,)

Castilleja gracilis, Bent. in DC. Prodr. x. p. 528.

Bancos secos. Sierra de S. Felipe, á 7,500 ptés (Est. de Oaxaca), Octubre 9 de 1894 (C. G. Pringle, 4968).

Castilleja lanata, A. Gr. in Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 118; Synop. Fl. N. Am. п. p. 298.

Llanos cespitosos, Paso de Carneros (Est. De Coahulla), Agosto 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3192).

Castilleja lithospermoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 331, t. 164. DC. Prodr. x. p. 530.

N. V. Cola de borrego.

Volcán de Fuego (Est. de Colma), á 3,500 m. Julio de 1885 (M. Bárcena, 400); Llano del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro); Cuestas, Las Canoas (Est. de S. Luis Porosí), Julio 9 de 1890 (C. G. Pringle, 3066).

Castilleja longibracteata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux xn. 2, p. 28; Walp. Rep. vl. p. 651.

Sierra de S. Felipe, a 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4817).

Castilleja macrostigma, Rob. n. sp.

Lugares cespitosos, Flor de María (Est. DE México), Julio 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3194).

Castilleja mexicana, A. Gr.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 82); Cerros cerca de Chihuahua, Septiembre 6 de 1888 (C. G. Pringle, 3051).

Castilleja pallida, Kunth Syn. Pl. Œquin. II. p. 100, in nota; DC. Prodr. x. p. 531; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 297. var? angustata, Rob. ct Sea. n. var.

Lugares fértiles, cerea de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4117).

Castilleja schaffneri, Henst. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 4o2, t. LXIII. B. figg. 7-13.

Lugares fértiles, Flor de María (Est. de México). Julio 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3193).

Castilleja scorzoneræfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 331, t. 165; DC. Prodr. x. p. 529.

Castilleja speciosa, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p, 30?

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 741); En el límite de los pinos, á 13,500 piés, Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4225); En la cima de praderas alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Julio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3756); Sierra de S. Felipe, á 10,300 piés (Est. de Oaxaca), Junio 26 de 1894 (C. G. Pringle, 4722).

Castilleja tenuiflora, Benth. Pl. Hartw. p. 22; DC. Prodr. x. p. 533. N. V. Yerba del cancer (Dr. Luis Muñoz).

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 740); Barranca de S. Jerónimo, Tenancingo y Serranía de las Cruces (Est. de México), Marzo de 1886 (M. Villada); S. Francisco Acuaula y Cerro del Pino (Est. de México), Noviembre de 1886 (M. Urbina); Colomitos, Valle de Guadalajara, Mayo de 1887 (M. Bárcena, 90, 216); Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada); Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Mayo 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2692); Lugares frios, Sierra Madre (Est. de Chimuaniua), Septiembre 16 de 1887 (C. G. Pringle, 1350).

Castilleja tenuifolia, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p. 30; Walp. Rep. vi. p. 651.

Castilleja anthemidifolia, Benth. in DC. Prodr. x. p. 528. N. V. Calzón de indio.

Volcán del Nevado de Colima, Marzo de 1886 (M. Bárcena, 438); Cerros secos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 18 de 1890 (C. G. Pringle, 3348).

Castilleja tolucensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 329; DC. Prodr. x. p. 530; Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x11. 2. (reprint. p. 15.)

Formando manchones en las cimas áridas del Nevado de Toluca. Septiembre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4250).

Cordylanthus orcuttianus, A. Gr.

Tijuana (Baja California), Julio 30 de 1884 (C. R. Orcutt).

Cordylanthus wrightii, A. Gr. in Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 120; Synop. Fl. N. Am. n. p. 303.

Los Médanos (Est. de Chiniahua), Septiembre 20 de 1886 (C. G. Pringle, 780).

Lamourouxia exserta, Rob. et Greenm. n. sp.

Arbusto de 8-12 piés. Barrancas fértiles, Sierra de Clavellinas (Est. de Oaxaca), Octubre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4995).

Lamourouxia macrantha, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. (1845), xii. 2, p. 32; Walp. Rep. vi. p. 652.

Lamourouxia betonica folia, Benth. in DC. Prodr. x. p. 539. Sierra de S. Felipe, & 10,200 piés (Est. De Oaxaca), Agosto 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4854).

Lamourouxia microphylla, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. (1845), xii. 2, p. 31; Walp. Rep. vi. p. 652.

Lamourouxia parvifolia, BENTH. in DC. Prodr. x. p. 542.

Cerros graníticos, en la báse de la Sierra de Clavellinas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 6000).

Lamourouxia multifida, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11, p. 339; DC. Prodr. x, p. 540.

Lamourouxia laciniata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. 2, p. 32; Walp. Rep. vi. p. 652.

Volcán del Nevado de Colima, Marzo de 1886 (M. Búrcena, 440); Barranca de Sta, Cruz, al N. E. de Ayotla (Est. De México), Noviembre de 1888 (M. Urbina); Cuestas, Cañada de Río Hondo (Est. De México), Agosto 26 de 1890 (C. G. Pringle, 3149); Sitios pedregosos, Sierra de S. Felipe, á 10,400 piés (Est. De Oaxaca), Septiembre 25 de 1894 (C. G. Pringle, 4829).

Lamourouxia ovata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. XII. 2, p. 33; Walp. Rep. vi. p. 653.

Bosques de encinas, Sierra de S. Felipe, d 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4762).

Lamourouxia pringlei, Rob. et Greenm. n. sp.

De 3-5 piés. Capas frías de la Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. De OAXACA), Septiembre 25 de 1894 (C. G. Pringle, 4927).

Lamourouxia rhinanthifolia, H. B. K. Nov. Gen et Sp. II. p. 337, t. 169; DC. Prodr. x. p. 541.

Sierra de S. Felipe, a 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4661).

Lamourouxia viscosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 338; DC. Prodr. x. p. 542.

Lamourouxia cordata, CH. et SCHL. in Linnæa v. p. 103.

La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre 13 de 1887 (M. Bárcena, 134, 549); La Barranca, cerca de Guadalajara, Noviembre 5 de 1889 (C. G. Pringle, 2133); Cerros cerca de Oaxaca, de 5,500-6,000 piés, Septiembre de 1894 (C. G. Pringle, 4879).

Lamourouxia sp.

Volcán del Nevado de Colima, Marzo de 1886 (M. Bárcena, 439).

Pedicularis mexicana, Zucc. DC. Prodr. x. p. 575.

Pedicularis orizabæ, Bentu. Pl. Hartw. p. 47, non Cu. et Schl. Praderas húmedas, Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4197); Potrero de la Garcesa (Valle de Toluca), Marzo de 1886 (M. Villada).

Pedicularis orizabæ, Ch. et Schl. in Linnæa v. p. 103; DC. Prodr. x. p. 375.

Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Julio 30 de 1894 (C. G. Pringle, 4757).

Pedicularis tripinnata, Marr. et Gal. in Bull. Acad. Brux. XII. 2, p. 34; Walp. Rep. vi. p. 634.

Montañas, cerca de Pátzcuaro (Est. DE MICHOACÁN), Julio 31 de 1892 (C. G. Pringle, 4156).

ORDO CXXV. OROBANCHACEÆ.

Conopholis mexicana, GRAY in herb.

Parásita sobre las raíces de las encinas. Sierra de S. Felipe, de 8-9,000 piés (Est. DE OAXACA), Mayo de 1894 (C. G. Pringle, 4676).

Ordo CXXVI. LENTIBULARIEÆ.

Utricularia denticulata, Benjam. in Linnæa xx. p. 492; Walp. Ann. 1. p. 490.

En terrenos pantanosos, eerea de Morales, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 120).

Pinguicula caudata, Schl. in Linnæa vn. p. 793; DC. Prodr. vn. p. 28.

Pinguicula bakeriana, GARD. Chron. n. sp. xv. p. 541, fig. 102.
Pinguicula orchidioides, A. DC. Prodr. vm. p. 27; Bot. Mag. t. 4231.

Pinguicula flos mulionis, Morr. Belg. Hort. 1872, p. 371, t. 27. Pinguicula moranensis, et P. macrophylla, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. 236?

Pinguicula oblongiloba, DC. Prodr. vm. p. 27; Calq. des Dess. F1. Mex. 1071, fig. 2?

Soeonusco (Chiapas), 1883 (R. Montes de Oca); Sitios agrestes y húmedos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 19 de 1891 (C. G. Pringle, 4021).

Pinguicula heterophylla, Bentu. Pl. Hartw. p. 7; DC. Prodr. vni. p. 28.

Suelo estéril. Sierra de S. Felipe, de 8-9,000 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 21 de 1894 (C. G. Pringle, 4646).

Pinguicula parvifolia, Rob. n. sp.

Sitios cespitosos y arenosos, eerea de Guadalajara, Junio 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4397).

ORDO CXXVIII. GESNERACEÆ.

Tribus I. GESNEREÆ.

Gloxinia glabrata, Zucc. in Flora xv. Beibl. p. 99; Benth. Gen. Pl. n. p. 998 (ubi "glabra").

Plectopoma gloxiniflorum, Haxst. in Linnæa xxvn. pp. 714 ct 759.

Gloxinia fimbriata, Hook. Bot. Mag. t. 4430.

Achimenes gloxiniflora, Forkel. Fl. des Serres IV. p. 318. Diastema gloxiniflorum, Regel. Cat. Hort. Zur. 1853, p. 34. Plectopoma fimbriatum, Hanst. in Linnæa xxvi. p. 201.

Plectopoma glabratum, Hanst. in Linnæa xxxiv. p. 434.

Bancos húmedos, cerca de Guadalajara, Septiembre 14 de 1891 (C. G. Pringle, 5162).

Achimenes coccinea, Pers. Syn. in. p. 169; DC. Prodr. vn. p. 535; Hanst. in Linnæa xvn. pp. 706 et 739, excl. β. rosea. Cyrilla putchella, Lher. Stirp. Nov. t. 71; Bot. Mag. t. 374. Trevirana putchella, Mart. Nov. Gen. nr. p. 66, t. 226, fig. 4. Achimenes pyropæa, Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. n. p. 293, t. 4, fig. 1.

Bancos húmedos, cerca de Guadalajara, Julio 11 de 1893 (C. G. Pringle, 4424).

Achimenes grandiflora, DC. Prodr. VII. p. 536; Bot. Reg. xxxi. t. 11; Bot. Mag. t. 4012 (mâle); Paxt. Mag. x. p. 145 cum ic color.; Harst. in Linnæa xxvii. pp. 708, 709, et 741, excl. δ. incisa, Œrst. Vidensk. Sclskabs Skrift. v. (reprint, p. 19). Trevirana grandiflora, Schiede in Linnæa viii. p. 247. Salutiæa grandiflora, Colla in Mem. Acc. Totr. ser. 2, x.

p. 103.

Achimenes ghiesbrechtiana, et A. cordata, Hort. Bancos y terrenos húmedos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 7 de 1891 (C. G. Pringle, 3814).

Isoloma deppeanum, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 478.
Gesnera deppeana, CII. et SCHL. in Linnæa v. p. 110; DC.
Prodr. vII. p. 528.

Gesnera lasiantha, Zucc. Pl. Nov. fasc. 1. p. 100.

Gesnera elongata, var. Hook. Bot. Mag. t. 3725.

Gesnera elongata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. 1x. 2, p. 32.

Moussonia deppeana, Klotzsch. ex Hanst. in Linnæa xxxiv. p. 284.

Bancos sombríos, cerca de Orizaba (Est. DE VERACRUZ), Enero 15 de 1895 (C. G. Pringle, 6095).

Isoloma jaliscanum, WATS.

Zapópam (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 88). Sitios arenosos, húmedos y sombrios, cerca de Guadalajara, Octubre 31 de 1889 (C. G. Pringle, 2722).

Ordo CXXIX. BIGNONIACEÆ.

Tribus I. BIGNONIEÆ.

Bignonia æquinoctialis, Linn. Sp. Pl. p. 869; DC. Prodr. ix. p. 155; Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 179.

Bignonia sarmentosa, Bertol. Fl. Guat. p. 25, fide Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 448.

Cydista æquinoctiatis, Miers. in Proc. Hort. Soc. Lond. III. p. 191. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), Diciembre 8 de 1891 (C. G. Pringle, 3898).

Bignonia buccinatoria, MAIRET. ex DC. Prodr. 1x. p. 195.

Pithecoctenium buccinatorium, DC. loc. cit.

Bignonia cherere, Lindl. Bot. Reg. t. 1301, nec Aubl.

Phædruntus lindleyanus, P. buccinatorium, P. exsertus et P. cinerascens, Miers. in Proc. Hort. Soc. Lond. 111, p. 182.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 746); Mayito (Est. de Ta-BASCO), Abril de 1888 (J. N. Rovirosa).

Bignonia diversifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 133; DC. Prodr. 1x. p. 153.

Cydista diversifolia, Miers. in Proc. Hort. Soc. Lond. III. p. 192. Trepadora sobre los árboles y las piedras. Las Palmas (Est. DE S. Luis Potosí), Junio 13 de 1891 (C. G. Pringle, 3692).

Pithecoctenium hexagonum, DC. Prodr. IX. p. 195.

N. V. Palomitas.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), Julio 9 de 1890 (C. G. Pringle, 3060).

Amphilophium molle, Ch. et Schl. in Linnea v. p. 120; DC. Prodr. IX, p. 193; Bureau, Monog. Bign. t. 12.

Rastrera, sobre el talud de los peñascos. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3069).

TRIBUS II. TECOME Æ

Chilopsis saligna, D. Don. in Edinb. Philad. Journ. 1x. p. 261, et in G. Don's Gen. Syst. 1v. p. 228; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 320.

Chilopsis linearis, DC. Prodr. IX. p. 227.

Bignonia linearis, CAV. Ic. Pl. t. 269.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 745).

Tabebuia leucoxyla, DC. Prodr. IX. p. 212.

Bignonia leucoxyla, VEL. F1. F1um. vi. t. 54. (non Linn.)

N. V. Zapote.

Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro).

Tecoma mollis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 144; DC. Prodr. 1x. p. 224.

Bignonia tecomoides, DC. Prodr. IX. p. 166.

Tecoma sorbifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 144.

Tecoma stans, y. velutina, DC. Prodr. IX. p. 224.

Stenolobium molle, SEEM. Journ. Bot. 1. p. 90.

Cerros cerca de Guadalajara, Noviembre 14 de 1892 (C. G. Pringle, 5303).

Tecoma stans, Juss. Gen. Plant. p. 139; DC. Prodr. Ix. p. 224, ex y. velutina; Bot. Mag. t. 3191; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 319.

Bignonia stans, LINN. Sp. Pl. p. 871.

Stenolobium stans, Seem. Journ. Bot. 1. p. 88; Bureau, Monogr. t. 13.

N. V. Borla de S. Pedro.

Soconusco (Est. de Chiapas), 1883 (R. Montes de Oca); Mineral de Guadateázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

Tecoma sp.

Huisquilucan (Est. de México), Abril de 1887 (M. Urbina).

Tecoma sp.

La Barranca (Est. de Jalisco), Abril de 1887 (M. Bárcena, 133).

ORDO CXXX, PEDALINEÆ.

TRIBUS I. MARTYNIEÆ.

Martynia fragrans, Lindl. Bot. Reg. 1841. t. 6; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. H. p. 321; Bot. Mag. t. 4292.

Martynia violacea, Engelm. Pl. Wisliz. p. 101.

Proboscidia fragrans, et P. violacea, DCNE. in Ann. Sc. Nat. serie 5. III. pp. 325 et 326.

N. V. Toritos.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 741); S. Diego, Sur de S. Luis Potosi, Diciembre de 1881 (D. Cano).

Martynia sp.

N. V. Uña de gato.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bûrcena, 543).

ORDO CXXXI. ACANTHACEÆ.

TRIBUS I. THUNBERGIEÆ.

Thunbergia alata, Bojer; Hook. Exot. Fl. t. 177; DC. Prodr.

N. V. Ojo de Venus.

Planta naturalizada, Barranca de Metlac (Est. DE Veracruz), 1881 (J. M. Velasco).

TRIBUS II. NELSONIEÆ.

Elytraria calicosa, Bucks.

N. V. Anisillo.

Á orillas de los arroyos, Chihuahua, Mayo de 1888 (F. Soto).

Elytraria tridentata, Wahl. Enum. I. p. 106; DC. Prodr. xl. p. 64; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 451; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 324.

Elytraria frondosa, E. ramosa, et E. fasciculata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. pp. 234 et 235.

Elytraria bromoides, et E. microstachya, ŒRST. in Vidensk. Meddel. 1854, pp. 114 et 115, t. 3, figg. 1-6.

Elytraria pachystachya, Cerst. loc. cit. p. 116, t. 3, figg. 9-16? Elytraria caulescens, Ledeb. Ind. Seem. Hort. Dorp. 1820; DC. Prodr. XI. p. 63.

Verbena squamosa, Jaco. Hort. Schoenb. I. p. 3, t. 5, fide Nees. Elvtraria apargiæfolia, Nees in DC. Prodr. xi. p. 65.

N. V. Yerba del Sagrado Corazón de Jesús. Chihuahua, Septiembre de 1888 (F. Soto).

TRIBUS III. RUELLIEÆ.

- Calophanes bilabiatus, SEEM. in Bot. Voy. "Herald," p. 324, t. 65.
 - De 2-3 piés, Monte Albán, á 5,800 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 23 de 1894 (C. G. Pringle, 6053).
- Calophanes capitatus, Œrsr. in Vidensk. Meddel. 1854, p. 131; WALP. Ann. v. p. 647.
 - Cañadas profundas, cerca de Guadalajara, Julio 1.º de 1889 (C. G. Pringle, 2907); Campos arenosos bajo los pinos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 31 de 1892 (C. G. Pringle, 4134).
- Calophanes decumbens, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 325.

 Calophanes oblongifolia, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound.

 Surv. p. 122, non Don.
 - S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 647).
- Calophanes linearis, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 324.
 - Dipteracanthus (Calophanes) linearis, Torr. et Gray. Pl. Lindl. 1. p. 50.
 - Ruellia (Calophanes) ovata, BENTH. Pl. Hartw. p. 89, quo ad plantam Texanam, non Ruellia ovata, CAV.
 - Calophanes oblongifolia, var. texensis, Torr. Bot. U. E. et Mex. Bound. Surv. p. 122.
 - Cerros del Rio Blanco (Est. de Jalisco), Junio 27 de 1893 (C. G. Pringle, 5481).
- Calophanes sp.
 - Sta. Cruz, Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Barcena, 633).

- Ruellia (Ophthalmacanthus) bourgei, Hemst. Diag. Pl. Nov. pars altera, p. 35, t. Lxvi; Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 504.
 - Lugares fértiles y boscosos de la Barranea, cerca de Guadalajara, Agosto 15 de 1893 (C. G. Pringle, 4500).
- Ruellia geminiflora, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 240; GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 451.
 - Dipteracanthus geminiflorus, Nees in Mart. Fl. Bras. fasc. vii. p. 40; et DC. Prodr. xi. p. 136.
 - Gymnacanthus geminiflorus, ŒRST. in Vidensk. Meddel. 1854, p. 127.
 - Bancos sombríos, Tequila (Est. de Jalisco), Julio 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 4438).
- Ruellia paniculata, Linn. Sp. Pl. p. 885.
 - Dipteracanthus paniculatus, NEES in DC. Prodr. xi. p. 142; Griseb, in Fl. Brit. W. Ind. p. 451.
 - S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 73).
- Ruellia pulcherrima, T. Anderson, MSS, in hb. Kew.
 - Ophthalmacanthus speciosus, NEES in DC. Prodr. xi. p. 220.
 - Grietas pedregosas, Monte Albán, á 5,500 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 14 de 1894 (C. G. Pringle, 4788).
- Ruellia tuberosa, Linn. Sp. Pl. II. p. 635; Descourt. Fl. Antill.
 II. t. 113; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 452; A. Gray, Synop.
 Fl. N. Am. II. p. 325.
 - Cryphiacanthus barbadensis, NEES in DC. Prodr. xi. p. 197.
 - Cryphiacanthus viscosus, Œrst. in Vidensk. Meddel. 1854, p. 128?
 - Ruellia clandestina, Linn. Dill. Hort. Elth. p. 328, t. 248.
 - Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 3 de 1889 (C. G. Pringle, 2638).
- Ruellia tweediana, GRISEB. Symb. ad Fl. Arg. p. 259?
 - Cryphiacanthus angustifolius, Nees in DC. Prodr. xt. p. 199, saltem pro parte.
 - Micos (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 31 de 1891 (C. G. Pringle, 5043).

Tribus V. JUSTICIEÆ.

Barleria discolor, Nees in Benth. Bot. Voy: "Sulphur," p. 146, et DC. Prodr. xi. p. 224.

Barleriopsis discolor, ŒRST. in Vidensk. Meddel. 1854, p. 134. De 3 á 5 piés de altura, flores amarillas, en el talud de los peñascos. Barranca de Tequila (EST. DE JALISCO), Octubre 8 de 1893 (C. G. Pringle, 4587).

Stenandrium dulce, Nees in DC. Prodr. xi. p. 282; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. ii. p. 327.

Ruellia dulcis, CAv. Ic. Pl. vi. p. 62, t. 585, fig. 2.

Crossandra? fascicularis, Benth. Pl. Hartw. p. 22.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosi), Junio de 1892 (M. Villada).

Justicia pringlei, Rob.

Praderas humedas, Guadalajara, Agosto 22 de 1893 (C. G. Pringle,)

Justicia reflexiflora, Rich.

Bajo Ios peñascos de la Barranca, Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 2 de 1893 (C. G. Pringle, 4567).

Beloperone fragilis, Rob. n. sp.

Capas calizas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Diciembre 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3933).

Beloperone pringlei, WATSON, n. sp.

Cerros cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 1.º de 1889 (C. G. Pringle, 2548); Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada); Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3074).

Carlowrightia hapalocarpa, Rob. et Greenm. n. sp.

Villar (Est. DE S. Luis Potosf), Septiembre 14 de 1892 (C. G. Pringle, 5471).

Carlowrightia pubens, A. Gr.

Llanos arenosos, Laredo (Texas), Agosto 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2639).

Jacobinia aurea, Hemsl. Diag. Pl. Nov. pars altera, p. 35; Biol. Cent. Am. Bot. n. p. 520, t. LXVIII.

Barrancas obscuras y profundas, Monte Albán, á 5,800 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4865). Jacobinia incana, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 521.

Sericographis incana NEES in DC. Prodr. xi. p. 361.

Capas calizas, Sierra de la Silla (Est. de Nuevo León). Mayo 28 de 1889 (C. G. Pringle, 2543).

Jacobinia mohintli, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 521.

N. V. Muicle, Yerba azul; Mex. Mohintli.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 112); Barranca de Metlac (Est. de Veracruz), Abril de 1881 (J. M. Velasco).

Jacobinia stellata, Rob. n. sp.

Bajo los peñascos secos, Barrança de Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4573).

Anisacanthus insignis, A. Gr.

Cañón de Bachimba (Est. de Chumanna), Abril 2 de 1886 (C. G. Pringle, 862).

Anisacanthus virgularis, NEES in DC. Prodr. XI. p. 445.

Justicia virgularis, SALISB. Parad. Lond. t. 50.

Justicia coccinea, CAV. Ic. Pl. II. t. 199.

Justicia quadrifida, VAHL. Enum. 1. p. 124; H. B. K. Nov. Gen. ct Sp. 11. 231.

Drejera puberula, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 123?

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 744); Lugares incultos y arenosos. Bocas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3820).

Anisacanthus wrightii, A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 328.

*Drejera wrightii, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Sourv.
p. 123?

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio de 1889 (C. G. Pringle, 2710).

Dicliptera brachyata, Spreng.

Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Octubre 31 de 1891 (C. G. Pringle, 5104).

Dicliptera peduncularis, NEES in DC. Prodr. NI. p. 488, a. et β. Escuela de Agricultura (VALLE DE MÉXICO), Abril de 1882 (M. Urbina); Atemajac (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 34, 183, 228); Barranca cerca de Guadalajara, Octubre 3 de 1891 (C. G. Pringle, 5311); Cerros. Cárdenas (Est. DE S. Luis Potosi), Octubre 16 de 1891 (C. G. Pringle).

gle,....); Sierras del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Noviembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 5344).

Tetramerium aureum, Rose.

Cañón de Tomellín, á 3,000 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 17 de 1894 (C. G. Pringle, 5852).

Tetramerium costatum, Durand,

Henrya costata, GRAY.

Cañón de Tomellin, á 2,500 piés (Est. DE OAXACA), Mayo 17 de 1894 (C. G. Pringle, 4634).

ORDO CXXXIV. VERBENACEÆ

TRIBUS VI. VERBENEÆ.

Lantana camara, Linn. Sp. Pl. p. 874; DC. Prodr. xi. p. 598; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 340.

Lantana aculeata, Linn. Bot. Mag. t. 96.

Lantana scabrida, Air. Hort. Kew. ed. 1, II. p. 352; Lodd. Bot. Cab. t. 1171.

Lantana polyacantha, Schauer in DC. Prodr. xi. p. 597?

N. V. Siete colores, Sonova, Matizadilla.

Rancho del Gachupín; Hac. de la Concepción; Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Abril de 1887 (M. Bárcena, 393, 396, 499).

Lantana hirsuta, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. p. 326; DC. Prodr. xi. p. 607.

N. V. Cinco negritos, Flor de S. Cayetano.

Barranca de Metlac (Est. de Veracruz), Abril de 1881 (J. M. Velasco).

Lantana horrida, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 261; DC. Prodr. xi. p. 597, a. et β .

Bancos cerca de Guadalajara, Agosto 25 de 1893 (C. G. Pringle, 4481); var. de 5 á 10 piés, cerros cerca de Tequila (Est. DE JALISCO), Julio 2 de 1893 (C. G. Pringle, 4431).

Lantana macropoda, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 127; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 339. Cerros y mesas, Monterrey (Est. De Nuevo León), Junio 24 de 1888 (C. G. Pringle, 1933).

Lippia appendiculata, Rob. et Greenm. n. sp.

Suelo húmedo y alcalino, Desicrto de Mapiní (Est. de Du-RANGO), Noviembre 20 de 1893 (C. G. Pringle, 4625).

Lippia callicarpæfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. 268; DC. Prodr. xi. p. 591.

Lippia calocephala, Zucc. Ind. Sem. Hort. Monac. 1846.

Lippia bicolor, Krn. Ind. Sem. Hort. Berol. 1845.

Lantana bracteosa, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xt.

p. 326. Barranca cerca de Guadalajara, Noviembre 15 de 1889 (C. G.

Barranca cerca de Guadalajara, Noviembre 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2743).

Lippia geminata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 266; DC. Prodr. xi. p. 582; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 338.

Lippia panamensis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1863, 11. p. 201.

Lantana lippioides, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 305. N. V. Yerbabuena cimarrona.

Suburbios de la ciudad de Guadalajara, Marzo de 1887 (M. Bârcena, 225); Matamoros (Est. de Tamaulipas), Agosto 8 de 1888 (C. G. Pringle,); Guadalajara, Julio 26 de 1893 (C. G. Pringle,)

Lippia graveolens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 266; DC. Prodr. xi. p. 575.

Lantana origanoides, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. x1. p. 327.

N. V. Yerba dulce.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Lippia lanceolata, Michx. Fl. Bor. Am. n. p. 15; DC. Prodr. xi. p. 584; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 339.

Lippia queretanensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 264.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 644); Valle de Ahualulco (Est. De Jalisco), Abril de 1886 (M. Bârcena, 563).

Lippia lycioides, Steud. Nomencl. Bot. ed. 2; Fl. Bras. ix. t. 30; DC. Prodr. xi. p. 574; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. ii. p. 338. Aloysia lycioides, Cham. in Linnæa vii. p. 237.

Aloysia floribunda, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. p. 320.

Verbena ligustrina, Lag. Nov. Gen. et Sp. p. 18.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 646); Cañón de Bachimba (Est. De Chimanua), Marzo 23 de 1885 (C. G. Pringle, 100).

Lippia macrostachya, WATSON.

Cerros cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Mayo 31 de 1889 (C. G. Pringle, 2094).

Lippia myriocephala, Ch. et Schl. in Linnæa v. p. 98; DC. Prodr. xi. p. 580.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Septiembre 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3277).

Lippia nutans, Rob. et Greens, n. sp.

Cañón de La Hoya (Est. DE OAXACA), Noviembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 5650).

Lippia oaxacana, Rob. et Greenm. n. sp.

De 3-5 piés. Cerros secos y calizos. Cañón de la Hoya, á 5,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 6021).

Lippia purpurea, Jacq. f. Eclog. i. p. 126, t. 85; DC. Prodr. xi. p. 581.

En los montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosi), 1877 (G. Schaffner, 643); Cerro del Borrego, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro).

Lippia umbellata, Cav. Ic. Pl. n. p. 75; t. 194; DC. Prodr. xi. p. 591.

N. V. Rosa de Castilla cimarrona.

Cacahuamilpa (Est. de Guerrero), Enero de 1886 (M. Villada); Entre Venta del aire y Tepetongo (Est. de México), Diciembre de 1887 (M. Villada); De 8 á 12 piés. Montañas cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 23 de 1891 (C. G. Pringle, 3948).

Lippia sp.

N. V. Yerbabuena aromática.

Valle de Ahualulco (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 544).

Lippia sp.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 645).

Stachytarpheta acuminata, DC. Prodr. xi. p. 570.

Cerros cerea de Oaxaca, á 5,500 piés. Mayo 27 de 1894 (C. G. Pringle, 4648).

Priva armata, Watson,

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2674).

Priva hispida, Juss. in Ann. Mus. vn. p. 69; DC. Prodr. xt. p. 534. Verbena mexicana, Lixx, Syst. p. 66.

Zapania mexicana, Lam. III. t. 6, fig. 1.

Blairia mexicana, Gærtn. Fruct. 1. p. 265, t. 56, fig. 1.

Priva mexicana, Pers. Syn. II. p. 139.

Montañas de Sta. Eulalia (Est. de Chihuanua), Septiembre 8 de 1885 (C. G. Pringle, 287).

Priva tuberosa, WATSON.

Cerros, cerca de Cusihuiriachic (Est. DE CHIMUAHUA), Agosto 27 de 1887 (C. G. Pringle, 1549); Cerros cespitosos cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 19 de 1892 (C. G. Pringle, 4147).

Verbena bipinnatifida, Nutt.

Soconusco (Est. de Chiapas), Abril de 1884 (R. Montes de Oca); Llano de la Concepción, Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 180); Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Mayo 31 de 1890 (C. G. Pringle. 3467).

Verbena canescens. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 274, t. 136: DC. Prodr. xi. p. 548; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 336. Verbena remota, Benth. Pl. Hartw. p. 21.

Verbena gracilis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. 3, p. 393.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 719, 720); Cerros calizos y secos. Las Sedas, á 6,000 piés (Est. DE Oaxaca), Agosto 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4784).

Verbena caroliniana, Linn. Sp. Pl. p. 29; Schauer in DC. Prodr. xi. p. 546.

Verbena recta, V. polystachya, V. biserrata, et V. veronicæfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. pp. 274, 275, et 277.

Verbena paucifolia, Mart, et Gal, in Bull, Acad, Brux, XI. p. 324.

Verbena hirsuta, MART. et GAL. loc. cit. p. 321, et V. mollis. p. 323.

Querétaro, Abril 25 de 1886 (M. Urbina); Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 12 de 1894 (C. G. Pringle, 4892).

Verbena ciliata, Bextii. Pl. Hartw. p. 21; DC. Prodr. xi. p. 553; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 337.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 717).

Valle de Toluca (Est. de México), Agosto 15 de 1892 (C. G. Pringle, 4180).

Verbena littoralis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. 276, t. 137; DC. Prodr. xi. p. 542.

Verbena affiinis, Mart. et Gal. in Buil. Acad. Brux. xi. (reprint, p. 6).

Praderas húmedas. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés. Septiembre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4877).

Verbena officinalis, Linn. Sp. Pl. p. 29; DC. Prodr. M. p. 547; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 535; Fl. Dan. t. 628; Lam. Ill. t. 17.

Verbena setosa, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. p. 321. Verbena menthæfolia, Bentii. Pl. Hartw. p. 21.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 718); La Presa, Valle de Guadalajara, Marzo de 1887 (M. Bárcena, 224).

Verbena remota, BENTH.

Mesas (Est. de Chihuahua), Mayo 22 de 1887 (C. G. Pringle,....)

Verbena sp.

Escuela de Agricultura (Valle de México), Junio de 1882 (M. Urbina).

Verbena sp.

N. V. Verbena.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bárcena, 564).

Verbena sp.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de 1892 (M. Villada).

Verbena sp.

Soconusco (Est. de Chiapas), Marzo de 1884 (R. Montes de Oca).

Petræa arborea, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 282; GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 498.

Petræa mexicana, Will. ex Schauer in DC. Prodr. xi. p. 619. Petræa erecta, Lodd. Bot. Cab. t. 1606.

Petræa ovata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. p. 329.

Cerros, Las Canoas (Est. de S. Lus Potosi), Junio 19 de 1891 (C. G. Pringle, 5003).

Petræa volubilis, Jacq. Amer. p. 180, t. 114; DC. Prodr. M. p. 618; Griseb, Fl. Brit, W. Ind. p. 498; Bot. Mag. t. 628.

β. mexicana, Schiede in Linnæn vi. p. 373, Walp. Rep. iv. p. 70.

N. V. Jazmin & Coamecate azul.

Cultivado en Guadalajara, florece en Abril; se encuentra también en Cañada seca (Est. de Hidalgo), En Jalapa, &c.

Citharexylum berlandieri, Rob. n. sp.

De 10 á 15 piés. Cerros pedregosos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3222, y 3734).

TRIBUS V. VITICIEÆ.

Callicarpa ferruginea, SWARTZ?

Arbusto de 15 piés de altura. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), 1890 (C. G. Pringle, 3094).

Callicarpa sp.

N. V. Tepozán.

Tlapacoyan (Est. DE México), Junio de 1891 (M. Villada).

Vitex mollis, H. B. K. Nov. Gen. ct Sp. 11. p. 245; SEEM. Bot. Voy. "Herald," p. 329, t. 71.

Vitex lasiophylla, Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 155.

N. V. Ahuilote.

Valle de Ahualulco (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 511).

Vitex piramidata, Rob. n. sp.

Un gran arbusto, Cuestas rocallosas cerca de Tequila (Esr. DE Jalisco), Junio 29 de 1893 (C. G. Pringle, 1429).

ORDO CXXXV. LABIATÆ.

TRIBUS I. OCIMOIDEÆ.

- Ocimum carnosum, Link et Otto; Benth. Lab. p. 11; DC. Prodr. xii. p. 38.
 - Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potost), Julio 2 de 1890 (C. G. Pringle, 3092).
- Hyptis albida, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 319; DC. Prodr. xII. p. 127.
 - Cerros cerca de Guadalajara, Noviembre 5 de 1889 (C. G. Pringle, 2717).
- Hyptis emoryi, Torr. Bot. Ives's Colorad. Exped. p. 20; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. Bot. n. p. 350.
 - En las corrientes de agua. Cerros del Noroeste (Est. de Sonora), Marzo 25 de 1884 (C. G. Pringle,)
- Hyptis macrocephala, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xt. (reprint. p. 2); DC. Prodr. xtl. p. 109. var. villosa. A. Gr.
 - Terrenos húmedos, cerca de Magdalena (Est. de Jalisco), Octubre 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4589).
- Hyptis polystachya, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 321; DC. Prodr. xii. p. 121. var.
 - Por las corrientes. Tequila (Est. DE JALISCO), Octubre 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4532).
- Hyptis spicata, Poit. Ann. Mus. Par. vii. p. 474, t. 28, fig. 2; DC. Prodr. xii. p. 121; A. Gr. Synop. Fl. N. Ain. ii. p. 350. Hyptis aspera, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi (reprint.
 - p. 5. N. V. *Chia*.
 - Sta. Cruz, Valle de Túxpam (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 352).
- Hyptis stellulata, Benth. Lab. p. 129; DC. Prodr. XII. p. 128. Rancho del Gachupín y Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Noviembre de 1886 (M. Bárcena, 416, 720); Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 22 de 1889 (C. G. Pringle, 2727).

Hyptis suaveolens, Poir. in Ann. Mus. Par. vii. p. 472, t. 29, fig. 2; DC. Prodr. xii. p. 126.

Cuestus cerca de Micos (Est. de S. Luis Potosí), Noviembre 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3925).

Hyptis tomentosa, Porr. in Ann. Mus. Par. vu. p. 469; DC. Prodr. xu. p. 131.

Cerros (Est. de Oaxaca), Mayo 19 de 1894 (C. G. Pringle, 5860).

Hyptis urticoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. 320; DC. Prodr. xu. p. 123.

De 3 á 6 piés de altura. Valle de Guadalajara, Octubre 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3874).

Hyptis verticillata, Jace. Ic. Rar. I. t. 113; DC. Prodr. XII. p. 129; Hook. Ic. Pl. t. 458.

Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosf), Agosto 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3223).

Hyptis sp.

Cañadas fértiles, eerca del Lago de Chapala (Est. De Jalisco), Diciembre 9 de 1889 (C. G. Pringle, 2440).

Hyptis sp.

Cerro de Sta. Cruz, Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 487, 488).

TRIBUS II. SATUREINEÆ.

Mentha canadensis, Linn. Sp. Pl. p. 577; DC. Prodr. xii. p. 173; A. Gr. Synop, Fl. N. Am. II. p. 352.

Cerca del agua. Sierra de S. Felipe, a 7,500 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 10 de 1894 (C. G. Pringle, 5689).

Mentha rotundifolia, L.

Cerca de Morales, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 683); Cerca del Agua, Ciudad Juárez (Евт. DE СНІНИАНИА), Agosto 6 de 1893 (С. G. Pringle,.....)

Cunila polyantha, Benth. Lab. p. 362; DC. Prodr. XII. p. 181.
Bancos sombríos de las barrancas. Orizaba (Est. de Veracruz), Enero 19 de 1895 (C. G. Pringle, 6089).

Cunila pycnantha, Rob. et Greenm. n. sp.

Nevado de Colima, á 7,000 piés. Mayo 22 de 1893 (C. G. Pringle, 5511).

Cunila longiflora, A. GR.

Lugares fríos y fértiles, cerca de Guadalajara, Noviembre 16 de 1889 (C. G. Pringle, 2754).

Micromeria brownei, Bentil. Lab. p. 372; DC. Prodr. XII. p. 223; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 359; Fl. Bras. VIII. t. 32. N. V. Yerba del espanto.

Llano del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro).

Hedeoma drummondii, BENTII. Lab. p. 308; DC. Prodr. XII. p. 245; A. GR. Synop. Fl. N. Am. II. p. 362. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 679).

Hedeoma palmeri, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 11. p. 548, t. LXIX. B. figg. 6-9.

Montañas de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 637).

Hedeoma piperita, Benth. Lab. p. 730; DC. Prodr. XII. p. 245. Tlalpam (Valle de México), Agosto de 1889 (A. Herrera); Bancos fríos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4201).

Hedeoma tenella, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. II. p. 549. Sitios boscosos de la Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. DE Νυένο León), Julio 13 de 1888 (C. G. Pringle, 1911).

Hedeoma thymoides, L.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 72).

Poliomintha marifolia, A. Gr. in Proc. Am. Acad. viii. p. 365. Keithia marifolia, Schauer in Linnæa xx. p. 705.

Cerros calizos, Cárdenas (Est. DE S. Luís Potosí), Octubre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3915).

Calamintha macrostema, Benth. in DC, Prodr. xii. p. 229. N. V. Nurile, Tê de Michoacán en Nurio,

Montes de Zavaleta (Est. de México), Febrero de 1890 (M. Villada); De 2 á 5 piés. Cerros boscosos y secos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3952).

Calamintha potosina, Schaffner in hb.

N. V. Oregano de la sierra.

Planta muy aromática, S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 74).

Lepechinia procumbens, Benth. Lab. p. 415; DC. Prodr. xii. p. 259.

Amecameca (Est. de México), Julio de 188! (M. Urbina).

Lepechinia spicata, Willd. Hort. Berol. i. p. 21, t. 21; DC. Prodr. xii. p. 259; Bot. Reg. t. 1292.

Laderas, Flor de María (Est. de México), Septiembre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3264).

Sphacele mexicana, Schauer in Linnæa xx. p. 707; DC. Prodr. xh., p. 257.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 84).

TRIBUS III. MONARDEÆ.

Salvia alamosana, Rose.

De 2-4 piés. Cerros cerca de Oaxaca, á 6,000 piés. Octubre 25 de 1894 (C. G. Pringle, 6013).

Salvia amarissima, Ort. Dec. p. 4; DC. Prodr. xii. p. 317; Bot. Reg. t. 347.

Salvia amara, JACQ. Hort. Scheenb. t. 225.

Salvia circinata, CAV. Ic. Pl. IV. p. 9, t. 318.

Salvia nepetoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 299, t. 150. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 677); Cañada de Río Hondo (Est. DE México), Agosto 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3153).

Salvia angustifolia, Cav. Ic. Pl. Iv. p. 9, t. 317; DC. Prodr. XII. p. 301; A. GR. Synop. Fl. N. Am. II. p. 369; Bot. Reg. t. 1544; Sweet's Brit. Fl. Gard. ser. 2, t. 219.

Salvia reptans, JACQ. Hort. Schoenb. t. 319.

Salvia virgata, ORT. Dec. 1. p. 3.

Valle de Toluca (Est. de México), Marzo de 1886 (M. Villada); Potrero de la Presa. Valle de Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 167); Llanuras cerca de Pátzcuaro (Est. DE MICHOACÁN), Agosto 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4163).

var. glabra, A. Gr. ex Watson in Proc. Am. Acad. xviii. p. 138. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 648).

Salvia assurgens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 273; DC. Prodr. x11. p. 304.

Cerros cespitosos cerca de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Julio 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4150).

Вот.--72.

Salvia ballotæflora, Benth. Lab. p. 270; DC. Prodr. XII. p. 313; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 371.

Salvia laxa, Benth. loc. cit.

Montañas de S. Rafael, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 670).

Salvia brevicalyx, Benth. in DC. Prodr. xII. p. 309, var.

Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3224).

Salvia chamædryoides, Cav. Ic. Pl. 11. p. 77, t. 197; DC. Prodr. xII. p. 314; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 371; Bot. Mag. t. 808.

Salvia chamædrifolia, Andr. Bot. Rep. t. 416.

Salvia chamædrys, Willd. Hort. Berol. t. 29.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 664).

. Llanuras. Estación de la Honda (Est. de Zacatecas), Agosto 18 de 1890 (C. G. Pringle, 3170).

Salvia cinnabarina, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (reprint, p. 3); DC. Prodr. xii. p. 342.

Herbacea de 3-5 piés. Sierra de S. Felipe, á 1,500 piés (Est. DE OAXACA). Octubre 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4947).

Salvia clinopodioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 294, t. 145; DC. Prodr. xII. p. 322.

Campos arenosos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 4258).

Salvia coccinea, Linn. Mant. p. 88; DC. Prodr. xii. p. 343; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 368; GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 490.

Salvia glaucescens, Pohl. Pl. Bras. Ic. II. t. 192.

Salvia rosea, VAIIL. Enum. 1. p. 244.

Salvia pseudococcinea, Jaco. Coll. 11. p. 302, et Ic. Pl. Rar. t. 209; Bot. Mag. t. 2864.

Salvia galeottii, MART. in Bull. Acad. Brux. x1. (reprint. p. 15).

Salvia ciliata, BENTH. Pl. Lab. p. 286.

En el camino de Tierra Colorada, cerca de S. Juan Bautista (Est. De Tabasco), Abril 6 de 1888 (J. N. Rovirosa).

Salvia cyanea, Benth. Lab. p. 296; DC. Prodr. xII. p. 336. Salvia cyanifera, Otto in Otto et Dietr. Allg. Gartenz, 1834.

Entre Jaripeo y Agua fría (Est. de Michoacán), Noviembre de 1887 (M. Villada).

Salvia elegans, Vaill. Enum. 1. p. 238 (errore S. incarnata) et p. 362; DC. Prodr. XII. p. 342.

Salvia incarnata, CAV. Ann. Cienc. Nat. II. p. 112; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. t. 144, non Ettl.

Salvia punicea, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. xi. (reprint. p. 5).

Cañadas fértiles. Cerros cerea de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Diciembre 22 de 1891 (C. G. Pringle, 3981).

Salvia elongata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 287, t. 139; DC. Prodr. xii. p. 303.

Salvia simplex, Spreng. Syst. 1. p. 58.

Salvia belonica, REM. et SCHULT. Syst. Mant. 1. p. 188.

Cañadas boscosas, Sierra de las Cruces (Est. DE México), Octubre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4278).

Salvia fulgens, Cav. Ic. Pl. 1. p. 15, t. 23; DC. Prodr. xii. p. 333; Sweet. Brit. Fl. Gard. ser. 2, t. 59; Bot. Reg. t. 1356.

Salvia cardinalis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 301, t. 152.

Montes de Zavaleta (Est. de México), Febrero de 1890 (M. Villada); Selvas frías, Sierra de las Cruces, á 10,500 piés (Est. de México), Agosto de 1892 (C. G. Pringle, 4227).

Salvia glechomæfolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 290, t. 141; DC. Prodr. x11. p. 306.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Agosto de 1886 (M. Bárcena, 547); Cuestas, cerca de Guadalajara, Julio 2 de 1889 (C. G. Pringle, 2555); Cerros, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Septiembre 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3681); Lugares íríos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4200).

Forma S. prunelloides, H. B. K.

Montañas arriba de Pátzcuaro (Est. DE Місноаса́х), Julio 30 de 1892 (С. G. Pringle, 4155).

Salvia grahami, Benth. in Bot. Reg. t. 1370, et in DC. Prodr. xII. p. 335.

N. V. Mirto.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 661); Capas y bancos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 23 de 1892 (C. G. Pringle, 4298); Cerros cerca de Cusihuiriachic (Est. de Chimuanua), Septiembre de 1888 (C. G. Pringle, 3037).

Salvia helianthemifolia, Benth, Lab. p. 254; et in DC. Prodr. Nn. p. 304. De 2 á 4 piés. Cañadas fértiles y boscosas, montañas cerca del Lago de Chapala (Est. de Jalisco), Noviembre 22 de 1892 (C. G. Pringle, 4351); var. Cerros secos y pedregosos, cerca de Guadalajara, Noviembre 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 4624).

Salvia hispanica, Linn. Sp. Pl. p. 37; DC. Prodr. xii. p. 308; Bot. Reg. t. 359.

Salvia tetragona, MŒNCII. Meth. p. 373.

Salvia prismatica, CAV. Descr. p. 14.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 675).

Salvia hyptoides, Marr. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (reprint. p. 14); DC. Prodr. xii. p. 300.

Salvia elscholtzioides, Bentu. Bot. Voy. "Sulphur," p. 152, t. 50.

Atemajac, Valle de Guadalajara, Mayo de 1887 (M. Bárcena, 217).

Salvia Ianceolata, Broussonet in App. Elench. Pl. Hort. Monsp.
 1805, p. 15; Jacq. fil. Eclog. 1. p. 22, t. 13; DC. Prodr. XII. p.
 299; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 369.

Salvia reflexa, Hornem. Hort. Hafn. I. p. 34.

Salvia lancæfolia, Poir. Dict. Suppl. v. p. 49.

Salvia aspidophylla, REM. et Schult. Syst. Mant. 1. p. 206.

Salvia trichostemoides, Pursh. F1. Am. Sept. 1. p. 19.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 673).

Salvia lasiantha, Benth. Lab. p. 276; DC. Prodr. xn. p. 321.

Montañas de S. Rafael, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 671); Cerros calizos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3273).

Salvia lavanduloides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 287; DC. Prodr. x11. p. 300.

Salvia humboldtiana, REM. et Schult. Syst. Mant. 1. p. 183. Salvia lavandulæfolia, SRENG. Syst. 1. p. 58, non Vahl.

Rancho del Gachupín (Est. De Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 392); Cerros de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Noviembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3954).

Salvia leucantha, Cav. Ic. Pl. 1. p. 16, t. 24; DC. Prodr. xn. p. 321; Bot. Mag. t. 4318).

Arroyo de Enmedio (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bărcena, 719).

Salvia littæ, Vis. III. Piant. Nuw. Ort. Pad. p. 15; DC. Prodr. xii. p. 341.

- Herbacea de 3-5 piés. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4991).
- Salvia longispicata, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. XI. (reprint. p. 13); DC. Prodr. XII. p. 307.

N. V. Cantueso.

Valle de México, Septiembre de 1884 (M. Urbina); Cerro del Pino, al Noreste de Ayotla (Est. de México), Noviembre de 1888 (M. Urbina); Tlalpam (Valle de México), Septiembre de 1889 (A. Herrera).

Salvia mexicana, Linn. Sp. Pl. p. 37; DC. Prodr. xu. p. 337; CAV. Ic. 1. p. 16, t. 26.

Sclarea mexicana, Dill. Hort. Elth. p. 339, t. 254, fig. 330.

Jungia altissima, MENCH. Meth.

Salvia melissæfolia, Desf. Cat. Hort. Par.

Rancho del Gachupín (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 417); Cañada de Río Hondo (Est. DE México), 1890 (C. G. Pringle, 3157).

Salvia microphylla, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 295; DC. Prodr. x11. p. 335.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 662).

Salvia mocinoi, Benth. Lab. p. 271; DC. Prodr. xii. p. 300. N. V. Chia.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 485, 545).

Salvia polystachya, Orr. Dec. p. 55; Cav. Ic. Pl. t. 27; DC. Prodr. xn. p. 308.

Salvia cæsia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 295.

Salvia linearifolia, LAG. Gen. et Sp. Nov. p. 2.

N. V. Chia.

Cerro del Tepeyac (Valle de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina).

Salvia pubescens, Benth. Lab. p. 723; DC. Prodr. xII. p. 332. De 3-5 piés. Monte Albán, á 5,800 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4960).

Salvia purpurea, Cav. Ic. Pl. II. p. 52, t. 166; DC. Prodr. XII. p. 341; Jacq. Hort. Schænb. III. p. 2, t. 253.

Salvia pruinosa, Mart. ct Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (reprint. p. 18).

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1887 (M.

Bárcena, 548); Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. de Veraeruz), Marzo de 1891 (P. Toro).

var. pubens, Gray.

Barranca eerca de Guadalajara, Noviembre 1.º de 1888 (C. G. Pringle, 2458). De 5 á 10 piés. Cerros boscosos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacáx), Noviembre 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3946).

Salvia pringlei, Rob. et Greenm. n. sp.

De 3 á 6 piés. Bajo los peñascos, Barranca de Tequila (Esr. DE JALISCO), Octubre 2 de 1893 (C. G. Pringle, 4564).

Salvia regla, Cav. Ic. Pl. v. p. 33, t. 455; DC. Prodr. xii. p. 333; Bot. Reg. 1841, t. 14.

Salvia deltoidea, Pers. Syn. 1. p. 28.

Montañas de S. Rafael, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 665).

Salvia semiatrata, Zucc. in Abhandl. Baier. Akad. Wiss. I. p. 298; DC. Prodr. xn. p. 316.

De 5-6 piés. Cerros ealizos, Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 2 de 1894 (C. G. Pringle, 4763).

Salvia sessei, Benth. Lab. p. 288; DC. Prodr. xii. p. 332. Rhodochlamys speciosa, Schauer in Linnea xx. p. 707?

Estado de Jalisco, Septiembre de 1884 (M. Barcena); Entre Temaxcaltepec y Hac. de Luvianos (Est. de México), Febrero de 1886 (M. Villada).

Salvia sessilifolia, A. Gr.

Cerca de Guadalajara, Junio 23 de 1893 (C. G. Pringle, 5374). Salvia stolonifera, Benth. Pl. Hartw. p. 70; DC. Prodr. XII.

Salvia stolonifera, Benth. Pl. Hartw. p. 70; DC. Prodr. xu p. 333.

Sierra de S. Felipe, de 7,500-10,000 piés (Est. DE OANACA), Junio 23 de 1894 (C. G. Pringle, 4705).

Salvia subincisa, Benth. Pl. Hartw. p. 20; DC. Prodr. xu. p. 303; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 369.

La Barranca (Est. DE Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 129).

Salvia tiliæfolia, Vahl. Symb. III. p. 7; Jaco. Hort. Schænb. III. t. 254.

Salvia fimbriata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. t. 149? S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 674).

Salvia thymoides, Bentu. Lab. p. 255; DC. Prodr. xu. p. 314. Soconusco (Est. de Chiapas), Marzo de 1884 (R. Montes de Oca). Salvia tricuspidata, Marr. et Gal. in Bull Acad. Brux. XI. (reprint, p. 18); DC. Prodr. XII. p. 311.

De 1-2 piés. Sierra de S. Felipe, à 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 28 de 1894 (C. G. Pringle, 4845).

Salvia vitifolia, Benth. Lab. p. 724; DC. Prodr. xii. p. 348.
Salvia proxima, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (reprint, p. 2).

Sierra de S. Felipe, a 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 26 de 1894 (C. G. Pringle, 4659).

Salvia sp.

Montañas de S. Rafael, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 666).

Salvia sp.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 678).

Salvia sp.

Cerro del Pino, al NE. de Ayotla (Est. DE México), Noviembre de 1888 (M. Urbina).

Salvia sp.

N. V. Ceniza.

Huehuetoca (Est. de México), Noviembre de 1888 (F. Altamírano).

Salvia sp.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Marzo de 1886 (M. Bárcena, 717, 718).

Salvia sp.

La Barranca (Est. DE Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bárcena, 130).

TRIBUS IV. NEPETEÆ.

Dracocephalum moldavicum, Linn.

N. V. Torongil.

Planta naturalizada é introducida por los Jesuitas. S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 85).

Cedronella mexicana, Benth. Lab. p. 502; DC. Prodr. xn. p. 405; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. n. p. 377.

Dracocephalum mexicanum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. t. 160.

Gardoquia betonicoides, Lindl. Bot. Reg. 1838, Misc. p. 86; Bot. Mag. t. 3860.

N. V. Torongil del país.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 682); Xochimilco y Milpa alta (Valle de México), Octubre de 1884 (M. Urbina); Tlalpam (Distrito Federal), Agosto de 1889 (A. Herrera); Montañas arriba de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Agosto 3 de 1892 (C. G. Pringle, 4127): Sierra Madre (Est. de Chinuahua), Septiembre de 1887 (C. G. Pringle,)

Cedronella pallida, Lindl. Bot. Reg. 1846, t. 29; DC. Prodr. xII. p. 406.

Cerca de Cusihuiriachic (Еsт. DE Синианиа), Septiembre 20 de 1888 (С. G. Pringle, 3053).

TRIBUS V. STACHYDE Æ.

Scutellaria cærulea, Moc. et Sesse, ex Benth. in Bot. Reg. sub. t. 1493; DC. Prodr. xii. p. 429.

Cerro del Borrego, Orizaba (Est. DE Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro); Montañas boscosas y frías, cercu de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Agosto 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4154); Bancos húmedos y sombríos, Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3068).

Scutellaria drummondii, Benth. Lab. p. 441; DC. Prodr. xii. p. 428; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 380.

Cerros cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2712).

Scutellaria hispidula, Rob. n. sp.

Praderas. Flor de María (Est. de México), Agosto 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3233).

Scutellaria purpurascens, Swartz. Fl. Ind. Occ. 11. p. 1013; DC. Prodr. XII. p. 416; Greseb. Fl. Brit, W. Ind. p. 492.

Capas calizas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 28 de 1891 (C. G. Pringle, 3910).

Scutellaria rumicifolia, Вентн.

Cerros cespitosos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3067).

Scutellaria versicolor, Nutt.

Cañadas fértiles y sombrías. Sierra Madre, cerca de Mon-

terrey (Est. de Nuevo León), Junio 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2219, 2786).

Scutellaria, sp.

Rancho del Gachupín y Sta. Cruz, Valle de Túxpam (Est. de Jalisco), Marzo de 1887 (M. Bárcena, 355, 391).

- Marrubium vulgare, Linn. Sp. Pl. p. 816; DC. Prodr. xii. p. 453;
 A. Gr. Synop. Fl.N. Am. II. p. 384; Hanne, Arzn. Gew. xi. t. 40.
 Marrubium hamatum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 310.
 S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 681); Tlalpam, Valle de México, Abril de 1884 (M. Urbina).
- Stachys bigelowii, A. Gr. ex Watson in Proc. Am. Acad. xviii. p. 140.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 685).

Stachys coccinea, Jaco. Hort. Schonb. III. p. 18, t. 284; DC.
 Prodr. XII. p. 467; A. GR. Synop. Fl. N. Am. II. p. 388; Bot.
 Mag. t. 666; Andr. Bot. Rep. t. 310.

Stachys cardinalis, Kunze in Bot. Zeit. 1844, p. 645.

Barranca del Salto, Amecameca (Est. DE México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Stachys drummondii, Benth. Lab. p. 551; DC. Prodr. XII. p. 478; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 386.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 684); Cuestas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3217).

Stachys keerlii, Benth. Lab. p. 551; DC. Prodr. xii. p. 480.

Stachys excelsa, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (reprint, p. 10)

Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4878).

Stachys pilosissima, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. XI. (reprint, p. 10); DC. Prodr. XII. p. 469.

Bancos húmedos. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4899).

Stachys repens, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (reprint, p. 10); DC. Prodr. xii. p. 479.

Llano del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Abril de 1891 (P. Toro); Suelo arenoso, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4208).

- Tetraclea coulteri, A. Gr. in Am. Journ. Sc. ser. 2, xvi. p. 98; Synop. Fl. N. Am. n. p. 347; Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 134, t. 41.
 - S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 687); Llanos y cerros (Est. DE CHIHUAHUA), Septiembre 17 de 1886 (C. G. Pringle, . . .)

TRIBUS VIII. AJUGOIDEÆ.

- Teucrium cubense, Linn. Mant. p. 80; DC. Prodr. xii. p. 578; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 349; Jacq. Obs. t. 30; Griseb, Fl. Brit. W. Ind. p. 492.
 - S Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 687).

ORDO CXXXVI. PLANTAGINEÆ.

- Plantago caulescens, WATS. in Proc. Am. Acad. XVIII. p. 141. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 658).
- Plantago floccosa, Dene. in DC. Prodr. xiii. 1, p. 723.

Cerros cespitosos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3086).

- Plantago galeottiana, Dene. in DC. Prodr. xiii. 1, p. 726.
 - Praderas de la Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4904).
- Plantago hirtella, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 229, t. 127; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. 11. p. 392.
 - S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 657).
- Plantago linearis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 186.
 - En el cráter, Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 25 de 1892 (C. G. Pringle, 4300).
- Plantago mexicana, Link. Enum. Pl. Hort. Berol. i. p. 121; DC. Prodr. xiii. 1, p. 713.
 - S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 659, in part.)
- Plantago patagonica, Jaco. ex Wats. in Proc. Am. Acad. xviii.
 - S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 659, in part.)
- Plantago virginica, Linn. Sp. Pl. II. p. 164; DC. Prodr. xIII. 1, p. 732; A. Gr. Synop. Fl. N. Am. II. p. 391.
 - Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 655).

PHANEROGAMIA.-DICOTYLEDONES.-MONOCHLAMIDEÆ.

ORDO CXXXVII. NYCTAGINEÆ.

TRIBUS I. MIRABILIEÆ.

Oxybaphus aggregatus, Vahl. Enum. n. p. 41; Choisy in DC. Prodr. xm. 2, p. 433.

Mirabilis aggregata, CAV, Ic. Pl. t. 437.

Calyxhymenia aggregata, ORT. Dec. vII. p. 81, t. 11.

Allionia aggregata, Spreng. Syst. 1. p. 384.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 177).

Oxybaphus angustifolius, Sweet. Hort. Brit. ed. 2, p. 429; Choisy in DC. Prodr. xiii. 2, p. 433; Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 169.

Cerros pedregosos, cerca de Chihuahua, Septiembre de 1886 (C. G. Pringle, 840).

Oxybaphus nyctagineus, Sweet.

var. cervantesii, Gray.

S. Bartolo (Est. de S. Luis Porosi), Julio 11 de 1891 (C. G. Pringle,)

Oxybaphus, sp.

Hac. de la Guiñada (Est. de México), Septiembre de 1888 (F. Altamirano).

Allionia incarnata, Linn. Sp. Pl. p. 147; DC. Prodr. xiii. 2, p. 434; Lam. III. t. 58; L'Hér. Stirp. t. 31.

Allionia malacoides, Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 44.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 175).

Boerhaavia erecta, Linn. DC. Prodr. xiii. 2, p. 450; Griseb. Fi. Brit. Fi. W. Ind. p. 69; Jaco. Hort. Windov. tt. 5 et 6. Cerros pedregosos, cerca de Chihuahua, Agosto 27 de 1887 (C. G. Pringle, 1582).

Boerhaavia viscosa, Lag. et Rodr. Choisy in DC. Prodr. xm. 2, p. 452.

N. V. Coanenepilli, en Guadalajara.

Cerro del Tepeyac, Valle de México, Septiembre de 1881 (M. Urbina); Los Colomitos, Valle de Guadalajara, Mayo de 1887 (M. Bárcena, 233); S. Luís Potosi, 1877 (G. Schaffner, 176).

Acleisanthes longiflora, A. Gr. in Am. Journ. Sc. ser. 2, xv. p. 260; Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. t. 46.
Llanos (Est. de Chinuanua), Mayo 12 de 1885 (C. G. Pringle...)

Okenia hypogæa, Cham et Schl. in Linnæa v. p. 92.

Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Julio 4 de 1893 (C. G. Pringle, 5444).

Abronia turbinata, Torr. ex S. Wats. in Bot. King's Exped. p. 285, t. 31; Bot. Calif. n. p. 5.

Paso del Norte (Est. de Chindanua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,)

Boldoa ovatifolia, LAG.

Lugares incultos, Tequila (Est. DE JALISCO), Octubre 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4594).

Tribus II. PISONIEÆ.

Pisonia hirsuta, Pers.

Bancos pedregosos del río, Salto de Juanacatlán (Est. de Jalisco), Octubre 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3879).

Pisonia hirtella, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. 11. p. 217; DC. Prodr. x111. 2, p. 445.

Pisonia mexicana, Willd. ex Link. Enum. Pl. Hort. Berol I. p. 354.

Boerhaavia arborea, Lag. Ann. Sc. Nat. 1801.

Boerhaavia arborescens, Pers. Ench. 1. p. 30.

Chapultepec y cerro de Guadalupe (VALLE DE MÉXICO), Agosto de 1881 (M. Urbina).

Pisonia sp.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Valle de Zacoalco (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 325).

ORDO CXXXVIII, ILLECEBRACEÆ.

TRIBUS I. POLLICHIEÆ.

Achyronychia parryi, Hemst. Diag. Pl. Nov. pars. 2, p. 36; Biol. Cent. Am. Bot. m. p. 10.

Cerca de los Morales, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 132); Bajo los arbustos. Cerros de las Rocas (Est. de S. Luis Porosí), Agosto 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3213).

TRIBUS II. PARONYCHIEÆ.

Paronychia mexicana, Hensl. Diag. Pl. Nov. pars 2, p. 36; Biol. Cen. Am. Bot. III. p. 11.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner 133). Capas arenosas y secas, cerros de Zacatecas, Octubre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 3931).

Paronychia wilkinsoni, WATSON.

Sitios y cimas arenosos. Cerros cerca de Chihuahua, Septiembre 30 de 1885 (C. G. Pringle, 341).

Corrigiola andina, Tr. et Pl. Prodr. Fl. N. Gran. I. p. 146. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 136).

ORDO CXXXIX. AMARANTACEÆ.

TRIBUS II. AMARANTEÆ.

Amarantus hypochondriacus, Linn. Sp. Pl. p. 1407; DC. Prodr. xiii. 2, p. 256.

N. V. Quelite, Alegría.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 761); Huchuetoca (Est. de México), Septiembre de 1888 (M. Urbina).

Amarantus palmeri, Wars. in Proc. Am Acad. xII. p. 274, et Bot. Calif. II. p. 42.

N. V. Quelite.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 886); Cerro del Tepeyac, Valle de México, Septiembre de 1881 (M. Urbina); Valle de Ciudad Juárez (Est. de Синианиа), Agosto 6 de 1885 (C. G. Pringle,)

Achyrantes aspera, Linn. Sp. Pl. p. 295; DC. Prodr. xiii. 2, p. 314; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 62. Hac. del Cortijo, Valle de Túxpam (Est. de Jalisco), Septiem-

bre de 1886 (M. Barcena, 365, 399).

TRIBUS III. GOMPHRENEÆ.

Guilleminea illecebroides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. vi. p. 42, t. 518.

Guilleminea densa, Moq. in DC. Prodr. xm. 2, p. 338. Illecebrum densum, Willd. in Rœm. et Schult. Syst. v. p. 517. Guilleminea illecebrum, Spreng. Syst. Cur. Post. p. 103.

En lugares arenosos cerca de la Ciudad de S. Luis Potosí Agosto de 1876 (G. Schaffner, 880). Llanuras. La Honda (Est. de Zacatecas), Agosto 6 de 1891 (C. G. Pringle, 4071).

Telanthera obovata, Moq. in DC. Prodr. xiii. 2, p. 370.

Bucholzia obovata, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint, p. 8.)

Cempoala (Est. de Veracruz), Enero de 1801 (M. Villada).

Gossypianthus rigidiflorus, Ноок. Ic. Pl. t. 251; DC. Prodr. xIII. p. 337.

Llanuras cerca de Chihuahua, O ctubre 14 de 1886 (C. G. Pringle, 976).

Gomphrena decumbens, Horr. Scheenb. t. 482; DC. Prodr. xiii. 2, p. 410.

Gomphrena prostrata, Desf. Hort. Par. 1804, App. p. 219. (non Mart)

Suelo delgado y arenoso (Est. de México), Agosto 26 de 1890 (C. G. Pringle, 3152).

Gomphrena globosa, Linx. Sp. Pl. p. 326; DC. Prodr. xul. 2, p. 409, cum y. albiflora; Bot. Mag. t. 2815.

N. V. Sempiterna, Permanente, Madroño.

Soconusco (Est. de Chiapas), Noviembre de 1883 (R. Montes de Oca); Zapópam (Est. de Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bárcena, 93, 760).

Gomphrena nitida, Rothk. in Bot. Wheeler's. Surv. 1878, p. 273

Cerro del Tepeyac (Valle de México), Septiembre de 1881 (M. Urbina); Llano de Mexicalcingo y Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Octubre de 1887 (M. Barcena, 155, 759); Base de la Sierra Madre (Est. de Chhuahna), Septiembre de 1887 (C. G. Pringle,....)

Gomphrena, sp.

Llano de Mexicalcingo (Est. DE Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bárcena, 163).

Frœlichia interrupta, Mog. in DC. Prodr. xiii. 2, p. 421.

Gomphrena interrupta, Linn. Sp. Pl. p. 326; Lam. Ill. Pl. t.
180, fig. 2.

Celosia procumbens, JACQ. Ic. Pl. Rar. 1. t. 51. Oplotheca interrupta, Nurr. Gen. Am. 11. p. 79.

Montes de los Morales, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 877).

Iresine canescens, Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. Pl. Iv. p. 765.

Tromsdorffia canescens, Mart. Nov. Gen. et Sp. Bras. u. p. 42.

Alternanthera canescens, Moo. in DC. Prodr. xut. 2, p. 350.

Valle de Ahualuleo (Est. de Jalisco), Agosto de 1887 (M. Bårcena, 514); Thalpam, Valle de México, Julio de 1889 (A. Herrera); De 5 á 10 piés de altura. Capas ealizas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potost), Diciembre 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3962).

Iresine celosioides, Linn. Sp. Pl. p. 1456; DC. Prodr. xiii. 2, p. 347.

Iresine polymorpha, MART. Nov. Gen. et Sp. Bras. II. p. 56, tt 153 et 151.

Iresine diffusa, Humb. et Bonpl. in Willd. Sp. Pl. iv. p. 765; DC. Prodr. xiii. 2, p. 345.

Iresine floribunda, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint, p. 7.)

Iresine eriophylla, Moq. in DC. Prodr. x111. 2, p. 847.

Iresine celosioides, var. eriophylla, Benth. Bot. Voy. "Sulphur." p. 156.

Barranca de Cacahuamilpa (Est. de Guerrero), Enero de 1886 (M. Villada); Cerros, en la sombra (Est. de Chimuahua), Septiembre 22 de 1885 (C. G. Pringle, 348).

Iresine gossypina? Nees, in Linnæa xix, p. 708.

Valles de Guadalajara y de Afualulco (Est. De Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 515 y 515 bis).

Iresine gracilis? Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint, p. 7); DC. Prodr. xiii. 2, p. 345.

Garita del Sur, Valle de Guadalajara (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 176).

Iresine interrupta, Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 156.

Alternanthera richardii, Moo. in DC. Prodr xIII. 2, p. 353.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 516). De 15 á 20 piés, trepadora sobre rocas y arbustos. Capas calizas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Diciembre 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3961).

Iresine latifolia, Bentu. et Hook. f. Gen. Pl. 111. p. 42.

Alternanthera latifolia, Mog. in DC. Prodr. xIII. 2, p. 351.

Gomplirena latifolia, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux.

(reprint, p. 9.)

De 12-20 piés. Valle de Oaxaca, á 5,000 piés. Noviembre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 6058).

Iresine laxa, WATSON.

Barranca, cerca de Guadalajara, Mayo 20 de 1891 (C. G. Pringle, 5149).

Iresine pringlei, WATSON.

Barranea, cerca de Guadalajara, Noviembre 16 de 1889 (C. G. Pringle, 2766). De 3-6 piés. Monte Albán, cerca de Oaxaca, a 5,800 piés. Noviembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 6061).

Iresine schaffneri, WATSON.

Cerros pedregosos. Bocas (Est. de S. Luis Potosí), Mayo 13 de 1891 (C. G. Pringle, 3705).

Iresine sp.

N. V. Tlantlacuaya.

Matamoros Izúcar (Est. de Puebla). Ejempla renviado por el Sr. Dañez.

Iresine sp.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 875).

Dicraurus diffusus, Hook. fil. ex Wats. in Proc. Am. Acad. xviii.

Montes Morales, S. Luis Potosí, 1878 (G. Schaffner, 878).

Dicraurus leptocladus, Hook. fil. in Benth. et Hook. Gen. Pl. III. p. 43.

Cerros y llanuras, cerca de Chihuahua, Septiembre 5 de 1886 (C. G. Pringle, 988).

Ordo CXL. CHENOPODIACEÆ.

TRIBUS I. CHENOPODIEÆ.

Cycloloma platyphyllum, Moo.

Paso del Norte (Est. de Chinuanua), Septiembre 8 de 1888 (C. G. Pringle,)

Chenopodium ambrosioides, Linn. Sp. Pl. p. 320; DC. Prodr. XIII. 2, p. 72; GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 60.

Ambrina ambrosioides, Spach. Veg. Phan. v. p. 207.

N. V. Epasote, Mex. Epasotl.

Valle de Guadalajara, Abril de 1887 (M. Bárcena, 232).

Chenopodium foetidum, Schrad in Mag. Gesell. Nat. Berl. 1808, p. 79, non Lam. ex Moq. in DC. Prodr. xiii. 2, p. 76.

Chenopodium graveolens, LAG. et Ropp. in Ann. Se. Nat. 1802, p. 70, t. 5. (non Willd.)

Chenopodium schraderianum, RGM. et Schult. Syst. Veg. vi. p. 260

Botrydium schraderi, Spach. Veg. Phan. v. p. 299.

Ambrina fætida, Moo. Chenop. Enum. p. 38.

Chenopodium effusum, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint, p. 6.)

N. V. Aediondilla. Se usa con muy buen éxito en las enfermedades de la piel.

Вот.--76.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 853); Valle de México, Enero de 1885 (M. Urbina); Cañón de Tultenango (Est. de México), Octubre 31 de 1892 (C. G. Pringle, 5274).

Chenopodium fremontii, Wats. in King.'s Rep. v. p. 287, et in Proc. Am. Acad. ix. p. 94.

var. incanum, WATS,

Valle de Ortíz (Еsт. de Синианиа), Mayo 26 de 1888 (С. G. Pringle, 3038); S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 851).

Chenopodium sp.

Huehuetoca (Est. de México), Septiembre de 1888 (F. Altamirano).

TRIBUS II. ATRIPLICEÆ.

Atriplex acanthocarpa, Wats. in Proc. Am. Acad. ix. p. 117.

Obione acanthocarpa, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 183.

var. Llanuras alcalinas, Hac. de la Angostura (Est. de S. Luis Porosi), Julio 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3775).

TRIBUS VIII. SUÆDEÆ.

Suæda sp.

Llanuras alcalinas, Hac. de la Angostura (Est. de S. Luis Potosi), Julio 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3788).

ORDO CXLI. PHYTOLACCACEÆ.

TRIBUS I. RIVINEÆ.

Rivina humilis, Linn. Sp. Pl. p. 177; DC. Prodr. xiii. 2, p. 13; Bot. Mag. t. 1781.

Rivina lævis, Linn. Mant. p. 41; DC. Prodr. XIII. 2, p. 11; GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 59; Bot. Mag. t. 2333. Rivina orientalis, Moq. in DC. Prodr. XIII. 2, p. 12. Rivina brasiliensis, Nocca in Usteri Ann. vl. p. 63.

Rivina purpurascens, Schrad. Gen. Pl. Ill. p. 17, t. 5.

Rivina lanceolata, WILLD. Enum. Pl. Hort. Berol. Suppl. p. 8. Rivina glabrata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 184.

Rivina mexicana, Moc. et Sessé in DC. Prodr. XIII. 2, p. 14; DC. Calg. des Dess. Fl. Mex. 1095.

N. V. Coral.

La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre de 1887 (M. Barcena, 135, 328); Cerro del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro).

TRIBUS II. EUPHYTOLACCEÆ.

Phytolacea octandra, Linn. Sp. Pl. p. 631; DC. Prodr. xiii. 2, p. 32; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 58.

Phytolacca decandra, Desc. Fl. Antill. v. p. 312, non Linn. Phytolacca rugosa, A. Br. et Bouché in Linnæa xxv. p. 297? Phytolacca longispica, Moq. in DC. Prodr. xiii. 2, p. 33?

N. V. Mazorquilla, Namole, Góngora, Jabonera.

S. Angel (Valle de México) y Xico (Lago de Chalco), Agosto de 1888 (M. Urbina).

GENERA ANOMALA.

Agdestis clematidea, Moc. et Sessé in DC. Prodr. t. p. 103; Calq. des Dess. F1. Mex. 12; Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 30, t. LXXI.

Agdestis teterrima, DE Notar. Ind. Sem. Hort. Bot. Genuen. 1855; WALP. Ann. VII. p. 69?

Árboles formando festones. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Septiembre 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3276).

ORDO CXLIII. POLYGONACEÆ.

TRIBUS I, ERIOGONEÆ.

Eriogonum abertiana, Torr. in Emory's Rep. p. 151; DC.
Prodr. XIV. p. 21; Proc. Am. Acad. VIII. p. 189, et XII. p. 258.
Cerca de S. Rafael, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 873).

Eriogonum rotundifolium, Benth. in DC. Prodr. xiv. p. 21; Proc. Am. Acad. viii. p. 183, et xii. p. 260.

Paso del-Norte (Est. de Cinhuahua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,)

Eriogonum thomasii, Torr. in Pacif. Railr. Rep. iv. p. 364; Torr. et Gr. in Proc. Am. Acad. viii. p. 184.

Cerros del Noroeste (Est. de Sonora), Marzo 26 de 1884 (C. G. Pringle, . . .)

Eriogonum wrightii, Torr. ex Benth. in DC. Prodr. xiv. p. 15; Proc. Am. Acad. viii. p. 176, et xii. p. 266.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 874).

TRIBUS III. EUPOLYGONEÆ.

Polygonum acre, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 179; DC. Prodr xiv. p. 108 (varietates); Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 161; Fl Bras. xiv. t. 5.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 884).

Polygonum aviculare, Linn. Sp. Pl. p. 519; DC. Prodr. xiv. p. 97 (varietates); A. Gr. Man. Bot. ed. 5, p. 417.

En la Escuela de Agricultura y en todo el Valle de México. Marzo de 1882 (M. Urbina).

Polygonum lapathifolium, Linn. Sp. Pl. p. 517; DC. Prodr. xiv. p. 119; A. Gr. Man. Bot. ed. 5, p. 415.

Lugares húmedos, cerca del Lago de Cuitzeo (Est. DE MI-CHOACÁN), Agosto 8 de 1892 (C. G. Pringle, 4186).

Lugares húmedos, Valle de Toluca, Agosto 15 de 1892 (C. G. Pringle, 4185); P. nodosum, Pers.

Especie ámpliamente esparcida en los lugares cultivados y probablemente introducida á America, s. Hemsley. (Véase Biol. Cent. Am. Bot.)

Polygonum mexicanum, SNALL.

Sitios húmedos, cerca de Morelia (Est. de Michoacan), Agosto 8 de 1892 (C. G. Pringle, 4187).

Polygonum pennsylvanioum, Linn. Sp. Pl. p. 519; DC. Prodr. xiv. p. 120; A. Gr. Man. Bot. ed. 5, p. 388.

N. V. Moco de Guajolote.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 879, 882). La Presa y Arroyo

de Enmedio (Est. de Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bárcena, 158, 234, 766),

Polygonum persicaria, Linn. ex Wats. in Proc. Am. Acad.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 883); Escuela de Agricultura, Valle de México, Marzo de 1882 (M. Urbina); Colomitos, Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Marzo de 1887 (M. Barcena, 236).

Polygonum persicarioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 179; DC. Prodr. xiv. p. 117.

Riveras pantanosas, Valle de Toluca (Est. De México), Agosto 29 de 1892 (C. G. Pringle, 4218).

Polygonum punctatum, ELL.

var. eciliatum, Small. n. var.

Lugares húmedos, Valle de Toluca (Est. DE México), Agosto 24 de 1892 (C. G. Pringle, 4213).

Polygonum sp.

Huchuetoca (Est. de México), Septiembre de 1888 (F. Altamirano).

TRIBUS IV. RUMICEÆ.

Rumex obtusifolius, LINN.

Ixtapalapam, Valle de México, Julio de 1886 (M. Urbina).

Rumex patientia, Linn. N. V. Lengua de vaca.

Valle de Guadalajara, Octubre de 1887 (M. Bârcena, 235).

TRIBUS V. COCCOLOBEÆ.

Antigonon flavescens, WATSON.

Bajo 1as peñas, Barranca de Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 2 de 1893 (C. G. Pringle, 4570).

Antigonon viride, WATSON.

N. V. Coamecate; Mex. Coamecatl.

Valle de Sta. Ana (Est. DE Jalisco), Octubre de 1887 (M. Bårcena, 303).

Box .- . 77.

ORDO CXLVI. CYTINACEÆ.

TRIBUS L. RAFFLESIEÆ.

Cytinus oxylepis, Rob. n. sp.

Parásita sobre las raíces de las Burseras. Bancos de lava, cerca de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo 27 de 1893 (C. G. Pringle, 4373).

Apodanthes pringlei, WATSON.

Sobre la Dalea frutescens.

Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Mayo 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2698).

ORDO CXLVII. ARISTOLOCHIEÆ.

Aristolochia brevipes, Benth. Pl. Hartw. p. 15; DC. Prodr. xv. 1, t. 441.

Einomeia brevipes, KL. in Monatsb. 1859, p. 606.

Cerca de Monterrey (Est. DE NUEVO LEÓN), Junio 22 de 1888 (C. G. Pringle, 2268).

Aristolochia guadalajarana, WATS.

Llanuras de Guadalajara, Mayo 23 de 1891 (C. G. Pringle, 3714).

Aristolochia longecaudata, Wars. in Proc. Am. Acad. xxii. p. 447.

Colomitos, Valle de Guadalajara, Marzo de 1887 (M. Bárcena, 230); Llanuras arenosas cerca de Guadalajara, Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4425).

Aristolochia longipes, WATS.

Barranca cerca de Guadalajara, Agosto 15 de 1893 (C. G. Pringle, 5423).

Aristolochia odoratissima, Linn. Sp. Pl. p. 1362; DC. Prodr. xv. 1, p. 474; Descourt. Fl. Antill. v. t. 356.

N. V. Tacopaste o Yerba del Indio.

Raíz aromática y medicinal.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Agosto de 1887 (M. Bárcena, 532).

Aristolochia pardina, Duchar, in Ann. Sc. Nat. serie 4, u. p. 47, et in DC. Prodr. xv. 1, p. 450.

Cempoala (Est. de Veracruz), Enero de 1891 (M. Villada).

Aristolochia sp.

So conusco (Est. de Chiapas), Mayo de 1884 (R. Montes de Oca).

ORDO CXLVIII. PIPERACEÆ.

TRIBUS I. SAURUREÆ.

Houttuyna californica, Benth. et Hook. Gen. Pl. III. p. 128.

Anemiopsis californica, Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 390, t. 92; DC. Prodr. xvi. 1, p. 237; Bot. Mag. t. 5922; Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 203.

Anemiopsis bolanderi, C. DC. in Linnea xxxvii. p. 333?

N. V. Raiz del Manso.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 532).

TRIBUS II. PIPEREÆ.

Piper aduneum, Linn. Sp. Pl. p. 41; DC. Prodr. xvi. 1, p. 285;
Jacq. Ic. Pl. Rat. II. t. 210; Descourt. Fl. Antill. III. t. 230.

Artanthe adunca, Miq. Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 171.

Steffensia adunca, Ktil. in Linnæa xill. p. 533.

De 15 piés de altura. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis

Porosí), Junio 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3088).

Piper auritum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 54; DC. Prodr.

xvi. 1, p. 320.

Artanthe aurita, Miq. Syst. Pip. p. 400. Schilleria aurita, Krii. in Linnæa xiii. p. 713.

Artanthe seemanniana, Miq. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 199, t. 39.

De 3 á 4 piés de altura. Á orilla de las corrientes. Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosí), Junio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3693).

Piper berlandieri, C. DC. in DC. Prodr. xvi. 1, p. 295.

Las Palmas (Est. de S. Luis Porosf), Junio 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3751).

Piper jaliscanum, Wats. n. sp.

De 15 piés de altura. Cañadas húmedas cerca de Guadalajara. Octubre 1.º de 1891 (C. G. Pringle, 3871).

Piper leucophyllum, C. DC. in DC. Prodr. xvi. 1, p.

Barrancas húmedas, cerca de Guadalajara, Octubre 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3885).

Piper sanctum, Schl. ex Miq. in Linnæa xvIII. p. 714; DC. Prodr. xvI. 1, p. 330.

N. V. Acuyo, Hoja de ajan, Yerba santa; Mex. Tlanepaquilitl. Usada como condimento.

Barranca de Metlac (Est. de Veracruz), Abril de 1881 (J. M. Velasco); Cempoala (Est. de Veracruz), Enero de 1891 (M. Villada).

Peperomia blanda, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 67; Ноок; Exot. Fl t. 21; DC. Prodr. xvi. 1, p. 458.

Piper blandum, JACQ. Ic. Pl. Rar. H. t. 218.

Bancos húmedos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 7 de 1891 (C. G. Pringle, 3906).

var. Sobre los árboles. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 8 de 1891 (C. G. Pringle, 3809).

Peperomia edulis, Mio. in Linnæa xviii. p. 711; DC. Prodr. xvi. 1, p. 450.

Sobre los árboles y las rocas. Cañon de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3805).

Peperomia jaliscana, Wats. n. sp.

Bancos fértiles y sombríos, Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 26 de 1889 (C. G. Pringle, 2953).

Peperomia magnoliæfolia, A. Dietr. Sp. Pl. 1. p. 153; Mio. Syst. Pip. p. 97; DC. Prodr. xvi. 1, p. 427.

Piper magnoliæfolium, JACQ. Ic. Pl. Rar. t. 213.

Capas calizas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 9 de 1891 (C. G. Pringle, 5110); Micos (Est. de S. Luis Potosí), Diciembre 9 de 1891 (C. G. Pringle, 5066).

Peperomia mülleri, C. DC. in Linnæa xxxvII. p. 366.

Praderas húmedas. Sierra de S. Felipe, á 8,500 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 22 de 1894 (C. G. Pringle, 4654).

Peperomia reflexa, A. Dietr, Sp. Pl. 1. p. 180; DC. Prodr. xvi 1, p. 45 (varietates); Miq. Syst. Pip. p. 169; Wight. Ic. Pl. Ind. Or. t. 1923.

Piper reflexum, Linn, f. Suppl. p. 91.

Sierras cerca de Pátzeuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 23 de 1891 (C. G. Pringle, 4096).

Peperomia umbilicata, Ruz et Pav. Fl. Peruv. et Chil. r. p. 30, t. 45, fig. b; DC. Prodr. xvi. 1, p. 393 (varietates); H. B. K. Nov. Gen. et Sp. r. p. 72, t. 15, fig. 1.

var. macrophylla, C. DC.

Laderas húmedas, cerca del Lago de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Julio 16 de 1892 (C. G. Pringle, 4124); S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 108).

ORDO CLI. MONIMIACEÆ.

TRIBUS II. ATHEROSPERMEÆ.

Siparuna riparia, A. DC. in DC. Prodr. xvi. 2, p. 647.

Citrosma riparia, Tul. in Ann. Sc. Nat. serie 4, m. p. 36.

N. V. Limoncillo.

Motzorongo (Est. de Veracruz), Junio de 1891 (F. Altamirano).

ORDO CLII. LAURINEÆ.

TRIBUS I. PERSEÆ.

Persea hartwegii, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 72.

Phabe hartwegii, Meissn. in DC. Prodr. xv. I, p. 30.

Orcodapne benthamiana, Nees. in Linnaea xxi. p. 521.

Årbol de tamaño mediano. Por las corrientes. Las Canoas
(Est. de S. Luis Potosf), Julio 22 de 1891 (C. G. Pringle,
3783).

Nectandra sanguinea, Rоттв, in Act. Hafn. 1778, p. 279, et Pl. Surin. p. 10; DC. Prodr. xv. 1, p. 164.

Un arbusto grande. Cañón de Tamasopo (Est. De S. Luis Potosí), Junio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3725).

Bor,--78.

TRIBUS II. LITSEACEÆ.

Litsea parvifolia, Mez.

De 10 á 15 piés. Montañas. Paso de S. José (Est. de S. Luis Ротоsí), Agosto 15 de 1890 (С. G. Pringle, 3146).

ORDO CLVII. LORANTHACEÆ.

TRIBUS I. EULORANTHEÆ.

Loranthus crassipes, D. Oliv. in Vidensk. Meddel. 1864, p. 173.

Parásita sobre la Acacia farnesiana.

Praderas bajas, Hac. de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Diciembre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3978).

Loranthus microphyllus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 439, t. 300; DC. Prodr. IV. p. 310.

Parásita sobre las encinas. Base del Nevado de Colima (Est. DE JALISCO), Mayo 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4369).

Loranthus palmeri, WATSON.

Parásita sobre varias especies de Bursera.

Sitios agrestes de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 26 de 1891 (C. G. Pringle, 3858).

Loranthus spirostylis, DC. Prodr. iv. p. 315; D. Oliv. in Vidensk. Meddel. 1864, p. 172.

Spirostylis hænkeana, Presl. in Schult. Syst. Veg. viii. p. 163. Sobre las encinas. Faldas de los cerros, arriba de Oaxaca, a 7,000 piés. Junio 14 de 1894 (C. G. Pringle, 4697).

Loranthus sp.

N. V. Mal ojo.

Flor roja, parásita sobre el mezquite.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Barcena, 629).

Loranthus sp.

Entre Tultenango, Tepetongo y Mineral del Oro (Est. de Guerrero), Mayo 4 de 1891 (M. Villada).

TRIBUS II. VISCEÆ.

Arceuthobium robustum, Eng.

Parásita sobre los pinos, a 10 y 12,000 piés. Nevado de Colima (Est. de Jalisco), Mayo 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4368).

Arcenthobium vaginatum, Eight.

Sobre los pinos. Sierra de S. Felipe, à 10,500 piés (Est. DE OAXACA), Junio 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4727).

Phoradendron angustifolium, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. 2, p. 115, in obs. adn. n. 13.

Loranthus angustifolius, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 111. p. 442. Viscum falcatum, Силм. et Schl. in Linnea v. p. 172, nec Hook. Ic, t. 368.

Viscum schiedeanum, DC. Prodr. IV. p. 670.

Sobre Ias encinas. Sierra de S. Felipe, á 8,000 piés (Est. DE OAXACA), Junio 14 de 1894 (C. G. Pringle, 4699).

Phoradendron bolleanum, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 111. p. 84.

Viscum bolleanum, Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 295, t. 63. Parásita sobre el *Arbutus*.

Sierra de Tequila, de 7-9,000 piés (Est. de Jalisco), Junio 30 de 1893 (C. G. Pringle, 4434); Montañas de Sta. Eulalia (Est. de Cinhuanua), Abril de 1885 (C. G. Pringle, 256).

Phoradendron rubrum, GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 314; D. Oliv. in Vidensk. Meddel. 1864, p. 175.

Viscum rubrum, Linn. Sp. Pl. p. 1451; DC. Prodr. iv. p. 281.

Viscum kunthianum, DC. Prodr. IV. p. 283.

Loranthus viscifolius, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. III. p. 443.

Jaripeo (Est. de Michoacán), Noviembre de 1887 (M. Villada). Parásita sobre la Ipomæa murucoides. Cerros cerca de Guadajara, Diciembre 14 de 1889 (C. G. Pringle, 2668).

Phoradendron tomentosum, D. Oliv. in Vidensk. Meddel. 1864, p. 176.

Viscum tomentosum, DC. Prodr. iv. p. 670.

N. V. Visco cuercino, Liga.

Parásita sobre el Taxodium mucronatum.

Chapultepec, Valle de México, Mayo de 1881 (M. Urbina).

Phoradendron sp.

N. V. Chachahua.

Teocalzingo (Est. de Guerrero), Enero de 1876 (F. Altamirano).

ORDO CLIX, BALANOPHOREÆ.

TRIBUS VII. HELOSIDEÆ.

Helosis mexicana, Liebm. in Forhandl. Skand. Naturf. Christ. 1847, p. 181; Еісін. in DC. Prodr. xvii. p. 136; Ноок. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. p. 59, tt. 15 et 16.
Тамаsopo (Евт. de S. Luis Potosi), Agosto 28 de 1891 (С. G.

Pringle, 5050).

ORDO CLX. EUPHORBIACEÆ.

TRIBUS I. EUPHORBIEÆ.

Pedilanthus pringlei, Rob.

Cerros secos que limitan el Valle de Cuicatlan, à 2,000 piés (Est. De Oaxaca), Noviembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 6043).

Pedilanthus tomentellus, Rob. et Greenn. n. sp.

Tierras de labor, cerca de Oaxaca, á 5,500 piés. Septiembre 6 de 1894 (C. G. Pringle, 4912.

Euphorbia adenoptera, Bertol. Misc. III. p. 436, t. 23, fig. 3; DC. Prodr. xv. 2, p. 49; Boiss. Ic. Euphorb. t. 19.

Euphorbia dioica, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 53,

Euphorbia callitrichoides, Schauer in Linnæa xxv. p. 27, non

H. B. K.

Euphorbia anceps, Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 162.

Euphorbia ocymoides, Hook. et Arn. Bot. Beech. Boy. p. 310.

Anisophyllum lindenianum, A. densiflorum, et A. Amænum,

KL. et GARCKE. Tricocc. pp. 37, 28, et 33.

Cerros y llanuras cerca de Chihuahua, Septiembre 16 de 1885 (C. G. Pringle, 326).

Euphorbia ammatotricha, Bois. Cent. Euphorb. p. 10, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 29.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 854).

Euphorbia antisyphilitica, Zucc. in Acad. Monac. vii. p. 272; DC. Prodr. xv. 2, p. 69.

Euphorbia occulta, Kl. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 277. Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 867); Cerros pedregosos y secos, Bocas (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3457).

Euphorbia (Zygophyllidium) biformis, Wats. in Proc. Am. Acad. xviii: p. 151.

Montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 860); Cerros pedregosos y cespitosos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 14 de 1892 (C. G. Pringle, 4323).

Euphorbia brasiliensis, LAM.

Valle cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 29 de 1889 (C. G. Pringle,....)

Euphorbia calyculata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 59; DC.
Prodr. xv. 2, p. 106.

Tithymalus calyculatus, KL. et GARCKE. Tricocc. p. 81.

N. V. Tenguanete, Chupire.

Guadalajara, Marzo de 1890 (M. Bárcena,.....); Hac, de Ibarra, junto a Pátzcuaro (Est. de Micuoacán), Nôviembre de 1888 (M. Villada); Árbol pequeño, cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 11 de 1892 (C. G. Pringle, 4293).

Euphorbia campestris, Cham, et Schl., in Linnæa v. p. 84; DC.
Prodr. xv. 2, p. 146.

N. V. Yerba del Coyote.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 864, 866); Cerro del Pino, al N. E. de Ayotla (Est. de México), Noviembre de 1888 (M. Urbina); Mineral de Guadaccázar (Est. de S. Luis Porosi, Junio de 1892 (M. Villada); S. Francisco Acuautla, a 2,300 metros (Est. de México), Abril de 1890 (F. Altanirano).

Euphorbia cotinifolia, Linn. Amen. Acad. 111. p. 112; DC. Prodr. xv. 2, p. 59; Commel. Hort. Amst. 1. t. 15.

Alectoroctonium cotinifotium, Schi. in Linnæa xix. p. 252, et A. wildenowi, Kl. et Garcke, Tricocc.

Árbol 6 arbusto de 15 á 20 piés, con involucro pubescente. Valle de Oaxaca, á 5,000 piés. Noviembre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 6069).

Euphorbia cumbræ, Boiss. Cent. Euphorb. p. 16, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 48.

Cañón de Tomellín, á 4,000 piés (Est. de Oaxaca), Julio de 1894 (C. G. Pringle, 4797).

Euphorbia cuphosperma, Boiss. in DC. Prodr. xv. 2, p. 73.

Euphorbia dentata, y. cuphosperma, Engelm. in Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 190.

Declives de la Barranca, cerca de Guadalajara (Est. de Ja-Lisco), Septiembre 20 de 1893 (C. G. Pringle, 4542).

Euphorbia delicatula, Boiss. Cent. Euphorb. p. 12, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 55.

Capas y terrenos sombríos. Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 14 de 1893 (C. G. Pringle, 4550).

Euphorbia dentata, Michx. Fl. Bor. Am. n. p. 211; DC. Prodr. xv. 2, p. 72.

Poinsettia dentata, et P. schiedeana, Kl. et Garcke, Tricocc. p. 102.

En los montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 858).

Euphorbia dictyosperma, F. &. M.

Mesas, Paso del Norte (Est. de Chihuahua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle, 5381).

Euphorbia francoana, Boiss. Cent. Euphorb. p. 22; DC. Prodr. xv. 2, p. 58.

Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4599).

Euphorbia graminea, Jaco. Stirp. Am. p. 151; Obs. Bot. t. 31; DC. Prodr. xv. 2, p. 54.

Euphorbia nudiflora, LAM. Dict. II. p. 426.

Euphorbia humboldtii, Willd. Enum. Pl. Hort. Berol. p. 503. Euphorbia leptalea, Schauer in Linnæa xx. p. 728.

Euphorbia canaliculata, Pers. Ench. u. p. 13.

Euphorbia nuda, Steud. Nom. Bot. 1. p. 613.

Anisophyllum humboldtii, HAW. Succ. p. 161.

Adenopetalum gramineum, A. Hoffmannii, A. ærstedii, A. ellipticum, et A. mexicanum, Kl. et Garcke, Tricocc. pp. 47, 48 et 50.

En el campo. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3286).

Euphorbia heterophylla, Linn. Amæn. Acad. III. p. 112; DC. Prodr. xv. 2. p. 72.

En la sombra. Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4552).

Euphorbia hypericifolia, Linx. Hort. Cliff. p. 198; DC. Prodr. xv. 2, p. 23; Hook, Exot. Fl. t. 36.

Euphorbia cuspidata, Bertol. Misc. Bot. III. p. 433, t. 22, fig. 2,

Anisophyllum hyssopifolium, Kl. et Garcke.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3191).

Euphorbia jaliscensis, Rob. et Greenm. n. sp.

Barranca de Tequila (Est. De Jalisco), Septiembre 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4608).

Euphorbia laredana, Millsp. n. sp.

Llanuras arenosas, Laredo (Texas), Julio 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3747).

Euphorbia lathyris, Linn. Sp. Pl. p. 655; DC. Prodr. xv. 2, p. 99. N. V. Piñoncillo.

Planta indígena del Sur de Europa, introducida y naturalizada en México.

Apasco (Est. de México), Mayo de 1890 (F. Altamirano).

Euphorbia longecornuta, WATS. n. sp.

Grietas de los peñascos. Cima de la Sierra de la Silla, á 5,000 piés (Est. de Nuevo León), Junio 3 de 1889 (C. G. Pringle, 2545).

Euphorbia macropoides, Rob. et Greenm. n. sp.

Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 26 de 1894 (C. G. Pringte, 4713).

Euphorbia mendezii, Boiss. Cent. Euphorb. p. 15; et in DC. Prodr. xv. 2, p. 41.

N. V. Yerba de la Golondrina.

Valle de Guadalajara, Abril de 1887 (M. Bárcena, 231, 337): Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3777).

Euphorbia misella, Wats. n. sp. .

Bordes cespitosos y humedos de las praderas. Flor de María (Est. de México), Octubre 18 de 1890 (C. G. Pringle, 3305) Euphorbia multiseta, Benth. Pl. Hartw. p. 51; DC. Prodr. xv. 2, p. 57; Boiss, Ic. Euphorb. t. 36.

Bordes y bancos secos, Barranca de Tepic (Est. De Jalisco), Octubre 10 de 1893 (C. G. Pringle, 4551).

Euphorbia pilulifera, Linn. Amoen. Acad. III. p. 114; DC. Prodr. xv. 2, p. 21; Jaco. Ic. Pl. Rar. III. t. 478.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3190).

Euphorbia prostrata, Arr. Hort. Kew. II. p. 139; DC. Prodr. xv. 2, p. 47; Boiss. Ic. Euphorb. t. 17.

Euphorbia callitrichoides, et E. tenella, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. pp. 52, 53.

Euphorbia trichogona, Bertol. Misc. Bot. III. p. 20, t. 6, fig. 3. Euphorbia perforata, Guss. Fl. Sic. Prodr. 1. p. 540.

N. V. Yerba de la Golondrina.

Cerro del Tepeyac, Valle de México, Septiembre de 1881 (M. Urbina); Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3781).

Euphorbia pulcherrima, Willd. ex Boiss. in DC. Prodr. xv. 2, p. 71.

Euphorbia erytrophylla, Bert. Fl. Guat. p. 19. t. 6.

Poinsettia pulcherrima, Grah. Edinb. Phil. Journ. 1836; Bot. Mag. t. 3493.

N. V. Flor de Noche buena, Paño de Holanda.

Jardín del Museo Nacional, Noviembre de 1887 (M. Urbina).

Euphorbia radians, Bentii. Pl. Hartw. pp. 8. et 20; DC. Prodr. xv. 2, p. 74.

Poinsettia radians, KL. et GARCKE, Tricocc. p. 104.

N. V. Colecitas.

S. Cristóbal Ecatepec (Est. de México), Marzo de 1889 (M. Urbina); S. Francisco Acuautla (Est. de México), á 2,300 metros (F. Altamirano).

Euphorbia retroscabra, Watson.

Bordes fríos de las barrancas, cerca de Guadalajara, Julio 11 de 1893 (C. G. Pringle, 4421).

Euphorbia scabrella, Boiss. Cent. Euphorb.

Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 16 de 1893 (C. G. Pringle, 5443).

Euphorbia serpens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 92; DC. Prodr. xv. 2, p. 29.

Barranca de Río Grande, cerca de Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel); Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosí), Julio 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3778).

Euphorbia serpyllifolia, Pers; DC. Prodr. xv. 2, p. 43; S. Wars, in Proc. Am. Acad. xviii. p. 151.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 854).

Euphorbia serrula, Engelm.

Mesas (Est. de Chihuahua), Septiembre 2 de 1886 (C. G. Pringle, 799).

Euphorbia sphærorrhiza, Benth. Pl. Hartw. p. 8; DC. Prodr. xv. 2, p. 68; Hook. Ic. Pl. t. 346.

Tithymalopsis sphærorrhisa, KL. et GARCKE, Tricocc. p. 44. En los Morales, S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 861); Cerros secos y pedregosos, cerca de Guadalajara, Junio 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4404).

Euphorbia stictospora, Engelm. in Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 187; DC. Prodr. xv. 2, p. 41.

Anisophyllum senile, KL. et GARCKE, Tricocc. p. 28.

Llanuras cerca de Chihuahua, Octubre 8 de 1886 (C. G. Pringle, 1076).

Euphorbia subpeltata, Watson, n. sp.

Capas calizas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), Septiembre de 1890 (C. G. Pringle, 3272).

Euphorbia subreniforme, WATSON.

Cuestus cerca de Guadalajara, Septiembre 26 de 1889 (C. G. Pringle, 2302).

Euphorbia torrida, DC. in Atti Sc. Ital. in Tor. p. 157; DC. Prodr. xv. 2, p. 63.

Euphorbia marginata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. 61. Euphorbia bonplandii, Sweet. Hort. Brit. ed. 3, p. 600.

Dichrophyllum marginatum, KL. et GARCKE, Tricocc. p. 44. Terrenos bajos. Rascón (Est. de S. Luis Potosf), Junio 17 de 1892 (C. G. Pringle, 4112).

Euphorbia villifera, Scheele in Linnea xxii. p. 153; DC. Prodr. xv. 2, p. 45.

Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Mayo 29 de 1889 (C. G. Pringle,....)

Euphorbia sp.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 862).

Euphorbia sp.

Escuela de Agricultura, Valle de México, Mayo de 1882 (M. Urbina).

Euphorbia sp.

Rancho del Gachupin (Est. de Jalisco), Septiembre de 1887 (M. Bárcena, 428).

Euphorbia sp.

Cerro de Sta. Cruz, Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Noviembre de 1887 (M. Bárcena, 481).

Euphorbia sp.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 531).

TRIBUS IV. PHYLLANTHEÆ.

Reverchonia arenaria, GRAY.

Cerros arenosos, cerca de Samalayuca (Est. de Chihuanua), Septiembre 13 de 1888 (C. G. Pringle, 3044).

Phyllanthus acuminatus, Vant. Symb. p. 95; DC. Prodr. xv. 2, p. 381.

Phyllanthus lycioides, P. ruscoides, et P. mucronalus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. pp. 112 et 113.

Arbusto delgado de 10-20 piés de altura. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 1.º de 1891 (C. G. Pringle, 3708).

Phyllanthus galeottianus, Ballt. Adansonia 1. p. 32; DC. Prodr. xv. 2, p. 357.

Lomas pedregosas de la Barranca de Guadalajara, Septiembre 7 de 1893 (C. G. Pringle, 4443).

Phyllanthus tequilensis, Rob. et Greenm. n. sp.

Cerros de Tequila (Est. DE Jalisco), Octubre 2 de 1893 (C. G. Pringle, 5490).

Phyllanthus sp.

Llano del Carrizal, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro).

TRIBUS VI. CROTONEÆ.

- Jatropha multifida. Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 1006; DC. Prodr. xv. 2, p. 1083.
 - Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 5159).
- Jatropha spatulata, Mull. Arg. in DC. Prodr. xv. 2, p. 1081.
 - Mozinna spathulata, ORT, Dec. p. 105, t. 13.
 - Lourcira cuncifolia, CAv. Ic. Pl. v. p. 17, t. 429.
 - Curcas cuncifolia, BAILL, Etud, Gen, Euphorb, p. 315.
 - N. V. Sangre de Drago, Sangregao, Telondilla.
 - Tulpetlac, Cerro de Sta. Cruz, San Cristóbal Ecatepec (Est. DE México), Junio de 1890 (F. Altamirano).
- Croton calvescens, Wars. n. sp.
 - Cerros cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre de 1890 (C. G. Pringle, 3346).
- Croton ciliato-glandulosus, Orr. Dec. p. 15; DC. Prodr. xv. 2, p. 643.
 - Croton penicillatus, Vent. Choix p. 12, t. 12; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. h. p. 84; Cham. et Schl. in Linnæa vi. p. 361.
 - N. V. Picosa, Soliman.
 - Cañada de Querétaro, Abril de 1886 (M. Urbina); Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosi), Junio de 1892 (M. Villada); Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 6 de 1889 (C. G. Pringle, 2683).
- Croton cortesianus, Kunth, in H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. S3; DC. Prodr. xv. 2, p. 627; Cham. et Schl. in Linnæa vl. p. 361.
 - Croton trichocarpus, TORR. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 196.
 - Las Palmas (Esr. De S. Luis Porost), Junio 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3079).
- Croton elæagnoides, Wats. n. sp.
 - Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3080).
- Croton fruticulosus, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 194.

a. pallescens, Mull. Arg. in DC. Prodr. xv. 2, p. 63.

N. V. Encinilla.

Sierra de Sta. Eulalia (Est. de Chimuanua), Noviembre de 1888 (P. Soto).

Croton gracilis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 69.

a. genuina, Mull. Arg. in DC. Prodr. xv. 2, p. 691; Scm. in Linnæa xix. p. 238, excl. syn. Eschsch.

Croton dioicus, WILLD. Sp. Pl. Iv. p. 534, non Cav.

Astrogyne crotonoides, Bentil. Pl. Hartw. p. 14.

S. Luis Potosf, 1877 (G. Schaffner, 871).

Croton lobatus, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 1005; Cham. et Schl. in Linnæa v. p. 86.

Las Palmas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3081).

Croton maritimus, Walt. Fl. Carol. p. 239; DC. Prodr. xv. 2, p. 689; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 69; Linnæa v. p. 86.

Gynamblosis maritima, BAILL. Etud. Gén. Euphorb. p. 372.

Hendecandra maritima, Kl. in Erichs. Archiv. 1841, 1. p. 252. N. V. Yerba del Jabalt.

Cempoala (Est. DE Veracruz), Enero de 1891 (M. Villada).

Croton monanthogynus, Michx, ex hb. Pringle.

Cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 3 de 1889 (C. G. Pringle,....)

Croton morifolius, Willd. Sp. Pl. IV. p. 535; Müll. Arg. in Linnæa xxxIV. p. 125.

y. sphærocarpus, Müll. Arg. loc. cit. H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. 84, t. 105. (species.)

N. V. Palillo.

Guanajuato (A. Dugès)

Croton panamensis, Müll. Arg. in DC, Prodr. xv. 2, p. 546.

Cyclostigma panamense, et C. denticulatum, Kl. in Seem.

Bot. Voy. "Herald," p. 105.

Un arbusto ó pequeño árbol de 15-20 piés. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosf), Junio 5 de 1891 (С. G. Pringle, 3696).

Croton repens, Schl. in Linnæa xix. p. 237; DC. Prodr. xv. 2, p. 594.

Grietas de cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Julio 11 de 1893 (C. G. Pringle, 4426). Croton sp.

Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel). Croton sp.

Cerro de S. Cristóbal, Orizaba, Abril de 1891 (P. Toro).

Julocroton argenteus, Fr. Didrichs. Plant. Nonnull. Miss. Univ. Hafn. 1857, p. 42; DC. Prodr. xv. 2, p. 703.

Croton argenteus, Linn. Sp. Pl. cd. 1, p. 1004; Geisel. Crot. Monogr. p. 67; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 70.

Heterochlamys quinquenervia, Turcz. in Bull. Soc. Hist. Nat. Mosc. 1843, p. 62.

Julocroton quinquenervius, BALL. Etud. Gen. Euphorb. p. 376. Lugares áridos. Rascón (Est. de S. Luis Potosí), Julio 28 de 1891 (C. G. Pringle, 3785).

Argythamnia humilis, Müll. Arg.

Llanuras arenosas. Laredo (Texas), Julio 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2864).

Argythamnia schiedeana, Müll. Arg. in Linnæa xxxiv. p. 150, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 745.

B. minor, Müll. Arg. loc. cit.

Capas calizas. Sierra de la Silla (Est. de Nuevo León), Julio 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2514).

Caperonia palustris, Sr. Hu. Pl. Remarq. p. 245; DC. Prodr. xv. 2, p. 754.

Croton castaneæfolius, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 70, non Linn.

Lepidococca sieberi, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1848, p. 589.
Androphoranthus glandulosus, Karst. Fl. Columb. п. р. 15, t. 108.

Crece en el agua. Saucillo (Est. DE Jalisco), Octubre 11 de 1893 (C. G. Pringle, 5459).

Manihot pringlei, Wats. n. sp.

Cerros pedregosos, Las Canoas (Est. DE S. Luis Potost), Agosto 14 de 1891 (C. G. Pringle, 3826).

Bernardia interrupta, Müll. Arg. in Linnæa xxxiv. p. 171, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 916.

Вот,---81,

Acalipha interrupta, Scul. in Linnæa vu. p. 386.

Adelia dodecandra, Sessé ex Steud. Nomencl. Bot.

Alevia leptostachya, BAILL. Etud. Gen. Euphorb. p. 509.

Arbusto de 15 piés de altura. Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Potosi), Junio 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3084).

Bernardia mexicana, Müll. Arg. in Linnæa xxxiv. p. 171, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 916.

var. Arbusto de 10-15 piés. Capas calizas, Las Canoas (Est. DE S. Luis Potosi), Junio 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3700).

Acalipha dissitifiora, WATS. n. sp.

Capas calizas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potost), Julio 2 de 1890 (C. G. Pringle, 3083).

Acalipha diversifolia, Jaco. Hort. Scheenb. 11. p. 63, t. 244.

B. leptostachya, MULL. Arg. in DC. Prodr. xv. 2, p. 854; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. 96. (species.)

Acalipha billbergiana, et A. panamensis, Kl. in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 101.

Acalipha leptostachya, β. genuina, Müll. Arg. in Linnæa xxxıv. p. 34.

De 3-5 piés. Cañón de Tomellín, á 2,500 piés (Est. de Oaxaca), Mayo 17 de 1894 (C. G. Pringle, 4633).

Acalipha erubescens, Rob. et Greenm. n. sp.

Cerros calizos, cerca de Villar (Est. de S. Luis Potosí), Septiembre 14 de 1893 (C. G. Pringle, 4538).

Acalipha flavescens, WATS. n. sp.

Arbusto de 5-10 piés. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 14 de 1890 (C. G. Pringle, 3073).

Acalipha fournieri, Müll. Arg. in Linnæa xxxiv. p. 162, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 838.

Sitios agrestes y pedregosos de las barrancas cerca de S. Márcos (Est. de Jalisco), Junio 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4380).

Acalipha glandulifera, Rob. et Greenm. n. sp.

De 5-8 pies. Cañadas húmedas, Sierra de S. Felipe, á 7,500 pies (Est. de Oaxaca), Agosto 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4789).

Acalipha hypogæa, WATS.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Julio 28 de 1893 (C. G. Pringle, 4626).

Acalipha lindheimeri, MULL. Arg. in Linuaea xxxiv. p. 47, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 875.

Acalipha phleoides, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 199, non Cav.

Guadalajara, Octubre de 1886 (M. Bárcena,.....); Barranca cerca de Guadalajara, Julio 6 de 1888 (C. G. Pringle, 2901).

Acalipha longipes, Wars. n. sp.

Capas calizas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 25 de 1890 (C. G. Pringle, 3082).

Acalipha multispicata, Wats. n. sp.

Cuestas sombrías y frías, cerca de Guadalajara, Julio 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4458).

Acalipha neo-mexicana, Mull. Arg.

Valles (Est. de Chihuahua), Septiembre 18 de 1885 (C. G. Pringle, 322).

Acalipha polystachya, Jaco. Hort. Scheenb. 11. p. 64, t. 246; DC. Prodr. xv. 2, p. 841.

En los plantíos de Plátano, barranca cerca de Guadalajara, Julio 29 de 1893 (C. G. Pringle, 4470).

Acalipha purpurascens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. n. p. 97.

a. gemuina, Müll. Arg. in Linnea xxxiv. p. 52, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 884.

Cerros secos y granticos, Las Sedas, a 6,000 piés (Est. DE OAXACA), Octubre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4926).

Acalipha rivinæfolia,

Cerro de las Campanas (Est. de Querétaro), Noviembre de 1886 (M. Urbina).

Acalipha schiedeana, Schl. in Linnaa vii. p. 384.

Cerros de Tequila (Est. de Jalisco), Julio 3 de 1892 (C. G. Pringle, 5480).

Acalipha subviscida, WATSON.

De 2-3 piés. Sitios sombríos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4517).

Acalipha sp.

S. Diego, Sur de S. Luis Potosí, Diciembre de 1883 (D. Cano).

Adelia barbinervis, Cham. et Schl. in Linnæa vi. p. 362. Ricinella barbinervis, Müll. Arg. in Linnæa xxxiv. p. 154, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 730. Un pequeño árbol. Valle de Micos (Est. de S. Luis Potosí), Noviembre 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3924).

Stillingia torreyana, WATSON.

Mesas, García (Est. de Nuevo León), Mayo 16 de 1889 (C. G. Pringle, 2504).

Stillingia zelayensis, Müll. Arg. in Linnæa xxxII. p. 87, et in DC. Prodr. xv. 2, p. 1159.

Sapium zelayense, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 65. Atotonilco el Grande (Est. de Hidal.go).

Sebastiania pringlei, Watson, n. sp.

Gargantas pedregosas. Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosi), Julio 12 de 1890 (C. G. Pringle, 3136).

ORDO CLXII. URTICACEÆ.

TRIBUS II. CELTIDEÆ.

Celtis tala, Gillies in Ann. Sc. Nat. ser. 3. x. p. 310; Plancii. in DC. Prodr. xvii. p. 190?

Celtis pallida, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 203.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosí), Junio de

1892 (M. Villada).

TRIBUS IV. MOREÆ.

Dorstenia contrayerba, Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 176; DC. Prodr. xvii. p. 259; Jaco. Ic. Pl. Rar. t. 614; Descour. Fl. Antill. iii. t. 207; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 45.

Dorstenia houstoui, Lodd. Bot. Cab. t. 1005, non Linn. N. V. Barbudilla.

En lugares sombríos y húmedos, Valle de Ahualulco (Est. DE JALISCO), Agosto de 1886 (M. Bárcena, 534).

6. houstoni, Bureau in DC. Prodr. xvii. p. 259; Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 176 (species); Bot. Mag. t. 2017.

Soconusco (Est. de Chiapas), Febrero de 1883 (R. Montes de Oca).

Dorstenia drakena, Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 176; DC. Prodr. xvii. p. 260.

Dorstenia mexicana, Bentu. Pl. Hartw. p. 51.

Zapotlán (Est. DE Jalisco), Mayo 25 de 1893 (C. G. Pringle,....)

Dorstenia excentrica, Moric. Pl. Nouv. d'Am. p. 92, t. 59; DC. Prodr. xvii. p. 263.

N. V. Barbudilla & Contrayerba.

Vive entre las piedras, sobre las lomas; es más aromática que la D. contrayerba, Linn.

Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Agosto de 1886 (M. Bárcena, 535).

TRIBUS V. ARTOCARPEÆ.

Ficus bonplandiana, Mio. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ut. p. 298, n. 38.

Urostigma bonplandiana, Liebn. in K. Dansk, Vidensk. Selsk. Skrift. ser. 5, 11. p. 323.

Ficus obtusifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 49, nec alior. N. V. Amate blanco.

Cuernavaca (Est. de Morelos), Julio de 1892 (S. Gámez); Al principio epífita en las copas de las Palmeras, etc.; después enraizando en el suelo y llegando á ser un gran árbol. Micos (Est. de S. Luis Potosí), Diciembre 9 de 1891 (C. G. Pringle, 3977).

Ficus fasciculata, WATSON n. sp.

Un gran árbol con la corteza de un verde claro y lisa; fruto maduro de media pulgada de diámetro, dulce y comestible. Cerca de Guadalajara, Septiembre 30 de 1891 (C. G. Pringle, 3890).

Ficus guadalajarana, Wats. n. sp.

Cerca de Guadalajara, Septiembre 23 de 1891 (C. G. Pringle, 3890).

Ficus jaliscana, WATSON.

Árbol de talla mediana, enraizando en las grietas de los peñascos; corteza lisa y amarillenta. Barranca cerca de Guadalajara, Noviembre 10 de 1892 (C. G. Pringle, 4336). Enraiza principalmente en las grietas de los peñascos secos,

y llega á ser un gran árbol. Cerca de Guadalajara, Septiembre 23 de 1891 (C. G. Pringle, 3872).

Ficus petiolaris, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 49; Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 111. p. 229, n. 97.

Urostigma petiolare, Mio. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. p. 527. N. V. Amate amarillo.

Cuernavaca (Est. de Morelos), Julio de 1892 (S. Gómes).

Ficus pringlei, WATS, n. Sp.

Arbol de pequeña 6 mediana talla. Fruto comestible. Sitios agrestes y pedregosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3865).

Ficus tecolutensis, Mio. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. p. 299, n. 94.

Urostigma tecolutensis, Liebm. in K. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. ser. 5. ii. p. 324.

N. V. Amate prieto.

Cuernavaca (Est. de Morelos), Julio de 1892 (S. Gómes); Receptáculos sésiles; un gran árbol. Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3887).

Ficus sp.

Sitios agrestes y pedregosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Octubre 9 de 1891 (C. G. Pringle, 3883).

Castilloa elastica, Cerv. in Gaz. Lit. de México, 1794; Ann. Sc. Nat. ser. 3, viii. p. 136, t. 5, figg. 142–148; Collins, Rep. on Caoutch. of Comm. t. 2.

N. V. Hule.

Motzorongo (Est. de Veracruz), Julio de 1891 (F. Altamirano).

TRIBUS VII. URTICEÆ.

Urtica dioica, LINN. Sp. Pl. p. 1396.

var. angustifolia, Wedd. in DC. Prodr. xvi. 1, p. 52; Ledeb. Fl. Alt. vi. p. 240. (species.)

Urtica aquatica, Liebm. in K. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. ser. 5, II. p. 391. (reprint. p. 7.)

Toluca (Est. de México), Agosto 15 de 1892 (C. G. Pringle, 5333).

Urtica mexicana, Liebm. in K. Dansk, Vidensk, Selsk, Skrift, ser. 5, 11, p. 291; DC, Prodr. xvi. 1, p. 58.

N. V. Yesgos.

Tlalpam, Valle de México, Septiembre de 1891 (M. Urbina). Urtica nivea, Bentu.

Bæhmeria nivea, Linn.

N. V. Ramie, Ramio; cultivado.

Escuela de Agricultura, Valle de México, Agosto de 1888 (M. Urbina); Tlalmanalco, á 2,400 metros (Est. de México), Mayo de 1890 (F. Altamirano).

Urtica spiralis, BL. Mus. Bot. Lugd. Bat. 11. p. 152; DC. Prodr. xvi. 1, p. 46.

var? ligulata, WEDD.

De 4-6 piés. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. DE OANA-CA), Agosto 25 de 1894 (C. G. Pringle, 4821).

Urtica sp.

Cerro del Tepeyac, Valle de México, Julio de 1890 (M. Villada). Urtica sp.

N. V. Ortiga.

Cerro de S. Cristóbal, Orizaba (Est. de Veracruz), Marzo de 1891 (P. Toro).

Urera sp.

N. V. Mala muger.

Estado de Michoacán, Agosto de 1892 (M. Galán).

Urera caracasana, GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 154; DC. Prodr. xvi. 1, p. 89.

Urtica caracasana, Jaco. Hort. Scheenb. III. p. 71, t. 386.

Árbol pequeño. Barranca de Beltrán (Est. DE Jalisco), Junio 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4385).

Pilea glabra, Watson n. sp.

Capas calizas en la sombra. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3741).

Pilea mexicana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. ser. 3, xviii. p. 214. Monogr. Urtic. p. 239; DC. Prodr. xvi. 1, p. 146.

En los montes Morales, cerca de S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 852).

Pilea microphylla, Liebm. in K. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. ser. 5, 11. p. 296 (reprint. p. 12); DC. Prodr. xvi. 1, p. 105.

Pilea muscosa, Lindl. Collect. t. 4.

Parietaria microphylla, Linn. Sp. Pl. p. 1492.

var. longifolia, WEDD.

Lugares secos. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3097).

Bæhmeria caudata, Sw. Prodr. p. 34, et Fl. Ind. Occ. p. 279;
DC. Prodr. xvi. 1, p. 201; Mart. Fl. Bras. iv. 1, t. 64 et 65;
BL. Mus. Bot. Lugd. Bat. n. p. 215, t. 56.

Bæhmeria flagelliformis, Liebn. in K. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. ser. 5, 2, p. 310 (reprint. p. 26).

Bæhmeria ampullacea, et B. petiolaris, H. B. K. Nov. Gen. et

Sp. u. pp. 35 et 36. Por las corrientes, cerca de Orizaba, á 4,000 piés (Est. de Ve-

RACRUZ), Enero 19 de 1895 (C. G. Pringle, 6105).

Pouzolzia palmeri, WATS.

Barranca cerca de Guadalajara, Mayo 23 de 1889 (C. G. Pringle,)

Myriocarpa brachystachys, WATS.

Barranca cerca de Guadalajara, á 4,000 piés. Mayo 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4735),

Myriocarpa longipes, Liebm. in K. Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. ser. 5, n. p. 306 (reprint. p. 22); DC. Prodr. xvi.;1, p. 235. De 15-20 piés. En las barrancas, cerca de Orizaba, á 4,000 piés (Est. de Veracruz), Enero 18 de 1895 (C. G. Pringle,

6093).

Phenax mexicanus, Wedd. Monog. Urtic. p. 500; DC. Prodr xvi. 1, p. 235.

Phenax gaudichaudianus, WEDD. in Ann. Sc. Nat. serie 4, 1. p. 193.

Phenax galeottianus, BL. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 227.

De 5-8 piés. Cañada de Cuicatlán, á 2,000 piés (Est DE OAXACA), Noviembre 7 de 1894 (C. G. Pringle, 6037).

Parietaria floridana, Nutt.

En lugares sombríos. Montes de Sta. Eulalia (Est. de Снінианиа), Marzo 29 de 1885 (С. G. Pringle, 90). Parietaria pennsylvanica, Mühlenb. Cat. Pl. Am.; DC. Prodr. xvi. 1, p. 235. (varietates.)

Parictaria orizabæ, et P. linguæfolia, Liebm. in K. Dansk. Vidensk. Scrift. ser. 5. n. p. 316.

En los Montes Morales, cerca de S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 850).

Ordo CLXIII. PLATANACEÆ.

Platanus mexicana, Moric. in Bull. Ferr. Bot. 1830, p. 79, et Pl. Nouv. d'Amér. p. 39, t. 26; DC. Prodr. xvi. 2, p. 160.

N. V. Álamo blanco.

Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Por las corrientes. Montañas cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2678).

ORDO CLXV. JUGLANDEÆ.

Carya olivæformis, Nutt. Gen. N. Am. Pl. 11. p. 221; DC. Prodr. xvi. 2, p. 144.

Juglans olivæformis, Marsh. Arbust. Amer. p. 105; Michx. Hist. Arbr. Forest. de l'Amér. Sept. 1. p. 173, t. 3; Michx. N. Amer. Sylv. 1. p. 167, t. 32.

Carya tetraptera, Liebn. in Vidensk. Meddel. 1850, p. 80.

N. V. Nuez encarcelada.

Mineral de Guadalcázar (Est. de S. Luis Potosi), Junio de 1892 (M. Villada).

Juglans mexicana, Watson, n. sp.

N. V. Nuez meca.

Cerros. Paso de S. José (Est. DE S. Luis Potosí), Octubre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3322).

ORDO CLXVIII, CUPULIFERÆ.

TRIBUS I. BETULÆ.

Alnus acuminata, H. B. K. Nov, Gen. et Sp. II. p. 20; DC. Prodr. xvi. 2, p. 183.

N. V. Aile.

Tlalpam, Valle de México, Septiembre de 1881 (M. Urbina);
Por los arroyos, Valle de México, Diciembre 9 de 1892 (C. G. Pringle, 4361).

Alnus sp.

N. V. Aile.

Tlalpam, Valle de México, Abril de 1882 (M. Urbina).

Alnus sp.

N. V. Aile.

Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

TRIBUS II. CORYLEÆ.

Carpinus americanus, MICHX.

var. tropicalis, Donnel Smith.

Por las corrientes, cerca de Orizaba, á 4,500 piés (Est. de Ve-RACRUZ), Febrero 7 de 1895 (C. G. Pringle, 6131).

TRIBUS III. QUERCINEÆ.

Quercus calophylla, Cham. et Schl. in Linnæa v. p. 79; DC. Prodr. xvi. 2, p. 65; Liebm. Cbênes de l'Amér. Trop. t. B. et t. 1.

Quercus alamo, Benth. Pl. Hartw. pp. 55 et 348.

Quercus intermedia, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x (reprint. p. 15).

Quercus acuminata, MART. et GAL. loc. cit. p. 10.

Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 25 de 1891 (C. G. Pringle, 3955).

- Quercus castanea, Nee in Anal. Cienc. Nat. III. p. 276; DC. Prodr. xvi. 2, p. 72; Liebm. Chênes de l'Am. Trop. t. 7, fig. 3, et t. 8.
 - Quercus mucronata, Willo, Sp. Pl. iv. p. 436.
 - Quercus tristis, Liebm. in Overs K. Dansk. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1854, p. 174, et Chênes de l'Amér. Trop. p. 23.
 - e. mexicana, A. DC 10e. cit.; Humb. et Bonpl. Pl. Æquin. II. p. 35, t. 82. (species.)
 - Barranca del Zopilote (Est. de México), Julio de 1891 (M. Villada).
- Quercus crassifolia, Humb. et Bonpl. Pl. Æquin. 11. p. 49, t. 91; DC. Prodr. xvi. 2, p. 56; Liebm. Chênes de l'Amér. Trop. t. 18, figg. 1-4.
 - Quercus rugosa, NEE in Anal. Cienc. Nat. 111. p. 275?
 - Quercus spinulosa, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint. p. 11.)
 - En los montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 897).
- Quercus crassipes, Humb. et Bonpl. Pl. Æquin. u. p. 37, t. 83; DC. Prodr. xvi. 2, p. 73.
 - Quercus mexicana, Bentu. Pl. Hartw. p. 56, non Humb. et Bonpl.
 - Cerros cerca de Salomé, á 5,500 piés (Est. De Oaxaca), Noviembre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 6029).
- Quercus glabrescens, Bentu. Pl. Hartw. p. 56, ct p. 348, excl. syn; DC. Prodr xyl. 2, p. 34.
 - De 10-30 piés. Sierra de S. Felipe, á 6,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 27 de 1894 (C. G. Pringle, 4843).
- Quercus grahami, Benth. Pl. Hartw. p. 57; DC. Prodr. xvi. 2, p. 78.
 - Sierras cerea de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2393).
- Quercus magnoliæfolia, Nee in Anal. Cienc. Nat. 111. p. 268; DC. Prodr. xvi. 2, p. 26.
 - Hac. de Tamasopo (Est. DE S. Luis Porosí), Diciembre 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3969).
- Quercus microphylla, Nee in Anal. Cienc. Nat. 111. p. 264; DC. Prodr. xvi. 2, p. 35.
 - De 2 á 3 piés de altura. Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Mayo 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3701).

Quercus nitens, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x (reprint. p. 9); DC. Prodr. xvi. 2, p. 68; Liebm. Chênes de l'Amér. Trop. t, ii, figg. 2-6.

Quercus commutata, Liebu, in Overs, K. Dansk, Vidensk, Selsk, Forhandl, 1854, p. 177, pro parte.

Sierra de S. Felipe, de 8-10,000 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 24 de 1894 (C. G. Pringle, 4913).

Quercus polymorpha, Cham. et Schl. in Linnea v. p. 78; DC. Prodr. xvi. 2, p. 28; Liebm. Chênes de l'Amér. Trop. p. 38. Quercus petiolaris, Benth. Pl. Hartw. pp. 55 et 348.

Quercus varians, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint, p. 7.)

Quercus tuberculata, Liebm. in Overs. K. Dansk. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1854, p. 181; Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 332.

Montañas cerea del Paso de S. José (Est. de S. Luis Ротоsí), Oetubre 11 de 1890 (С. G. Pringle, 3325).

Quercus pulchella, Humb. et Bonpl. Pl. Æquin. n. p. 44, t. 88; DC. Prodr. xvi. 2, p. 34.

Entre Tultenango, Tepetongo y Mineral del Oro (Est. de México), Mayo 4 de 1891 (M. Villada).

Querous reticulata, Humb. et Bonpl., Pl. Æquin. n. p. 40, t. 86; DC. Prodr. xvi. 2, p. 33; Liebn. Chênes. de l'Amér. Trop. t. 34, figg. 10-16 (var. crassifolia), et t. 35, figg. 15-22.

Quercus spicata, Humb. et Bonpl. Pl. Æquin. II. p. 46, t. 89; Liebm. loc. cit. t. 35, figg. 1-14.

Quercus decipiens, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (reprit p. 7.)

N. V. Encina de miel.

Cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 896); Entre Tultenango, Tulpetlac y Mineral del Oro (Est. de México), Mayo 4 de 1891 (M. Villada).

Quercus sideroxyla, Humb. et Bonpl. Pl. Æquin. II. p. 39, t. 85; DC. Prodr. xvi. 2, p. 58.

Entre Tultenango, Tepetongo y Mineral del Oro (Est. DE México), Mayo de 1891 (M. Villada).

Quercus undulata, TORR.

var. grisea, Engelm.

Cerros cerea de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Julio 18 de 1892 (C. G. Pringle, 4116).

Quercus sp.

Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. DE Coaliula), Mayo 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3702).

Quercus sp.

Entre Tultenango, Tepetongo y Mineral del Oro (Est. DE México), Mayo 4 de 1891 (M. Villada).

Castanea vulgaris, Lam. Dict. 1. p. 708; A. DC. Prodr. xvi. 2, p. 114.

N. V. Castaño.

Cultivado en Sta, Cruz Tlalmanalco (Est. DE México), Mayo de 1890 (F. Altamirano).

ORDO CLXIX. SALICINEÆ.

Salix bonplandiana, Kuntu. in H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 24, tt. 101 et 102; DC. Prodr. xvi. 2, p. 200.

N. V. Sauce.

Atotonilco el Grande (Est. De Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Cerca de S. Luís Potosí, 1877 (G. Schaffner, 895); Lugares húmedos, cerca de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Noviembre 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3376).

Salix hartwegi, Benth. Pl. Hartw. p. 52.

N. V. Saucillo.

S. Francisco Acuautla, á 2,500 metros, N. E. de Ayotla (Est. DE México), Abril de 1890 (F. Altamirano).

Salix irrorata, Anders.

Río de Sacramento (Est. de Chihuahua), Marzo 29 de 1886 (C. G. Pringle, 709).

Salix longifolia, MUHLENB.

Cerca del Río, Paso del Norte (Est. DE CHIHUAHUA), Mayo 4 de 1885 (C. G. Pringle,....)

Salix nigra, Marsh. Arbust. Amér. p. 293.

Paso del Norte (Est. de Chihuahua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle,)

Salix taxifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. II. p. 22; DC. Prodr. xvi. 2, p. 215.

Salix microphylla, Cham. et Schl. in Linnæa vi. p. 354; Hook. et Arn. Bot. Beech. Vov. p. 310, t. 70.

En Morales, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 893): Cañadas de las faldas de la Sierra Madre (Est. de Chinuahua), Septiembre 20 de 1888 (C. G. Pringle, 3041).

Salix sp.

En los montes de S. Miguelito (Est. de S. Luis Potosí), 1877 (G. Schaffner, 893).

Populus alba, LINN.

En lugares cultivados, cerca de S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 892); Barranca de Río Grande, cerca de Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Populus fremonti, Watson, var. (?) Wislizeni, Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 157.

N. V. Chopo.

En lugares eultivados, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 891); Paso del Norte (Est. de Chiudanua), Abril 25 de 1893 (C. G. Pringle.....)

MONOCOTILEDONES.

Ordo CLXXV, ORCHIDEÆ.

Tribus I. EPIDENDREÆ.

Microstylis corymbosa, Watson.

Lugares húmedos, cerca de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Agosto 3 de 1892 (C. G. Pringle, 4169).

Microstylis crispifolia, Robe, f. Beitr. Orch. Centr. Am. p. 100.
Cerros de Guadalajara, Julio 18 de 1893 (C. G. Pringle, . . .)

Microstylis fastigiata, RCHB. f. in Linnæa xxII. p. 834.

Dienia majanthemifolia, Rcus, f. in Linnæa xix, p. 369.

Malaxis majanthemifolia, A. Ricu, et Gal. in Ann. Sc. Nat. serie 3, in. p. 18.

Bosques fértiles. Sierra de S. Felipe, de 8,500-10,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4807).

Microstylis montana, ROTHR.

Nevado de Toluca (Est. DE MÉXICO), Septiembre 6 de 1892 (C. G. Pringle, 5282); Pátzcuaro (Est. DE MICHOACÁN), Octubre 8 de 1892 (C. G. Pringle, 5281).

Microstylis myurus, Rchb. f. in Walp. Ann. vi. p. 207. Dienia myurus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl. p. 23.

Pedilea, Lindl. Orchid. Sceletos, p. 21, n. 144, cum icone.

Lugares abiertos y húmedos, Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4810).

Microstylis tenuis, Warson n. sp.

Praderas bajas, Flor de María (Est. de México), Julio 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3186).

Liparis galeottiana? Hemsl. ubi?

Cerros graníticos secos, cerca de Guadalajara, Agosto 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4512).

Corallorhiza ehrenbergii, Rehb. f. in Linnaca xxii. p. 833; WALP. Ann. III. p. 526.

Bajo los pinos. Sierra de S. Felipe, de 9,500-10,000 piés (Est. DE OAXAEA), Junio de 1894 (C. G. Pringle, 4723).

- Hexalectris aphylla, Benth. in Journ. Linn. Soc. xvII. p. 296.

 Bletia aphylla, Nutt. Gen. N. Am. II. p. 194; Blume, Orchid.
 Jav. p. 18, t. 6.
 - Parasita sobre las paredes. Cerros eerea de Guadalajara, Agosto 23 de 1893 (C. G. Pringle,)
- Bletia campanulata, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. fase. II. Oreh. Opuse. p. 17; Bentil. Pl. Hartw. p. 72; Bonplandia. 1854, p. 22; Walp. Ann. vi. p. 442.

Baneos fríos. Montañas cerea de Pátzcuaro (Est. de Michoaeán), Noviembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3943).

Bletia fulgens, Reнв. f. in Bonplandia, 1855 p. 221; Walp. Ann. vi. p. 441.

Sitios fríos, cerros eerca de Guadalajara, Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4465).

Bletia palmeri. WATSON.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Julio de 1893 (C. G. Pringle, 4457).

Bletia roezlii, Rchb. f. in Linnæa xli. p. 7.

Selvas pedregosas, cerea de Guadalajara, Agosto 29 de 1893 (C. G. Pringle, 4513).

Bletia secunda, Lindl. Bot. Reg. 1840, Misc. n. 120; Walp. Ann. vi. p. 440.

Eulophia dilatata, Lindl. in Ann. Nat. Hist. 1842, x. p. 184. Lugares fríos de las eañadas, eerea de Guadalajara, Julio 26 de 1893 (C. G. Pringle, 4441).

- Epidendrum cochleatum, Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 1351; Lindl. Fol. Orch. n. 128; Walp. Ann. vi. p. 359; Jacq. Ic. Pl. Rar. III. t. 605; Bot. Mag. t. 572; Rchb. f. Beitr. Orch. Centr. Amer. pp. 52 et 83.
 - Anacheilium cochleatum, Hoffmansegg in Linnæa xvi. Litt-Ber. p. 229.
 - Sobre los árboles y las rocas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 23 de 1891 (C. G. Pringle, 5009).

Epidendrum radiatum, Lindl. Bot. Reg. 1841, Misc. p. 58, et 1844, t. 45; Fol. Orch. n. 130; Walp. Ann. vi. p. 359.

Epidendrum marginatum, KL. in Link. Kl. et Otto Ic. Pl. Rar. Hort. Bot. Berol. p. 90, t. 36.

Epidendrum bracteolatum, Presl. Reliq. Hænk. 1. p. 100?

Sobre los árboles Rascón (Est. de S. Luis Potosí), Junio 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4109).

Epidendrum radicans, Pav. in Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl. p. 104, et Fol. Orch. n. 220; Walp. Ann. vl. p. 390; RCHB. f. Beitr. Orch. Centr. Am. p. 54.

Epidendrum rhizophorum, BATEM. in Bot. Reg. 1838, Misc. p. 8.

Tallos rastreros sobre sitios agrestes y cespitosos, cerca de Orizaba, á 3,000 piés (Est. de Veracruz), Enero 29 de 1895 (C. G. Pringle, 6126).

Epidendrum rigidum, Jaco. Sel. Stirp. Am. p. 222, t. 134; Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl. p. 110, et Fol. Orch. n. 239; Walp. Ann. vi. p. 400; Hook. Ic. Pl. t. 314.

Sobre los árboles. Rascón (Est. de S. Luis Potosí), Junio 21 de 1891 (C. G. Pringle, 5302).

Epidendrum vandifolium, Lindl. in Journ. Hort. Soc. Lond. iv. p. 269, et Fl. Orch. p. 211; Walf. Ann. vi. p. 387.

Sobre las rocas, Cerros cerca de Guadalajara, Junio 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4395).

Epidendrum verrucosum, Lindl. ubi?

Sobre los árboles. Barranca de Beltrán (Est. de Jalisco), Junio 8 de 1893 (C. G. Pringle, 4394).

Epidendrum sp.

Sobre las encinas. Montañas cerca del Lago de Pátzenaro (Est. de Michoacán), Julio 16 de 1892 (C. G. Pringle, 4164).

Lælia furfuracea, Lindl. Bot. Reg. 1839, t. 26, et 1842 sub. t. 62; Bot. Mag. t. 3810.

Bletia furfuracea, Rchв. f. in Walp. Ann. vi. p. 428, et Xenia Orch. n. p. 56.

En los árboles. Cerca de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Noviembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 5326); Sobre las encinas. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. DE OAXACA), Noviembre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 6086).

TRIBUS II. VANDEÆ.

- Govenia brevilabris, RCHB. f. in Walp. Ann. vr. p. 619.

 Eucnemis brevilabris, LINDL. Gen. et Sp. Orch. Pl. p. 161.

 Sierra de S. Felipe (Est. de Oaxaca), á 8-9,000 piés. Junio de 1894 (C. G. Pringle, 4711).
- Govenia elliptica, Watson n. sp.

 Cañadas frías y fértiles. Montañas cerca de Monterrey (Est. DE Nuevo León), Junio de 1889 (C. G. Pringle, 2797).
- Maxillaria obscura, Lind. et Rchb, f. Beitr. Orch. Centr. Am. p. 31; Ref. Bot. п. t. 78.

 Maxillaria cucullata, Ноок. Bot. Mag. 3945, non Lindl. Sobre las encinas. Sierra de S. Felipe, á 8,500 piés (Est. de

Oaxaca), Junio 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4684).

- Odontoglossum cervantesii, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. II, Orch. Opusc. p. 34; Lindl. Fol. Orch. n. 25; Bot. Rep. 1845, t. 36; Walp. Ann. vi. p. 834; Lindl. Paxt. Fl. Gard. I. t. 15.
 - Odontoglossum membranaceum, Lindl., Sert, Orch. sub. t. 25; Bot. Reg. 1846, t. 34; Ann. Gand. t. 10; Bot. Mag. t, 4923, var. roseum.
 - Sobre las encinas. Sierra de S. Felipe, de 8-9,000 piés (Est. DE OAXACA), Diciembre 28 de 1894 (C. G. Pringle), 6099).
- Odontoglossum maculatum, Llav. et Lex. Nov. Gen. Descr. II, Orch. Opusc. p. 35; Lindl. Fol. Orch. n. 11; Bot. Reg. 1840, t. 30; Walp. Ann. vi. p. 829; Pescatorea, t. 28.
 - Sobre las encinas. Sierra de S. Felipe, á 8,500 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre de 1894 (C. G. Pringle, 6098).

TRIBUS III. NEOTTIEÆ.

Cranichis schaffneri, RCHB. f. in Bonplandia, 1855, p. 238. Cerros de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3579). Spiranthes aurantiacus, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 300.

Stenorrhynchus aurantiacus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl. p.

479; Benth. Pl. Hartw. p. 92.

Neottia aurantiaca, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. II, Orch. Opusc. p. 2.

Lugares cespitosos y fríos de los cerros, cerca de Guadalajara, Agosto 28 de 1893 (C. G. Pringle, 4525).

var. acuminata, Rob. et Sea. n. var.

En las praderas bajas. Valle de Toluca (Est. de México), Septiembre 13 de 1892 (C. G. Pringle, 4280).

Spiranthes cinnabarinus, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 300.

Stenorrhydchus cinnabarinus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl.
p. 479; Bot. Reg. 1847, t. 65.

Neottia cinnabarina, Llav. et Lex. Nov. Veg. Descr. 11, Orch. Opusc. p. 3.

Capas calizas, Paso de Carneros (Est. DE Coahuila), Septiembre 27 de 1890 (C. G. Pringle,....)

Spiranthes eriophora, Rob. et Greenm. n. sp.

Bosques de pinos. Sierra de S. Felipe, á 9,000 piés (Est. DE OAXACA), Mayo 31 de 1894 (C. G. Pringle, 4682).

Spiranthes graminea, Lindl. in Pl. Hartw. p. 25.
Agosto de 1892 (C. G. Pringle, 4192).

Spiranthes jaliscana, WATSON.

Cerca de Guadalajara, Junio 23 de 1892 (C. G. Pringle, 5276.)

Spiranthes pauciflora, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 302.

Stenorrhynchus pauciflorus, RCHB. f. in Bonplandia, 1856,
p. 211.

Sitios agrestes, cespitosos y fríos. Nevado de Toluca, á 10,000 pies (Est. de México), Septiembre 25 de 1892 (C. G. Pringle, 4296).

Spiranthes polyantha, RCHB. f. in Linnæa xvIII. p. 408.

Cerro de Ixtapalapan, Valle de México, Mayo 7 de 1893 (C. G. Pringle, 4409).

Spiranthes pringlei, WATSON.

Lugares cespitosos y húmedos, cerca de Guadalajara, Junio 27 de 1892 (C. G. Pringle, 4113).

Arethusa grandiflora, WATSON.

Bancos húmedos. Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Octubre 7 de 1892 (C. G. Pringle,....)

Pogonia mexicana, Watson n. sp.

Lugares fértiles de capas calizas. Cañon de Tamasopo (Est. DE S. Luis Porosí), Julio 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3787).

TRIBUS IV. OPHRYDEÆ.

Habenaria brachyceras, Lindl.

Laderas cespitosas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Agosto 29 de 1891 (C. G. Pringle, 3897).

Habenaria brevifolia, GREENM. n. sp.

Sierra de S. Felipe, á 8,500 piés. Junio 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 5758).

Habenaria clypeata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl. p. 311; et in Benth. Pl. Hartw. pp. 52 et 53.

Flores blancas aromáticas. Lugares cespitosos y húmedos, cerca de Guadalajara, Agosto de 1893 (C. G. Pringle, 4510).

Habenaria crassicornis, Lindl. Gen. et Sp. Orch. Pl. p. 311.

Suelo frio, bajo los pinos y los robles. Cerros cerca de Guadalajara, Septiembre 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 4511).

Habenaria diffusa, A. Rich. et Gal. in Ann. Sc. Nat. série 3, m. p. 28.

Cerros pedregosos y húmedos. Coapa (Esr. de Michoacán), Agosto 8 de 1892 (C. G. Pringle, 4189).

Habenaria filifera, Watson n. sp.

Lugares cespitosos y húmedos. Flor de Maria (Est. de México), Julio 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3187); Suelo frío, bajo los pinos y las encinas. Cerros cerca de Guadalajara, Septiembre 4 de 1893 (C. G. Pringle, 4509).

Habenaria flexuosa, Lindl. Gen. & Sp. Orch. Pl. p. 311.

Sierra de S. Felipe, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4806).

Habenaria jaliscana, WATSON.

Suelo frio, bajo los pinos y las encinas, cerca de Guadalajara, Septiembre 4 de 1893 (C. G. Pringle, 4508).

Habenaria pringlei, Rob. n. sp.

En los pantanos. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 7 de 1891 (C. G. Pringle, 3823).

Habenaria spathacea, A. Rich. et Gal. in Ann. Sc. Nat. série 3, m. p. 29.

Sitios agrestes y eespitosos de eerros pedregosos, cerea de Guadalajara, Agosto 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4507); Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Agosto 5 de 1891 (C. G. Pringle, 5024).

Habenaria thurberi, GRAY.

Nevado de Toluca, Septiembre 7 de 1892 (C. G. Pringle, 5253).

TRIBUS V. CYPRIPEDIEÆ.

Cipripedium irapeanum, LLAV. et LEX. Nov. Veg. Descr. II, Orch. Opusc. p. 10; LINDL. Gen. et Sp. Orch. Pl. p. 528; Bot. Reg. 1846, p. 58.

Cypripedium molle, Lindl, in Benth. Pl. Hartw. p. 72.

Cypripedium lexarza, Scheidw in Otto et Dietr. Allg. Gart. Zeit. 1839, p. 265?

Cypripedium splendidum, Scheidw loe. cit. p. 266?

Laderas cespitosas y frías, cerca de Guadalajara, Julio 28 de 1893 (C. G. Pringle, 4440).

Ordo CLXXVI. ZINGIBERACEÆ.

TRIBUS III. CANNEÆ.

Canna indica, Linn.

N. V. Platanillo.

Arroyo de Enmedio (Est. DE Jalisco), Julio de 1886 (M. Bárcena, 702).

ORDO CLXXVII. MUSACEÆ.

Strelitzia reginæ, Air.

Planta cultivada, originaria de África.

Lagos (Est. de Guanajuato), Diciembre de 1888 (A. Dugês).

ORDO CLXXVIII. BROMELIACEÆ.

TRIBUS II. PITCAIRNIEÆ.

Pitcairnia jaliscana, WATSON.

Sitios agrestes y pedregosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Octubre 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3884).

Hechtia glomerata, Zucc. in Abhandl. Akad. Wiss. Münch. III. p. 240, t. 6.

Dasylirion pitcairniæfolium, Zucc. in Otto et Dietr. Allg. Gart. Zeit. 1838, p. 258.

En los Morales, cerca de S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 501).

Hechtia pedicellata, Watson n. sp.

Sitios agrestes, pedregosos y secos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre de 1891 (C. G. Pringle, 3934).

Hechtia pringlei, Rob. et Greenn. n. sp.

De 2-4 piés. Cerros calizos, cerca de Oaxaca. Mayo 13 de 1894 (C. G. Pringle, 4637).

TRIBUS III. TILLANDSIEÆ.

Tillandsia fasciculata, Swartz, Prodr. p. 56, et Fl. Ind. Occ. 1. p. 586; Rœm. et Schult. Syst. Veg. vii. 2, p. 1211; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 595.

Sobre la orilla del Lago de Cuitzeo (Est. de Michoacán), Julio 20 de 1892 (C. G. Pringle, 4173); Sobre los árboles, en las selvas tropicales de Rascón (Est. de S. Luis Potosí), Junio 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4172).

Tillandsia polystachya, Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 410; Schultes in Rom. et Schult. Syst. Veg. vii. 2, p. 1216.

Sobre los árboles. Rascón (Est. de S. Luis Potosf), Junio 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4106).

Tillandsia pringlei, Watson n. sp.

Flores amarillas. Sobre las rocas y los árboles. Las Canoas (Est. De S. Luis Potosí), Junio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3738).

Tillandsia recurvata, Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 410; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 598; Baker in Journ. Bot. 1878, p. 239; Ruiz et Pay. Fl. Peruy. et Chil, III. p. 42, t. 271.

Tillandsia uniflora, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 290.

Diaphoranthema recurvata, et D. uniflora, Beer. Brom. p. 156. N. V. Gallitos

Parásita sobre las encinas. Amecameca (Est. DE México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Tillandsia variabilis, Scal. in Linnæa xvm. p. 418.

Tillandsia asurea, Prest? in Linnæa vi. p. 418.

Sobre las Burseras. Cerros cerca de Guadalajara, Junio 25 de 1892 (C. G. Pringle, 4111).

Tillandsia vestita, Cham. et Schl. in Binnæa vi. p. 52, nec Benth. Pl. Hartw. p. 25.

Tillandsia flavescens, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint. p. 8.)

Sobre las encinas. Tultenango (Est. De México), Octubre 31 de 1892 (C. G. Pringle, 4328); Sobre los árboles. Bancos de lava, cerca de Zapotlán (Est. De Jalisco), Mayo 28 de 1893 (C. G. Pringle, 4376).

ORDO CLXXX. IRIDEÆ.

TRIBUS I. MORÆEÆ.

Tigridia pavonia, Ker (GAWLER) in König. & Sims's Ann. Bot.

1. p. 246; Red. Lil. t. 6; Lodd. Bot. Cab. t. 1424; Baker in
Journ. Linn. Soc. Lond. xvi. p. 136.

Ferraria pavonia, Linn. f. Suppl. p. 407; Andr. Bot. Rep. t. 178. Ferraria tigridia, Bot. Mag. t. 532.

Tigridia grandiflora, Salisb. in Trans. Hort. Soc. Lond. 1. p. 309.

N. V. Cacomite; Mex. Cacomitl, Oceloxochitl.

S. Joaquín, cerca de Tacuba, Valle de México, Agosto de 1881 (M. Urbina).

Tigridia pulchella, Rob.

Laderas boscosas y frías, cerca de Pátzcuaro (Est. DE Miспоасán), Octubre de 1892 (С. G. Pringle, 4321). Tigridia vanhouttei; Roezl. in Fl. des Serres t. 2174; S. Warson. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 160.

Entre los prados. Cerro de Ixtapalapan, Valle de México, Agosto 13 de 1893 (C. G. Pringle, 4490).

Tigridia sp.

N. V. Rodilla de Cristo.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Rigidella flammea, Lindl. Bot. Reg. 1840, t. 16; Paxt. Mag. Bot. vii. p. 247, cum icone.

Terrenos fértiles. Sierra de S. Felipe, de 8,500-10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4874).

Rigidella immaculata, Herb. in Bot. Reg. 1841, t. 68; Fl. des Serres tt. 502 et 2215. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4721).

TRIBUS II. SISYRINCHIEÆ.

Cipura paludosa, Aubl. Pl. Guian, 1. p. 38, t. 13; Klatt. in Mart. Fl. Bras. III. t. 64; Griseb, Fl. Brit. W. Ind. p. 589,

Marica paludosa, Willd. Sp. Pl. 1. p. 246; Bot. Mag. t. 646. Cipura humilis, et C. graminea, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 320.

Suelo seco y delgado, cerca de Guadalajara, Agosto 15 de 1893 (C. G. Pringle, 4463).

Nemastylis brunnea, Watson.

Cerros de Guadalajara, Septiembre 9 de 1893 (C. G. Pringle, . . .)

Nemastylis flava, Rob. n. sp.

Suelo arenoso, cerca de Guadalajara, Agosto 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4400).

Nemastylis multiflora, Bentil. et Hook. cx S. Wats. in Proc. Am. Acad, xviii, p. 160.

Chlamydostylus multiflorus, Baker in Trimen's Journ. Bot. 1876, p. 186, et Journ. Linn. Soc. Lond. xvi. p. 107.

Morwa foliosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 322?

En Morales, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 538); Cerca de Ayotla (Est. de México), Agosto de 1888 (M. Urbina).

- Nemastylis nana, S. Wars, in Proc. Am. Acad xviii. p. 160. En los montes Escabrillos, S. Luis Potosí, Octubre de 1877 (G. Schaffner, 539).
- Nemastylis tenuis, Benth. et Hook. Gen. Pl. III, p. 696; S. WATS. in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 160.

Chlamydostylus tennis, Baker in Journ. Linn, Soc. Lond. xvi.

Nenastylis calestina, Klarr, in Linnæa xxxı, p. 567 ex parte. Suelo delgado y húmedo, cerca de Guadalajara, Julio 17 de 1893 (C. G. Pringle, 4462).

Orthrosanthus chimboracensis, Baker in Gard. Chron. n. s. vi. p. 67; Journ. Linn. Soc. Lond. xvi. p. 112.

Moræa chimboracensis, et M. acorifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 322.

- Sisyrinchium moritzianum, Klatt. in Linnæa xxxl. p. 378. Sierra de S. Felipe, a 8,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4683).
- Sisyrinchium alatum, Hook. Ic. Pl. t. 219; Baker in Journ. Linn. Soc. Lond. xvi. p. 119.

var. angustissimum, Rob. et Greenm. n. var.

Sierra de S. Felipe, á 9,500 piés (Est. DE OAXACA), Junio 22 de 1894 (C. G. Pringle, 4703).

Sisyrinchium arizonicum, Rout.

Lugares húmedos, cerca de Pátzcuaro (Est. DE Michoacán), Agosto 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4191).

Sisyrinchium hartwegii, Baker in Journ. Linn. Soc. Lond.

Flores amarillas. Suelo delgado y seco, S. Juan del Estado, 46,000 piés (Est. de Oanaca), Agosto 20 de 1894 (C. G. Pringle, 4831).

Sisyrinchium laterale, BAKER?

Cerros calizos y secos. Las Sedas, á 6,000 piés (Est. De OAXACA), Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4761).

Sisyrinchium platyphyllum, Warson.

Sitios agrestes y cespitosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3847).

Sisyrinchium polycladon, Rob. et Greens, n. sp.

Bancos pedregosos. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4902).

Вот,--87.

Sisyrinchium pringlei, Rob. et Greenm. n. sp.

Cerros calizos y secos, cerca de Guadalajara, Septiembre 4 de 1893 (C. G. Pringle, 4520).

Sisyrinchium schaffneri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 160.

N. V. Zacate de la muela.

Chihuahua, Septiembre de 1888 (M. Torres); Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Diciembre de 1888 (C. G. Pringle, 2162).

TRIBUS III. IXIEÆ.

Gladiolus psitacinus?

Barranca de Metlac (Est. de Veracruz), Abril de 1881 (J. M. Velasco).

ORDO CLXXXI. AMARYLLIDEÆ.

TRIBUS I. HYPOXIDEÆ.

Hypoxis decumbens, Linn. Amæn. Acad. v. p. 396, et Sp. Pl. ed. 2, p. 439; Mart. Fl. Bras. iii. p. 51, t. 7, fig. 1; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 585; Baker in Journ. Lin. Soc. Lond. xvii. p. 107; Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint. p. 3.)

Anthericum sessile, MILLER, Fig. Pl. t. 39, fig. 2. Hypoxis mexicana, Roem. et Schult. Syst. Veg. vii. p. 761. S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 545).

TRIBUS II. AMARYLLEÆ.

Zephyranthes concolor, Benth. et Hook. Gen. Pl. III. p. 724, in nota sub. *Sprekelia;* S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 161.

Hippeastrum concolor, Baker in Trimen's Journ. Bot. 1878, p. 82.

Habranthus concolor, Lindl. in Proc. Hort. Soc. Lond. 1838,

- p. 8; Bot. Reg. 1845, t. 54; Kunth. Enum. v. p. 500; Benth. Pl. 11artw. p. 25.
- Cerros. Bocas (Est. de S. Luis Potosf), Mayo 14 de 1891 (C. G. Pringle, 5069).
- Zephyranthes longifolia, Hensl. Diag. Pl. Nov. pars. 3, p. 55 (1880); Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 333.
 - Zephyranthes aurea, S. Wars. in Proc. Am. Aead. xviii. p. 161. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 540).
- Zephyranthes pallida, Rem. Synop. Monogr. Amaryll. p. 124; Kunth. Enum. v. p. 487; Baker in Trimen's Journ. Bot. 1878, p. 166.
 - Zephyranthes lindleyana, Herb. Amaryll. p. 174, t. 35, fig. 5; Kunth. Enum. v. p. 486.
 - Zephyranthes grandiflora, Lindl. Bot. Reg. t. 902. (quoad folia et semina nec quoad florem.)
 - Zephyranthes lilacina, Liebm. Ind. Sem. Hort. Havn. 1844; Linnæa xviii. p. 509?
 - Zephyrauthes nervosa, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (reprint, p. 4), nee Herb.
 - S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 541); Praderas bajas. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Junio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3735).
- Zephyranthes sessilis, Herb. Amaryll. p. 175 (varietates); BAKER in Trimen's Journ. Bot. 1878, p. 166; Refug. Bot. t. 212.
 - Zephyranthes verecunda, Herb. in Bot. Mag. t. 2583; Refug. Bot. t. 356.
 - Zephyranthes striata, Herb. in Bot. Mag. t. 2593.
 - Zephyranthes grahamiana, Herb. Amaryll. p. 175, t. 29, fig. 2. Zephyranthes akermannia, Rem. Synop. Monog. Amaryll. p. 124.
 - Llanuras cerca de Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosí), Mayo 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3742).
- Zephyranthes sp.
 - S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 515).
- Crinum erubescens, Soland. in Ait. Hort. Kew. 1. p. 413; Herb. Amaryll. p. 251; Baker in Gard. Chron. n. sp. xvi. p. 398; Bot. Mag. t. 1232.
 - Praderas pantanosas, cerca de Sta. Ana (Est. DE JALISCO), Junio 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4418).

Hymenocallis galvestonensis, BAKER.

Sitios pedregosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, á 4,000 piés. Julio 10 de 1894 (C. G. Pringle, 4742).

Hymenocallis rotata, Herb. App. p. 44, et Amaryll. p. 217; Kunth. Enum. v. p. 679.

Pancratium rotatum, KER (Gavol), in Bot. Mag. t. 827; Refug. Bot. t. 357

Hymenocallis lacera, Salisb. in Trans. Hort. Soc. Lond. 1, p. 338.

Pancratium disciforme, Rep. Lil. t. 155 (excl. syn.)

Pancratium mexicanum, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 290.

Hymenocallis palludosa, Salisb. in Trans. Hort. Soc. Lond. 1. p. 338.

Hymenocallis dilleni, Reem. Synop. Monogr. Amaryll. p. 174. N. V. Flor de estrella, Mayilos.

Tenango del aire (Est. de México), Julio de 1891 (M. Urbina).

TRIBUS III. ALSTRŒMERIEÆ.

Bomarea edulis, Herb.

Nevado de Colima, Octubre de 1886 (M. Bárcena, 476); Orilla de las corrientes, Las Canoas (Est. de S. Luis Potost), Julio 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3188).

Bomarea ovata, Herb. Amaryll. p. 113; Rœm. Synop. Monogr. Amaryll. p. 269; Kuntii. Enum. v. p. 798. (varietates.) Alstræineria ovata, Cav. Ic. Pl. i. t. 76; Bot. Mag. t. 2848.

Voluble sobre arbustos, de 6-10 piés. Sierra de S. Felipe, de 7-8,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 20 de 1894 (C. G. Pringle, 4704).

TRIBUS IV. AGAVEÆ.

Polianthes tuberosa, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 316; Trans. Hort. Soc. Lond. 1. p. 41, t. 2; Bot. Mag. t. 1817; Red. Lil. t. 147; Bot. Reg. t. 63; Kunth. Enum. v. p. 846.

Polianthes gracitis, Link. Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 1. p. 330; Link. et Otto Ic. Pl. Sel. Hort. Bot. Berol. p. 55, t. 24. Polianthes mexicana, Zucc. in Abhandl. Baier. Akad. Wiss. II (1837), p. 319.

N. V. Nardo, Flor de hueso: Mex. Omixochitl.

Planta muy estimada por su perfume. Cultivada en Irapuato, de donde la traca a México en grandes cantidades, en los meses de Julio y Agosto. Agosto de 1895 (C. Cortés).

Prochnianthes viridescens, WATSON.

Lugares agrestes, eespitosos y fríos, cerros cerca de Guadalajara, Agosto 18 de 1893 (C. G. Pringle, 4505).

Bravoa geminiflora, LLAV. et LEX. Nov. Veg. Descr. 1, p. 6; Kunth. Enum. v. p. 849; Herb. Amaryll. p. 124, t. 12; R@M. Synop. Monogr. Amaryll, p. 245.

Bravoa catocapnia, RŒM. 1. c.

Cartocapnia geminiflora, Link, et Otto, Ic, Pl. Rar, Hort, Berol, p. 35, t. 18. (errore sub tabula Zetocapnia.)

Praderas pantanosas, Valle de Toluca (Est. DE México), Agosto 19 de 1892 (C. G. Pringle, 4215).

Beschorneria tubiflora, Kunth. Enum. v. p. 844; Bot. Mag. t. 4642; Regel Gartenflora, xxiv. p. 355, t. 851.

Furcraa (Furcroya) tubiflora, Ктн. et Bouché Ind. Sem. Hort. Berol. 1845; Rem. Synop. Monogr. Amaryll. p. 295. Montes Morales, S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 504).

Agave brunnea, Wats. n. sp.

Mesas calizas. Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosf), Julio 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3745).

Agave celsii, Hook. Bot. Mag. t. 4934; Jacobi Vers. syst. Ord. Agav. p. 165 (celsiana); Baker in Gard. Chron. n. s. viii. p. 620 (celsiana).

De 5-8 piés de altura. Capas calizas. Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potost), Junio 24 de 1891 (C. G. Pringle, 3739).

Agave falcata, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, III (reprint. p. 16); Proc. Am. Acad. Sc. XVIII. p. 162; BAKER in Gard. Chron. n. s. VIII. p. 556, sub A. californica, JACOBI.

Capas calizas de la Sierra Madre (Est. De Nuevo León), Junio 27 de 1888 (C. G. Pringle, 1953).

Agave (Manfreda) guttata, Јасові et Bouené in Jacobi, Vers. syst. Ord. Agav. p. 190; Вакек in Gard. Chron. n. s. viii. p. 808; Proc. Am. Acad. xviii. p. 161; Biol. Cent. Am. Bot. p. 343, t. LXXXVII.

Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Junio de 1894 (C. G. Pringle, 4745).

Agave (Euagaœ) megalacantha, Hemst. Diag. Pl. Nov. Mex. pars. 3, p. 55, t. Lyxxviii A.; Biol. Cent. Am. Bot. iii. p. 346. Cerros pedregosos y secos, cerca de Guadalajara, Julio 21 de 1893 (C. G. Pringle, 4473).

Agave (Manfreda) variegata, Jacobi Vers. syst. Ord. Agav. p. 180; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, III (reprint. p. 15); Proe. Am. Acad. Sc. xvIII. p. 161; BAKER in Gard. Chron. n. s. vIII. p. 808; Refug. Bot. t. 326.

Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 2666, 5158).

Agave (Littæa) yuccæfolia, DC. in Red. Lil. tt. 328 et 329; Kunht. Enum. v. p. 830; Jacobi Vers. syst. Ord. Agav. p. 146; Baker in Gard. Chron. n. s. viii. p. 781; Bot. Mag. t. 5213.

Agave cohniana, JACOBI 1. c. p. 264.

Hojas de 2 à 5 piés; racimos de 5 à 15 piés, claviformes. Pendientes del Rio Grande de Santiago, cerca de Guadalajara, Mayo 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3740).

ORDO CLXXXIII. DIOSCOREACEÆ.

Dioscorea composita, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 354. Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 7 de 1894 (C. G. Pringle, 4774).

Dioscorea convolvulacea, Ch. et Schl. in Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 355. t. LXXXIX.

Trepadora sobre los arbustos, en los cerros pedregosos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoaeán), Octubre 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4260); Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaea), Agosto 13 de 1894 (C. G. Pringle, 5692).

Dioscorea galeottiana, Kunth; Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 356.

Sierra de S. Felipe, à 7,500 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 10 de 1894 (C. G. Pringle, 4890).

Dioscorea grandiflora, Scill. in Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot.

Las raíces brotan de un tubérculo iregular: tallos volubles de 10 á 20 piés. En el talud de los peñaseos. Barranca de Tequila (Est. DE Jaliseo), Octubre 4 de 1893 (C. G. Pringle, 4547).

Dioscorea hirsuticaulis, Rob. n. sp.

Bajo eapas secas. Barranca de Tequila (Est. DE JALISCO), Octubre 14 de 1893 (C. G. Pringle, 4572),

Dioscorea jaliscana, Watson.

Bancos sombrios, cerca de Guadalajara, Septiembre 8 de 1893 (C. G. Pringle, 4528).

Dioscorea militaris, Rob. et Greenm.

Peñas. Barranca de Guadalajara, Septiembre 8 de 1893 (C. G. Pringle, 5434).

Dioscorea minima, Ron. et Sea. n. sp.

Baneos de lava, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoaeán), Julio 28 de 1892 (C. G. Pringle, 4157).

Dioscorea multinervis, Benth. in Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. 111. p. 358.

Lugares húmedos, cerca de Pátzcuaro (Est. De Michoacán), Julio 28 de 1892 (C. G. Pringle, 4158).

Dioscorea plumifera, Rob. n. sp.

Bajo los peñascos, Barranca de Tequila (Est. DE Jaliseo), Octubre 14 de 1893 (C. G. Pringle, 4530).

Dioscorea pringlei, Rob. n. sp.

Lugares eespitosos de la Barranca (Est. De Jalisco), Septiembre 7 de 1893 (C. G. Pringle, 4526).

Dioscorea remotiflora, Kunth. Enum. v. p. 409.

Dioscorea laxiflora, Sehl. in Linnæa xvii. p. 606. Helmia chrenbergia, Кихтн. Enum. v. p. 433, ex Griseb. Fl.

Brit. W. Ind. p. 588.

Trepadora sobre arbustos. Lugares sombrios de la Barranca (Est. DE Jalisco), Septiembre 6 de 1893 (C. G. Pringle, 4527).

ORDO CLXXXV. LILIACEÆ.

TRIBUS I. SMILACEÆ.

Smilax bona-nox, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 1030; A. DC. in DC. Monogr. Phanerog. 1, p. 77. (sub species et varietates plures.) Smilax tamnoides, A. Gr. Man. Bot. N. U. S. ed. 5, p. 519, non, L?

Smilax platycentron, Schl. in Linnæa xviii. p. 452?

N. V. Sarzaparrilla.

Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 531)

Smilax invenusta, Kunth. Enum. v. p. 234; DC. Monogr. Phanerog. i. p. 90.

Sierra de la Silla, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 16 de 1888 (C. G. Pringle, 2866).

TRIBUS IV. POLYGONATEÆ.

Smilacina flexuosa, Bertol. in Nov. Com .Acad. Bonon. Iv. p. 411, t. 39, et Fl. Guat. p. 11, t. 4.

Smilacina bertolonii, Kunth. Enum. v. p. 151.

Smilax flexuosa, Hoort. Ic. Pl. vi. t. 529?

Tovaria flexuosa, Baker in Journ. Linn. Soc. xiv. p. 567, pro parte.

Cañadas fértiles, Sierra de S. Felipe, á 8-9,000 piés (Est. de Oaxaca), Marzo 22 de 1894 (C. G. Pringle, 4547).

TRIBUS XII. DRACÆNEÆ.

Hesperaloe engelmanni, DRAUSK.

Acaulescente, con 5-15 hojas erguidas, de 4-6 piés de largo; ástil de 10-15 piés de altura, una pulgada de grueso, con 10-15 ramas simples en su parte superior. Cerros calizos y secos, Hacienda de la Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3911).

Yucca aloifolia, Linn. Sp. Pl. ed. I, p. 319; Engelm. in Trans. Acad. St. Luis, in. p. 34; Baker in Journ. Linn. Soc. xviit. p. 221; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 582; DC. Plantes grasses, t. 20; Red. Lil. t. 401, 402; Bot. Mag. t. 1700.

Yucca serrulata, Haworth. Synop. Pl. Succ. p. 70.

Yucca crenulata, Y. archata, Y. conspicua, et Y. tenuifolia, Haworth. Suppl. Pl. Succ. pp. 32, 34.

Yucca draconis, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 319.

Jardín del Museo Nacional. México, Julio de 1890 (M. Urbina).

Yucca baccata, Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 221; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, III. p. 44; Baker in Journ. Linn. Soc. xvIII. p. 229 (varietates 2); III. Hort. 1873, t. 115.

Yucca filifera, Rev. Hort. 1876, p. 432, fig. 97.

var? Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Mayo 11 de 1891 (C. G. Pringle, 3912).

Yucca schottii, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, III. p. 46; Baker in Journ. Linn. Soc. xvIII. p. 228.

Arbórea de 15 à 20 piès. Valle de Zapotlán (Est. de Jalisco), Mayo de 1893 (C. G. Pringle, 4392).

Nolina humilis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. p. 248, ex parte; Вакек, Journ. Linn. Soc. xvin. p. 237; Biol. Cent. Am. Bot. in. p. 372, t. xcin.

Beaucarnea humilis, BAKER, loc. cit.

En S. Miguelito, S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 502).

Dasylirion acrotichum, Zucc. Pl. Nov. Hort. et Herb. Monac. fasc. iv. t. 1, fig. 4; Kuntii. Enum. v. p. 40; Baker in Journ. Linn. Soc. xviii. p. 239; Bot. Mag. t. 5030, icon. in Flore des Serres, t. 1448, iterata.

Vucca acrotricha, Schiede in Linnæa iv. p. 230, et vl. p. 52, Roulinia acrotricha, et R. gracilis, Brongn. in Ann. Sc. Nat. scrie 2, xiv. p. 320.

Dasylirion gracile, Zucc. Pl. Nov. Hort. en Herb. Monac. v. p. 22. Dasylirion graminifolium, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. p. 249, non Zucc.

N. V. Cucharilla.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 500).

Dasylirion inerme, Wats. n. sp.

Planta arbórea de 20-30 piés de altura, con pocas ramas y de 2-4 piés de espesor en su base.

Capas calizas, Las Palmas (Esr. de S. Luis Porosí), Junio 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3108).

Dasylirion wheeleri, WATSON.

Sitios agrestes de la Barranca, Las Canoas (Est. de S. Luis Porosi), Junio 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3746).

TRIBUS XIII. ASPHODELEÆ.

Anthericum leptophyllum, Baker in Journ. Linn. Soc. xv. p. 317; Proc. Am. Acad. xvIII. p. 164.

Echeandia leptophylla, Венти. Pl. Hartw. p. 25; Кинти. Enum. iv. p. 629.

Hesperanthes leptophylla, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. p. 241.

Echeandia graminea, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. 2 (reprint. p. 16); Kunth. Enum. iv. p. 699.

En las montañas de S. Miguelito, S. Luis Potosí, Agosto de 1877 (G. Schaffner, 543).

Anthericum leucocomum, Rob. et Greenm. n. sp.

Cerros secos, arriba de Oaxaca, á 6,000 piés. Agosto 6 de 1894 (C. G. Pringle, 4783).

Anthericum nanum, Baker in Journ. Linn. Soc. xv. p. 305. Sitios agrestes. Flor de María (Est. de México), Julio 31 de 1890 (C. G. Pringle, 3184).

Echeandia nodosa, Watson, n. sp.

Montes secos y pedregosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 23 de 1891 (C. G. Pringle, 3870).

Echeandia terniflora, Ort. Nov. Pl. Dec. pp. 90 et 135, t. 18; Red. Lil. t. 313; Kunth. Enum. IV. p. 627; Baker in Journ. Linn. Soc. xv. p. 288.

Echeandia albifiora, et E. hænkeana, Kunth. loc. cit. pp. 628 et 629.

Anthericum reflexum, Cav. Ic. Pl. III. p. 21, t. 241.

Conanthera echeandia, Pers. Synop. 1, p. 370; Link. et Otto Ic. Pl. Rar. Hort. Berol p. 5, t. 3.

Conanthera, albiflora, Cu. et Schl. in Linnæa vi. p. 50.

Echeandia leucantha, Klotzch. ex Kunth. I. c. p. 628. Echeandia albiflora, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. 1x. (reprint. p. 15.)

Sitios agrestes y cespitosos, Las Canoas (Est. De S. Luis Potosí), Junio 16 de 1890 (C. G. Pringle, 3183); Cerca de Guadalajara, Octubre 1.º de 1891 (C. G. Pringle, 5338).

Glyphosperma palmeri, S. Wars: in Proc. Am. Acad. xvii. p. 164; Bot. Mag. t. 6717.

En los arroyos. Llanuras cerca de Los Charcos (Est. DE S. Luis Potosi), Julio 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3744).

TRIBUS XV. ALLIEÆ.

Milla biflora, Cav. Ic. Pl. II. p. 76, t. 196; Kunth. Enum. IV. p. 478; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. p. 240, et xviii. p. 165; Bot. Reg. t. 1555; Flore des Serres, t. 1459.

Diphalangium graminifolium, Schauer in Linnæa xix. p. 702. N. V. Estrella

Cerro de la Guiñada (Est. de México), Septiembre de 1888 (F. Attamirano); Llanos cerca de Chihuahua, Septiembre de 1887 (C. G. Pringle,....)

Bessera elegans, Schultes in Linnea IV. p. 121; Lindl. Bot. Reg. 1839, t. 34; Kunth. Enum. IV. p. 477; Baker in Journ. Linn. Soc. XI. p. 373.

Pharium fistulosum, HERBERT. in Bot. Reg. t. 1546.

Bessera multiflora, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. 1x. (reprint p. 14); Kunth. Enum. 1v. p. 699.

Bessera miniata, Lemaire in Flore des Serres, t. 424.

N. V. Aretillo.

Nevado de Colima, Octubre de 1887 (M. Bàrcena, 475).

Nothoscordum striatum, Kunth. Enum. IV. p. 459; Refug. Bot. v. t. 304; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvin. p. 165.

Allium striatum, JAcq. Ic. Pl. Rar. t. 366; Red. Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 581.

Ornithogalum bivalve, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 306.

En terrenos pantanosos. S. Luis Potosí, Agosto de 1877 (G.

Schaffner, 537.3); Lugares húmedos, llanuras cerca de Cusihuiriachie (Est. de Chhiuahua), Septiembre 24 de 1888 (C. G. Pringle, 2008).

Allium glandulosum, Link. & Otto 1c. Pl. Rar. Hort. Berol. L. p. 33. t. 17; Otto & Dietr. Allg. Gart. Zeit. vi. p. 293; Regel Allior. Monogr. p. 230; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. p. 235.

Allium longifolium, Lindl. Bot. Reg. t. 1034, non Sprengel. Suelo pedregoso, cerro de Ixtapalapa, Valle de México,

Agosto 13 de 1893 (C. G. Pringle, 4495).

Allium longifolium, Spreng. Syst. Veg. II. p. 38; Don. in Mem. Vern. Mat. Hist. Soc. vi. p. 81; Kuntii. Enum. iv. p. 450; Regel. Allior. Monogr. p. 231.

Schwnoprasum longifolium, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 277. Campos húmedos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3095).

Allium scaposum, Bentii. Pl. Hartw. p. 26; Regel Allior, Monogr. p. 94; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 165.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, Septiembre de 1877 (G. Schaffner, 537b).

TRIBUS XVII. TULIPEÆ.

Calochortus bonplandianus, Schult. f. in Reem. et Schult. Syst. Veg. vii. p. 1532; S. Wats. in Proc. Am. Acad. хiv. p. 267.

Calochortus purpureus, Baker in Journ. Linn. Soc. xiv. p. 308, pro parte.

Cyclobothra purpurea, Sweet. Brit. Fl. Gard. ser 2, t. 20. Fritillaria purpurea, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 288.

Cyclobothra propinqua, Schauer in Linnæa xix. p. 701.

Cyclobothra grandiflora, MART. et GAL. in Bull. Acad. Brux. IX. (reprint. p. 13.)

Sitios agrestes de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3456).

Calochortus flavus, Schult. f. in Rœm. et Schult. Syst. Veg. vii. p. 1535; The Botanist, iv. p. 170; Baker in Journ, Linn. Soc. xiv. p. 308; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. p. 268.

Cyclobothra flava, Lindl. Bot. Reg. sub. t. 1662; Kunth. Enum iv. p. 229.

Frilillaria barbata, H.B.K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 288, et vn. t. 677.

Cyclobothra barbata, Sweet. Fl. Gard. t. 273.

Cyclobothra lutca, Lindl. Bot. Reg. t. 1663.

Calochortus pallidus, Schult, f. in Ræm. et Schult, Syst. Veg. vn. p. 1533.

Cyclobothra pallida, Lindl. Bot. Reg. sub. t. 1662.

En las montañas de S. Miguelito, S. Luis Potosí, Agosto de 1877 (G. Schaffner, 542).

N. V. Ayatito.

Teoloyúcan (Est. de México), Agosto de 1886 (M. Urbina); Mesas cerca de Cusibuiriachie (Est. de Сипианиа), Agosto 29 de 1887 (C. G. Pringle, 1580); Praderas y baneos, Flor de Maria (Est. de México), Agosto 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3185).

TRIBUS XXIII. VERATREÆ.

Stenanthium frigidum, Kunth. Enum. iv. p. 190; Baker in Journ. Linn. Soc. xvii. p. 484.

Veratrum frigidum, Ch. et Schl. in Linnaea vi. p. 46; Benth. Pl. Hartw. p. 53.

N. V. Cebadilla.

Sierra de Jaripeo (Est. de Michoacán), Diciembre de 1887 (M. Fillada); En lugares húmedos de Ias selvas de pinos del Nevado de Toluca (Est. de México), à 12,000 piés de altura. Septiembre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4257).

Zygadenus mexicanus, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. ur. p. 382.

Anticlea mexicana, Kunth. Enum. iv. p. 193; Baker in Journ.

Linn. Soc. xvii. p. 483.

Helonias virescens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 267.

Veralrum virescens, Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. (reprint. p. 10.)

Zygadeuus volcanicus, S. Watson in Proc. Am. Aead. xvIII. p. 165, non Benth.

Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4767).

Zygadenus volcanicus, Bentu. Pl. Hartw. p. 96; Kuntu. Enum. iv. p. 198.

Anticlea volcanica, BAKER in Journ. Linn. Soc. xviii. p. 482. En las montañas de S. Miguelito, S. Luis Potosf, 1877 (G. Schaffner, 544); Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina).

Scheenocaulon drummondii, A. Gr. in Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. p. 388, in nota; Baker in Journ. Linn. Soc. xvn. p. 477; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvn. p. 166. Scheenocaulon texanum, Scheele in Linnæa, xxv. p. 262.

N. V. Cebadilla, Mataburros.

En las montañas de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 536); Cerros calizos, Cárdenas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 2454).

Schœnocaulon intermedium, BAKER in Journ. Linn. Soc. xvii. p. 477.

Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 5754).

Schœnocaulon tenuifolium, Rob. et Greenm. n. sp. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 28 de 1894 (C. G. Pringle, 5857).

ORDO CLXXXVI. PONTEDERIACEÆ.

Heteranthera limosa, Vahl. Enum. n. p. 44; Solms. in DC.
Monogr. Phanerog. iv. p. 518; Griseb. F1. Brit. W. Ind. p. 90; A. Gr. Man. Bot. Northen. U. S. ed. 5, p. 545; Bentil. Pl. Hartw. p. 25; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvin. p. 166; Bot. Mag. t. 6192.

Pontederia limosa, SWARTZ. Fl. Ind. Occ. I. p. 611.

Heteranthera alisinoides, Humb. et Bonpl. in Link. Jahrb. nr. p. 73.

Leptanthus ovalis, Michx. Fl. Bor-Am. г. р. 25, t. 5, fig. 1. Pantanos superficiales. Llanuras en la base de la Sierra Madre (Еsт. DE Синианиа), Septiembre 7 de 1888 (С. G. Pringle, 2022).

Heteranthera mexicana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 100.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 516); Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bărcena, 632).

Heteranthera reniformis, Ruiz et Pav. Fl. Peruv. et Chil. 1. p. 43, t. 71; Solms in Monogr. Phanerog. iv. p. 519; A. Gr. Man. Bot. Northem. U. S. ed. 5, p. 545.

Heteranthera reniforme, Beauv. in Trans. Am. Phil. Soc. iv. p. 173, cum icone.

Buchosia aquatica, Vel. Fl. Flum. 1. p. 80.

Leptanthus reniformis, Michx. Fl. Bor. Am. 1. p. 24.

Heteranthera pubescens, Vaill. Enum. 11. p. 43; ex Mart. et Gal. in Bull. Acad. Brux. 1x. (reprint. p. 41.)

Heteranthera acuta, Van. 1. c. p. 42.

β. peduncularis, Solms. in DC. Monogr. Phanerog. iv. p. 520; Benth. Pl. Hartw. p. 25 (species).

Heteranthera reniformis, var. multiflora, Griseb. in Abhandl. K. Gesell. Wiss. Gœtt. xxiv. p. 323.

Montes de los Morales, S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 520).

ORDO CXC. COMMELINACEÆ.

TRIBUS II. COMMELINEÆ.

Commelina graminifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 258; C. B. Clarke in DC. Monogr. Phanerog. III. p. 152; S. Wats, in Proc. Am. Acad. xviii. p. 166.

Commelina angustifolia, Reichb. Ic. Bot. Exot. ii. p. 17, t. 142, non Michx.

Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Pe-ñafiel); S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner,...); Zapópam (Est. de Jalisco), 1886 (M. Bårcena, 194).

Commelina pallida, Willd Hort. Berol. II. p. 87, non Schl; C. B. Clarke in DC. Monog. Phanerog. III. p. 151.

Commelina rubens, RED. Lil. vii. t. 367.

Commelina decumbens, E. Meyer in Prest. Reliq. Hænk. 1. p. 136?

Cerro de Guadalupe, Valle de México, Septiembre de 1881 (M. Urbina).

Commelina tuberosa, Linn. Sp. Pt. ed. 1, p. 41.

N. V. Yerba del Pollo.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel'; S. Joaquín, Valle de México, Agosto de 1881 (M. Urbina). Commelina sp.

N. V. Santa Marta.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 767).

Commelina sp.

N. V. Yerba del Pollo.

Atotonileo el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel): Belén, Guadatajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 60). Commelina sp.

Atotonilco el Grande (Est. DE HIDALGO), 1872 (A. Peñafiel).

TRIBUS III. TRADESCANTIEÆ.

Tradescantia angustifolia, Rob. n. sp.

Suelo delgado de capas calizas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 14 de 1891 (C. G. Pringle, 3902).

Tradescantia crassifolia, Cav. Ic. Pl. 1. p. 54, t. 75; C. B. Clar-KE in DC. Monogr. Phanerog, Hl. p. 293; Salisb. Parad, Lond. t. 58; Bot. Mag. t. 1598.

Tradescantia herba-ratti, NEES in Linnæa xix. p. 699.

Tradescantia lanuginosa, Hassk. Commel. Ind. p. 67.

Cerca de los Morales, S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 523); Amecameca (Est. de México), Julio de 1881 (M. Urbina); Tlalmanalco (Est. de México), Agosto de 1890 (M. Villada). var? angustifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 168. En los Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 523).

Tradescantia karwinskyana, Roem. et Schult. Syst. Veg. vii. p. 1165; C. B. CLARKE in DC. Monogr. Fhanerog. III. p. 299; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 166,

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 525).

Tradescantia linearis, Benth. Pl. Hartw. p. 27; C. B. Clarke in DC. Monogr. Phanerog. III. p. 298; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 167.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosf, 1876 (G. Schaffner, 524).

Tradescantia sp.

N. V. Yerba del Pollo.

Valle de México, Julio de 1882 (M. Urbina).

Tradescantia sp.

Atotonilco el Grande (Est. DE Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Callisia insignis, C. B. Clarke in Hemst. Diagn. Pl. Mex. III. p. 56.
 DC. Monogr. Phanerog. III. p. 311; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 167; Biol. Cent. Am. III. p. 395, t. xcv, figg. 12–21.
 Cerca de los Morales, S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 522).
 Callisia sp.

Mineral de Guadalcazar (Est. DE S. Luis Potosi), Junio de 1892 (M. Villada).

ORDO CXCIII. JUNCACEÆ.

Juneus acuminatus, Michx. Fl. Bor-Am. I. p. 192; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, II. p. 462 (varietates plures); Buchenau, Krit. Verzeichn. June. p. 2; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 169; A. Gr. Man. Bot. Northern U. S. ed. 5, p. 541.

Juneus radicans, Schl. in Linnæa xviii. p. 442, fide Buchenau, in Abhandl. Naturw. Ver. Bremen 1873, in. p. 343, et Krit. Verzeichn. June. p. 38.

Juneus debilis, A. Gr. Man. Bot. Northern. U. S. ed. 2, 1856, p. 480.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 553).

Juneus baltieus, Willd. Berl. Magaz. 1809, III. p. 298; Buche-NAU, Krit. Verzeichn. Junc. pp. 7 et 61; ENGELM. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, II. p. 462, pro parte; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 167.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 554).

Juncus bufonius, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 328; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, II. p. 451; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 168.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 556).

Juncus marginatus, Rosth. Diss. de Junco, 1801, p. 38; Buche Nau, Krit. Verzeinch. Junc. p. 28; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, n. p. 455 (varietates); S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvin. p. 169; A. Gr. Man. Bot. Northern U. S. ed. 5, p. 539.

Juneus canaliculatus, Liebm. in Vidensk. Meddel. 1850, p. 43; Steud. Syn. Pl. Glum. II. p. 304.

En los montes Morales, cerca de S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 550).

Juneus microcephalus, H. B. K.

Pantanos del Río Grande de Santiago, cerca de Atequiza (Est. DE Jalisco), Mayo 20 de 1890 (C. G. Pringte, 3131).

Juneus nodosus, Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 446; Buchenau, Krit. Verzeichn. Junc. p. 33; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, II. p. 471 (varietates); S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 168.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 551).

Juncus tenuis, Willer, Buchenau, Krit. Verzeichn. Junc. p. 45, et in Abhandl. Naturw. Ver. Bremerx. vi. p. 381; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, II. p. 450; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 168; A. Gr. Man. Bot. Northern U. S. ed. 5, p. 540.

En S. Miguelito, S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 555); Flor de María (Est. de México), Agosto 31 de 1890 (C. G. Pringle,)

Juncus xiphioides, E. Mey. Syn. Junc. 1882, p. 50; Buchenau, Krit. Verzeichn. Junc. pp. 48 et 74; Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, n. p. 481; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 169.

En los Morales, cerca de S. Luis Potosí, Agosto de 1877 (G. Schaffner, 549).

Luzula caricina, E. Mey. in Linnæa xxii. p. 418; Steud. Syn. Pl. Glum. II. p. 294; Buchenau, Krit. Verzeichn. Junc. p. 52. Luzula barbata, Liebm. in Vidensk. Meddel. 1850, p. 45; Buchenau, in Abhandl. Naturw. Ver. Bremen, 1873, III. p. 345. Sierra de S. Felipe, a 10,300 pids (Est. de Oaxaca), Agosto 29 de 1894 (C. G. Pringte, 4853).

Luzula racemosa, Desv. in Journ. de Bot. Par. 1808, 1. p. 162, t. 6, fig. 1; Steud. Syn. Pl. Glum. II. p. 294; Buchenau in Abhandl. Naturw. Ver. Bremen, 1873, nr. p. 344, et iv. p. 129, et 1879, vi. p. 415, t. 4.

Luzula vulcanica, Lieba, in Vidensk, Meddel. 1850, p. 44. Luzula spicata, DC., y. interrupta, Schl. in Lindea xxii. p. 415.

Luzula interrupta, Desv. in Journ. de Bot. Par. 1808, Lp. 163.
Grandes montañas cerca de Toluca (Est. de México), Agosto de 1892 (C. G. Pringle, 4216).

ORDO CXCIV. PALMÆ.

TRIBUS I. ARECEÆ.

Chamædorea elatior, Mart. in Linnwa v. p. 205, et Hist. Nat. Palm. ur. p. 157, pro parte fide Œrst. in Vidensk. Meddel. 1858, p. 16.

Chamadorea (Euchamadorea) elatior, Mart.; Wendl. in Otto et Dietr. Allg. Gart. Zeit. 1853, xxi. p. 170.

Chamedorea scandens, Liebm.; Mart. Hist. Nat. Palm. III. p. 308, fide Œrst. 1. c.

Tallos cespitosos de 8-10 pies, Bosques fértiles de las montañas, Cañón de Tamasopo (Est. DE S. Luis Porosf), Diciembre 4 de 1891 (C. G. Pringle, 3980).

Chamædorea pringlei, Wars. n. sp.

Capas calizas y sombrías. Cañon de Tamasopo (Est. de S. Luis Potost), Julio de 1891 (C. G. Pringle, 3737).

TRIBUS III. CORIPHEÆ.

Brahea duleis, Mart. Nat. Hist. Palm. 111. p. 244, tt. 137, 162; Kuntii. Enum. Pl. 111. p. 245.

Coripha dulcis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 300.

N. V. Palma apachi, palma para sombreros.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1873 (A. Peñafiel).

ORDO CXCVIII. AROIDEÆ.

TRIBUS I. POTHOIDEÆ.

SUBTRIBUS II. ANTHURIEÆ.

Anthurium cordifolium, Kunth. Enum. Pl. III. p. 76; Schott, Prodr. Aroid. p. 515; Refug. Bot. t. 279; Engler in DC. Monogr. Phanerog. II. p. 171.

Barranca del Salto, cerca de Amecameca (Est. de México), Agosto de 1881 (M. Urbina).

ORDO CXCIX. LEMNACEÆ.

Lemna gibba, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 970; Hegelm. Lemn. p. 145. tt. 11, 12, 13, figg. 1-9.

Telmatophace gibba, Schleid. in Linnæa, xiii. p. 391; Kunth. Enum. Pl. iii. p. 6.

N. V. Lentejilla.

Lago de Chalco, Valle de México, Agosto de 1888 (M. Urbina).

Lemna polyrhiza, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 970; Wolff. Monogr. p. 28, tt. 16-21.

Spirodela polyrhiza, Schleid. in Linnæa xiii. p. 392; Kuntii. Enum. Pl. iii. p. 7; Hegelm. Lemn. p. 151, tt. 13 (figg. 10-16), 14, et 15.

Laguna de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3384).

ORDO CCII. NAIADACEÆ.

TRIBUS I. JUNCAGINEÆ.

GENUS ANOMALUM.

Lilæa subulata, H. B. K.

En agua, Cerca de Toluca (Est. de México), Agosto 27 de 1892 (C. G. Pringle, 5258).

TRIBUS III. POTAMEÆ.

Potamogeton zizii, Rotu.

Lago de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3327).

ORDO CCIII. ERIOCAULEÆ.

Eriocaulon benthami, Kunth. Enum. Pl. m. p. 545; Kærn. in Mart. Fl. Bras. m. p. 490.

Eriocaulon benthami, Scul. in Linnæa xviii. p. 434, pro parte nec Kunth.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Septiembre 25 de 1891 (C. G. Pringle, 4033).

Eriocaulon microcephalum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 253; Kuntu. Enum. Pl. III. p. 548; Kœrn. in Mart. Fl. Bras. III. p. 492.

Praderas húmedas. Sierra de las Cruces, a 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 23 de 1894 (C. G. Pringle, 6144).

Eriocaulon sp.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Octubre 7 de 1891 (C. G. Pringle, 3855).

ORDO CCVI. CYPERACEÆ.

Tribus I. SCIRPEAE.

Cyperus amabilis, Vaul. Enum. Pl. u. p. 318; Kuntu. Enum. Pl. n. p. 108; Clarke in Journ. Linn. Soc. xxi. p. 85.

Cyperus aureus, C. aurantiacus, et C. oligostachyus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, pp. 204, 205; Kuxth. Enum. Pl. 11, pp. 20, 21; Bœck. in Linnæa xxxv. p. 494.

Cyperus glareosus, Liebu. Mexicos Halvgr. p. 16.

Llanuras arenosas, cerca de Guadalajara, Noviembre 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3380).

Cyperus aristatus, Rottb. Descr. et Ic. p. 23, t. 6, fig. 1; Bœck. in Linnæa xxxv. p. 500; Clarke in Journ. Linn. Soc. xxi. p. 91; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 169.

Cyperus squamosus, Linn. Amœn. Acad. iv. p. 303, partim, nec Rottb.

Cyperus inflexus, Muehle. Descr. Gram. p. 16.

Cyperus purshii, RŒM. et Schult. Syst. Veg. 11. p. 177.

Cyperus falciculosus, Liebm. Halvgr. p. 16.

Tierra mojada, Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 1.º de 1893 (C. G. Pringle,.....)

Cyperus articulatus, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 44; Bæck. in Linnæa xxxvi. p. 274; Clarke in Journ. Linn. Soc. xxi. p. 155; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 170.

Riveras pantanosas, Atequiza (Est. de Jalisco), Mayo 24 de 1890 (C. G. Priugle, 3131).

Cyperus atropurpureus, Liebm.

Lomas cespitosas de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 28 de 1891 (C. G. Pringle, 3844).

Cyperus bourgæi, CLARKE.

En las ciénegas, Valle de México, Septiembre 4 de 1891 (C. G. Pringle, 3895).

Cyperus brainerdi, BRITTON n. sp.

Lugares humedos, cerca de Guadalajara, Septiembre 25 de 1891 (C. G. Pringle, 2563, 3843).

Cyperus bromoides, WILLD.

Pantanos. Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3770).

Cyperus buckleyi, BRITTON.

Cañada de Rio Hondo (Esr. de México), Agosto 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3159).

Cyperus compressus, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 46; Bœck, in Linmea xxxv, p. 517; Clarke in Journ. Linn. Soc. xxi. p. 97.
Suelo húmedo, Tequila (Est. De Jalisco), Septiembre 26 de 1893 (C. G. Pringle, 4617).

Cyperus diandrus, Tork?

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Septiembre 11 de 48º0 (C. G. Pringle, 32o2).

Cyperus flavus, (Van...) Всеск.

Cañada de Rio Hondo (Esr. de México), Agosto 26 de 1890 (C. G. Pringle, 3162).

Cyperus haspan, Linn, Sp. Pl. ed. 1, p. 45; Kuntil Enum, il. p. 34; Bueck, in Linnæa xxxv. p. 574 (excl. var. a.); Clarke in Journ, Linn, Soc. xxl. p. 119.

Cyperus gracilis, MUEHL. Gram. p. 18.

Cyperus nudns, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 203.

En los mamantiales, Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3283).

Cyperus humilis, Kuntu. Enum. Pl. n. p. 23; Beck. in Linnæa xxxv. p. 440.

Cyperus tenerrimus, Presl. Reliq. Hank. 1, p. 166; Kunth. Enum. Pl. 11, p. 44; Liebal Mexicos Halvgr, p. 21.

var. clatior, Britton.

Bordes musgosos de las corrientes, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3917).

Cyperus incompletus, Link, Hort. Berol. i. p. 318 (excl. synom.);

Beeck. in Linnea xxxvi. p. 361; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 170.

Mariscus patulus, Schrad in Nees. Cyp. Bras.

Mariscus longiradiatus, Liebm. Mexicos Halvgr. p. 44.

Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porosi), Septiembre 23 de 1890 (C. G. Pringle, 3418); Bancos húmedos cerca de Guadalajara, Agosto 29 de 1893 (C. G. Pringle, 4475).

Cyperus lateriflorus, Torr. in Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 226.

Suelo húmedo, Valle de Lerma (Est. de Michoacán), Septiembre 9 de 1890 (C. G. Pringle, 3261).

Cyperus lævigatus, Linn. Mant. p. 79; Bæck. in Linnæa xxxv.

p. 486; Clarke in Journ. Linn. Soc. xxi. p. 77; S. Wats. Bot. Calif. II. p. 214.

Cyperus mucronatus, Rоттв. Descr. et Ic. p. 19, t. 8, fig. 4; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. г. p. 203.

Riberas pantanosas y alcalinas que limitan el Lago de Cuitzeo (Est. de Michoacán), Octubre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4170, 4320).

Cyperus luzulæ, Rottb. Descr. et Ic. p. 23, t. 13, fig. 2; Kuntii. Enum. Pl. ii. p. 43; Bæck. in Linnæa xxxv. p. 561; Lieba. Mexicos Halvgr. p. 20.

Bancos de las corrientes, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Junio 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3716).

Cyperus melanostachyus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 207; Liebm. Mexicos Halvgr. p. 13 (varietates); Bœck. in Linnæa xxxv. p. 455; Clarke in Journ. Linn. Soc. xxi. p. 67; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 169.

Cyperus variegatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 208.

Praderas húmedas, Las Canoas (Est. de S. Luis Porosí), Julio 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3789); Lugares húmedos cerca de Guadalajara, Septiembre 25 de 1891 (C. G. Pringle, 3848).

Cyperus mutisii, Bœck. in Linnæa xxxvi. p. 387.

Mariscus mutisii, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 216, t. 66. Mariscus karvinskianus, Kunth. Enum. Pl. n. p. 123.

Mariscus mexicanus, Steud. Cyper. p. 64. Mariscus oaxacensis, Steud. Cyper. p. 65.

Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 28 de 1891 (C. G. Pringle, 5348).

Cyperus ochraceus, VAIIL.

Lugares húmedos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Junio 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3724).

Cyperus patzcuarensis, Clarke.

Sobre las rocas sombrías. Bancos de lava cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4269).

Cyperus prolixus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 206; Kunth. Enum. Pl. 11. p. 79; Bæck. Linnæa xxxv. p. 593; Liebm. Mexicos Halvgr. p. 24.

Lugares húmedos, Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 10 de 1890 (C. G. Pringle, 3260).

Cyperus seslerioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 207; Kunth. Enum. Pl. m. p. 26; Berck. in Linnæa xxxv. p. 498.

Mesas cerca de Cusihuiriachie (Est. de Chimuanua), Agosto 29 de 1887 (C. G. Pringle, 1393).

Cyperus spectabilis, Schreg; Bock, in Linnaa xxxv. p. 605 (varietates): Clarke in Journ, Linn. Soc. xxi. p. 142.

Cyperus triceps, Nees in Linnæa xix, p. 697.

Cyperus manimæ, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 209; Liebm. Mexicos Halvgr. p. 31.

Cyperus asperrimus, Liebm. Mexicos Halvgr, p. 30, cum var. β. Cyperus scaberrimus, Nees in Linnæa xix, p. 697.

Cyperus divergens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 208.

Cañada de Rio Hondo (Est. de México), Agosto 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3100, 3161).

Cyperus surinamensis, Rotte. Descr. et Ic. p. 35, t. 6, fig. 5;
Beeck. in Linnau xxxv. p. 544; Clarke in Journ. Linn. Soc.
xxi. p. 116; Lieba. Mexicos Halvgr. p. 20.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Noviembre 15 de 1888 (C. G. Pringle, 1786).

Cyperus tristachyus, Всеск.

Lugares húmedos, cerea de Guadalajara, Julio 24 de 1893 (C. G. Pringle, 4446).

Cyperus uniflorus, TORR.

Llanos (Est. de Cumuanua), Septiembre 17 de 1886 (C. G. Pringle.....)

Cyperus viscosus, Ait. Hort. Kew. I. p. 59; Kuntil. Enum. Pl. II. p. 28; Bæck. in Linnæa xxxv. p. 547; Clarke in Journ. Linn. Soc. xxi. p. 114; Griseb, Fl. Brit. W. Ind. p. 563.

Terrenos húmedos. S. Antonio, à 2,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 5940).

Cyperus wrightii, BRITTON.

Sierra Madre (Est. de Chimuahua), Octubre 4 de 1888 (C. G. Pringle, 1397).

Kyllinga cæspitosa, Nees Cyper. Brasil. p. 12, excl. synon. kuntiana, ex Bœck. in Linnæa xxxv. p. 411 (varietates); Liebm. Mexicos Halvgr. p. 45.

Kyllinga pumila, a. humilis, Kuntн. ex Bœck. l. с.

Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 27 de 1893 (C. G. Pringle,.....)

Heleocharis atropurpurea, Kunth.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Octubre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 3857).

Heleocharis cancellata, Wars. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 170. Hoyancos húmedos de las mesas, cerca de S. Luis Potosf, Septiembre 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3269).

Heleocharis capitata, R. Br. Prodr. Fl. N. Hol. p. 225; Велтн. Fl. Austr. vii. p. 296; Веск. in Linnæa хххvі. p. 461; S. Wats. in Proc. Am. Acad. хvііі. p. 170; Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 228.

Eleogenus capitatus, Nees; Liebm. Mexicos Halvgr. p. 57.Praderas alcalinas. Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 4 de 1891 (C. G. Pringle, 3812).

Heleocharis geniculata, Rem. et Schult. Syst. Veg. II. p. 150; Kunth. Enum. Pl. II. p. 152; Beck. in Linnæa xxxvi. p. 469. Linnochloa geniculata, Liebm. Mexicos Halvgr. p. 56. var. densa, Beck.

Pantanos de Rio Grande de Santiago, cerca de Atequiza (Est. DE Jalisco), Mayo 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3124).

Heleocharis nodulosa, Schult. Mant. H. p. 87; Beck. in Linnea xxxvi. p. 468.

Eleogenus nodulosus, Nees Cyper, Bras. p. 104; Liebm. Mexicos Halvgr. p. 57.

Heleocharis mutata, SCHL. Bot. Zeit. 1849, p. 134?

Linmochloa mutata, Liebn. Mexicos Halvgr. p. 56?

Pantanos. Atequiza (Est. de Jalisco), Mayo 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3473).

Heleocharis palustris? (L.) REM. et Schult.

Pantanos de Río Grande de Santiago, cerca de Atcquiza (Est. DE JALISCO), Mayo 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3125).

Heleocharis subcancellata, CLARKE.

Lugares húmedos sobre los cerros, cerca de Guadalajara, Noviembre 14 de 1892 (C. G. Pringle, 4339).

Dichromena leucocephala, Michx. Fl. Bor-Am. 1. p. 37; Kunth. Enum. Pl. 11. p. 275; Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 229; Chapman, Fl. Southern U. S. p. 530; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 171.

Rhynchospora leucocephala, Bœck in Linnæa xxxvii. p. 532. Rhynchospora stellata, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 577.

Pantanos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3709).

Dichromena nervosa, Vall. Enum. Pl. II. p. 241.

Rhynchospora nervosa, Beeck. in Linnæa xxxvII. p. 529.

Dichromena ciliata, Vanl. Enum. Pl. п. р. 240; Кихти. Enum. Pl. п. р. 276; Liebn. Mexicos Halvgr. р. 59.

Rhynchospora vahliana, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 577.

Dichromena globosa, Rœм. et Schult. Syst. Veg. п. р. 90; Кихти. Enum. Pl. п. р. 276.

Dichromena pura, Nees Cyper, Bras. p. 112 in nota; Steud. Cyper, p. 135.

Rhynchospora pura, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 577.

Margenes de los manantiales calientes. Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Junio 26 de 1891 (С. G. Pringle, 3694).

Dichromena pringlei, BRITTON.

Suelo húmedo. Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 1.º de 1893 (C. G. Pringle, 5393).

Fimbristylis autumnalis, Rem. et Schult, Syst. Veg. II. p. 97; Kunth. Enum. Pl. II. p. 227; Bæck, in Linnæa xxxvII. p. 38; S. Wats, in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 171; Liebm. Mexicos Halvgr. p. 50; Schl. in Bot. Zeit. 1849, p. 136.

Scirpus autumnalis, Linn. Mant. p. 180.

Trichelostylis mucronulata, Torr. en Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York, m. p. 355.

Las Canons (Est. de S. Luis Potosí), Julio 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3437).

Fimbristylis capillaris, A. Gr. Mant. Bot. Northern. U. S. ed. 5, p. 567; S. Wars. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 171.

Fimbristylis capillacea, Hocnst.; Steud. Cyper. p. 111.

Scirpus capillaris, Linn. Mant. p. 321; Bœck. in Linnæa xxxvi. p. 759.

Isolepis capillaris, Rem. et Schult. Syst. Veg. п. р. 118; Кинтн. Enum. Pl. п. р. 211.

Scirpus tenuifolius, Rudge PI. Guian. p. 18, t. 22.

Oncostylis tenuifolia, LIEBM. Mexicos Halvgr p. 51.

Isolepis bufonia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 222.

Isolepis asperula, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 221; Jungh. in Linnæa vi. p. 26.

Oncostylis truncata, O. tenuifolia, O. dubia, O. ciliata, et O. arenaria, Nees Cyper. Bras. pp. 83-85.

Cerros (Est. de Chinuanua), Agosto 20 de 1885 (C. G. Pringle, 529).

Fimbristylis crassipes, Beck. in Linnaa xxxvIII. p. 392. Faldas de los cerros, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Julio 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3127).

Fimbristylis laxa, VAHL.

Suelo húmedo, llanuras cerca de Guadalajara, Septiembre 30 de 1889 (C. G. Pringle, 2300).

Scirpus cyperoides, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 461. Praderas húmedas, Flor de María (Est. de México), Agosto 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3173).

Scirpus heterocarpus, Watson in Proc. Am. Acad. xvii. p. 171. Llanos (Est. de Chihuahua), Octubre 7 de 1888 (C. G. Pringle, 1398).

Scirpus potosinus, CLARKE.

Bancos húmedos de las barrancas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 15 de 1890 (C. G. Pringle, 3175).

Scirpus pringlei, BRITTON n. sp.

Llanos cerca de la Sierra Madre (Est. de Chihuahua), Septiembre 15 de 1887 (C. G. Pringle, 1399).

Fuirena simplex, Vahl. Enum. Pl. II. p. 384; Kuxth. Enum. II. p. 183; Bœck. in Linnæa xxxvii. p. 105.

Fuirena obtusiflora, et F. schiedeana, Kunth. Enum. Pl. H. p. 183; Schl. in Linnæa xix. p. 69; Liebn. Mexicos Halvgr. p. 58. Lugares húmedos, Hacienda de Angostura (Est. de S. Luis

Ротоsí), Julio 26 de 1891 (С. G. Pringle, 3690).

Hemicarpha subsquarrosa, Nees Cyper. Bras. p. 61, t. 4, fig. 1; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 572; S. Wars. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 171; Torr. Bot. U. S. et Mex. Bound. Surv. p. 229; S. Wars. Bot. Calif. ii. p. 220.

Scirpus subsquarrosus, Mueillenb. Gram. p. 39.

Scirpus micranthus, Vaill. Enum. Pl. 11. p. 254; Bœck. in Linnæa xxxvi. p. 499.

Isolepis subsquarrosus, Schrad. in Schult. Mant. II. p. 64. Hemicarpha drummondii, Nees Cyper. Bras. p. 62. Isolopis caspilula, Lieba. Mexicos Halvgr. p. 49. Lugares húmedos (Est. de Chinuanua), Septiembre 25 de 1886 (C. G. Pringle,.....)

Tribus III. RHYNCHOSPOREÆ.

Rhynchospora eximia, Beck. in Linnea xxxvii. p. 601.

Dichromena schiedeana, Kuxtii. Enum. Pl. ii. p. 282; Sciii. in Bot. Zeit. 1849, p. 161.

Chielospora ferruginea, Juxch. in Linnæa vi. p. 28, partim. Psilocarya schiedeana, Liebn. Mexicos Halvgr. p. 60.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Octubre 21 de 1889 (C. G. Pringle, 2299).

Rhynchospora kunthii, Ners in Linnæa ix. p. 297; Kunth. Enum. Pl. n. p. 296; Schl. in Bot. Zeit. 1849, p. 165; Liebm. Mexicos Halvgr. p. 67; Beeck. in Linnæa xxxvn. p. 588.

Praderas húmedas. Valle de Toluca (Est. de Mèxico), Agosto 27 de 1892 (C. G. Pringle, 4212).

Rhynchospora mexicana, Steub. Cyper. p. 144.

Haplostylis mexicana, Liebm. Mexicos Halvgr. p. 61. Rocas porfiditicas, secas y arenosas, cerca de Guadalajara, Septiembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3833).

Rhynchospora schiedeana, Kuntii. Enum. Pl. n. p. 300; Beck. in Linnea xxxvii. p. 636.

Chætospora, sp., Jungii. in Linnæa vi. p. 29.

Calyptrostylis schiedeana, Liebn. Mexicos Halvgr. p. 65.

Praderus cespitosas. Sierra de S. Felipe, á 7,000 piés (Est. DE OANACA), Septiembre 21 de 1894 (C. G. Pringle, 4911).

TRIBUS V. SCLERIEÆ.

Scleria reticularis, Michix.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Octubre 22 de 1889 (C. G. Pringle, 2295).

TRIBÚS VI. CARICEÆ.

- Uncinia mexicana, Steuo. Cyper. p. 243; Clarke in Journ. Linn. Soc. xx. p. 400.
 - Uncinia jamaicensis, Liebn. Mexicos Halvgr. p. 84 Всеск. in Linnæa xll. p. 347, partim, non Pers.
 - Uncinia phleoides, C. A. MEYER in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 23), non Pers.
 - Barrancas húmedas en las selvas de encinas, Sicrra de Reyes, á 8,500 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 9 de 1894 (C. G. Pringle, 6031).
- Carex anisostachya, Liebm. Mexicos Halvgr. p. 78; Steud. Cyper. p. 188; Walp. Ann. iii. p. 705; Bœck. in Linnæa xl. p. 403.
 - Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 25 de 1894 (C. G. Pringle, 4838).
- Carex cladostachya, Wahl.; Kunth. Enum. Pl. 11. p. 510; Beck. in Linnæa xl. p. 361; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 580.
 - Carex mexicana, Prest. Reliq. Hænk. 1. p. 204; Liebm. Mexicos Halvgr. p. 88; Boott. Ill. Carex, t. 512; C. A. Meyer in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 22).
 - Carex polystachya, Boott. III. Carex, p. 152, tt. 490, 491 et 492 (fide Bœckeler, 1. c.) nec Swartz et Wahl.
 - Carex hartwegii, Boott. Ill. Carex, tt. 509, 510.
 - Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosi), Septiembre 30 de 1890 (C. G. Pringle, 3295); Sierra de S. Felipe, á 7,500 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4839).
- Carex densa, BAILEY.
 - Praderas bajas, Flor de María (Est. de México), Octubre 3 de 1892 (C. G. Pringle, 4275); Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 4930).
- Carex halleriana, Asso; Boott. III. Carex, p. 128, tt. 415, 416; Bœck. in Linnæa xll. p. 201.
 - Carex planostachys, Kunze Suppl. 138, t. 35; Steud. Cyper. p. 232.

Laderas boscosas y pedregosas, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3219).

Carex muehlenbergii, Schkuhr. f. 178; Boott. Ill. Carex, p. 124, t. 399, et β. enervis, t. 400; Bœck. in Linnæa xxxix. p. 80.

Laderas, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3126).

Carex oaxacana, BAILEY.

Carex olivacea, Liebm. non Boott.

Carex monticola, BŒCK. nec Dew.

Sierra de S. Felipe, de 9-10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4842).

Carex polystachya, VAIIL.

Sierra de S. Felipe, de 6-7,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 27 de 1894 (C. G. Pringle, 4840).

Carex pringlei, Bailey, n. sp.

Á la orilla de las corrientes, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 4 de 1891 (C. G. Pringle, 3801).

Carex spilocarpa, Steud. Cyper. p. 195.

Carex maculata, Liebm. Mexicos Halvgr. p. 80; Walp. Ann. in. p. 706.

Bancos húmedos, montañas cerca de Salazar (Est. de México), Julio 10 de 1892 (C. G. Pringle, 4139).

Carex schiedeana, Kunze, p. 119, t. 30; Всеск. in Linnæa xl. p. 385; Steud. Cyper. p. 208.

Laderas sombrías, Paso de S. José (Est. de S. Luis Potosí), Julio 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3218h).

Carex straminea, Schkuhr. f. 34 et 174; Bœck. in Linnæa xxxix, p. 117 (varietates).

Carex leporina, var bracteata, Liebm. Mexicos Halvgr. p. 76. Carex fænea, Willd.; Boott. III. Carex, p. 118, tt. 375 et 376. Por las corrientes. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Junio 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4685).

Carex turbinata, Liebm. Mexicos Halvgr. p. 82; Walp. Ann. in. p. 707; Steud. Cyper. p. 196.

Lugares fríos, Sierra de Tequila (Est. DE Jalisco), Julio 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4432).

ORDO CCVII, GRAMINEÆ.

TRIBUS I. MAYDEÆ.

Euchlæna luxurians, Durieu de Maisonneuve et Ascherson in Bull. Mens. Soc. Linn. Par. 1877, n.º 14, p. 105; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 70; Bot. Mag. t. 6414.

Reana luxurians, Dur. DE MAIS. in Bull. Soc. d'Aclimat. ser-

2, 1x. p. 581.

Euchlæna mexicana, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. p. 467, partim, non Schrad.

N. V. Maiz primitivo, Acccé. Mex. Teoxintli.

La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Barcena, 139).

Euchlæna mexicana, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gætt. ex Linnæa vill., Litter-Ber. p. 25; Aschers. in Verhandl. Bot. Verein Prov. Brandenb. 1875, p. 76, et in Bull. Mens. Soc. Linn. Par. 1877, n.º 14, p. 105, et Bot. Zeit. 1877, pp. 521-526; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 70.

Euchlæna giovanninii, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. p.

467, et l. c. p. 69.

Reana giovanninii, Brign. Ind. Sem. Hort. Modena, 1850; WALP. Ann. III. p. 711.

Cerros pedregosos. Querétaro, Octubre 25 de 1886 (C. G. Pringle, 4319).

Tripsacum dactyloides, Linn. Sp. Pl. ed. 2, p. 1378; Kunth. Enum. Pl. I. p. 469; Hackel in Mart. Fl. Bras. II. 3, p. 316; A. Gr. Man. Bot. Northern U. S. ed. 5, p. 650; Benth. Pl. Hartw. p. 28.

Tripsacum monostachyum, WILLD. Hort. Berol. 1. t. 1; GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 557.

Tripsacum lanceolatum, Rupr. in Benth. Pl. Hartw. p. 347 (nomen tantum); Journ. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 68, cum β monostachys (descriptio).

Tripsacum compressum, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. p. 465.

var. angustifolium, Scribn., n. var.

Cerros pedregosos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 14 de 1891 (C. G. Pringle, 3811).

Coix lachryma, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 972; Kunth Enum. Pl. 1. p. 20; Döll. in Mart. Fl. Bras. n. 2, p. 30, t. 10; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 561; Lamk. Ill. t. 50.

Coix arundinacea, Lam. Encycl. III. p. 422, non Koenig. in Willd.; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvIII. p. 173; Steud. Gram. p. 9.

N. V. Lágrimas de S. Pedro.

Cultivada en el jardín del Museo Nacional. Abril de 1888 (M. Urbina).

TRIBUS II. ANDROPOGONEÆ.

Erianthus saccharoides, Michx. Fl. Bor-Am. I. p. 55; Hack. in Mart. Fl. Bras. II. 3, p. 257 (varietates plures).

Andropogou alopecuroides, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 1045, excl. svn. Stoauci, ex Hack.

Anthoxanthum giganteum, WALT. Fl. Carol. p. 65.

Erianthus alopecuroides, et E. contortus, Elliott. Sketch. pp. 38 et 40; Chapm. Fl. Southern U. S. p. 582.

Erianthus brevibarbis, Michx. Fl. Bor-Am. 1. p. 55.

Saccharum giganteum, Pers. Syn. Pl. 1. p. 103.

Andropogon erianthus, Link. Hort. Berol. i. p. 243.

Spodiopogon foliatus, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 52.

Spodiopogon vaginatus, Fourn. I. c. p. 53?

Faldas de las montañas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porosi), Junio 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3135).

Rottboellia compressa, Linn. f.

var. fasciculata, HACKEL.

Bordes del Rio, Cañon de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3132).

Elionurus barbicularis, HACK.

Cerros cerca de Chihuahua, Agosto 5 de 1885 (C. G. Pringle, 423).

Andropogon acuminatus, ex Ind. Durand. p. 464.

Heteropogon acuminatus, Trin. in Mem. Acad. Sc. St. Petersb. ser. 6, II. 1833, p. 254, ex Hack. in Mart. Fl. Bras. II. 3. p. 268. Heteropogon scrobiculatus, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 64.

Andropogon melanocarpus, Elliott. Sketch. I. p. 146; Chapm. Fl. Southern. U. S. p. 582,

Cymbopogon melanocarpus, Spreng. Syst. Veg. I. p. 289.

Trachypogon scrobiculatus, Nees Agrostol. Bras. p. 347.

Andropogon scrobiculatus, Vinen France, M. et al. 707. Sprenger

Andropogon scrobiculatus, Kunth Enum. Pl. 1. p. 507; Steud. Gram. p. 381.

Cañadas, Montes de Mapula (Est. de Синцианиа), Octubre de 1886 (С. G. Pringle, 820).

Andropogon brevifolius, Swartz. Fl. Ind. Occ. 1 p. 209; Kuntii Revis. Gram. II. p. 563, t. 196 et Enum. Pl. I. p. 488; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 558; Hack, in Mart. Fl. Bras. II. 3, p. 302. Andropogon oblusifolius, Poir. Encycl. Suppl. 1. p. 583.

Andropogon tenellus, PRESL. Relig. Hænk. 1. p. 335.

Andropogon debilis, Kuntii Enum. Pl. 1. p. 488; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 61.

Andropogon floridus, Trin. in Mem. Acad. St. Petersb. 1833, p. 205; Steud. Gram. p. 366.

Schizachyrium brevifolium, NEES Agrostol. Bras. p. 332. Suelo humedo, llanuras de Guadalajara, Noviembre 5 de 1889

(C. G. Pringle, 2760).

Andropogon condensatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 188;
Ch. et Schl. in Linnæa vi. p. 39; Rupr. in Bull. Acad. Brux.
Ix (reprint. p. 18); Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 60; Hack.
in Mart. Fl. Bras. II. 3, p. 296; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 558.

Schizachyrium condensatum, Nees Agrostol. Bras. p. 333. Cymbopogon condensatus, Spreng. Syst. Veg. 1. p. 289.

Andropogon scoparius, Prest. Reliq. Hænck. 1. p. 338 ex Fourn. et Hack.

Andropogon densus, Desv. in Ham. Prodr. p. 8 ex Fourn. Andropogon paniculatus, Kunth Enum. Pl. 1. p. 494; Steud. Gram. p. 391.

Andropogon Ulotzkyi, Steud. Gram. p. 384; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 61 ex Hack.

Bordes y capas arenosas, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosí), Junio 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3134).

Andropogon contortus, Linn. Sp. Pl. p. 1480; Kunth Enum. Pl. 486; Benth. Pl. Hartw. p. 28.

Andropogon allionii, DC. Fl. Franc. III. p. 97; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 185.

Heteropogon hirtus, et H. glaber, Pers. Syn. Pl. 11. p. 533.

Heteropogon contortus, Roem, et Schult, Syst. Veg. 11. p. 836; Nees in Linnea vii. p. 284, et xix. p. 695; Presl. Reliq. Henk. 1. p. 334; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 64; Hack. in Mart. Fl. Bras. 11. 3, p. 267.

En Morales, cerea de S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 1051); Sta. Cruz, Valle de Túxpan (Est. de Jalisco), 1886 (М. Bårcena, 339, 708); Cerros (Еst. de Синианиа), Abril 19 de

1885 (C. G. Pringle,...)

Andropogon elythrophyllus, Steud. Gram. 378; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 57.

Lugares agrestes y calizos, Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 20 de 1889 (C. G. Pringle, 2702).

Andropogon leucopogon, Nees in Linnaa xix, p. 694; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 58, varietates α . et β .

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffuer, 1056).

Andropogon macrourus, Michx. Fl. Bor-Am. 1. p. 36; Chapm. Fl. Southern U. S. p. 382; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 60. Anatherum macrourum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 559. var. corymbosus, Chapm.

S. Antonio (Est. de Oaxaca), Septiembre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 5105).

Andropogon myosurus, Prest. Reliq. Hænk. i. p. 337; Kunth Revis. Gram. t. 199; Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. 3, p. 300; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 62,

Schizachyrium niyosurus, Nees in Linnæa xix. p. 695. Andropogon hirtiflorus, Kunth Revis. Gram. p. 569 t. 198. Schizachyrium hirtiflorum, Nees Agrostol. Bras. p. 334.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 1050).

var. feensis, Hack.

Suelo seco y arenoso, cerca de Guadalajara, Septiembre 9 de 1893 (C. G. Pringle, 4514).

Andropogon nutans, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 1045; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 56.

Sorghum nutans, A. Gr. Man. Bot. Northern U. S. ed. 2, p. 284; HACK. in Mart. Fl. Bras. 11, 3, p. 276 (sub-sp. linneanum).

Andropogon incompletus, Prest. Reliq. Hænk. 1. p. 342; Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 178.

Sorghum secundum, Chapm. Fl. Southern U. S. p. 583 ex Fournier.

Chrysopogon nutans, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. p. 73. var. incompletus, Stack. ex hb. Pringle.

Sta. Cruz de Duque, Valle de Tuxpan (Est. de Jalisco), 1886 (M. Bárcena, 338, 704); Cerros cerca de Guadalajara, Octubre 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2466).

Andropogon piptatherus, HACK. ex lib. Pringle.

var. palmeri, Наск.

Lugares secos, Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 24 de 1893 (C. G. Pringle, 4612).

Andropogon provincialis, Lam. var.

Praderas, Valle de Toluca (Est. de México), Octubre 3 de 1892 (C. G. Pringle, 4294); Cerros calizos, Las sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4781).

Andropogon saecharoides, Swartz, ex hb. Pringle.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Mesas (Est. de Chindahua), Octubre 18 de 1888 (C. G. Pringle,.....)

Andropogon sorghum, BROT. ex hb. Pringle.

var. jalapensis, HACK.

Cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 10 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Andropogon virginicus, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 1046; Kunth Enum. Pl. 1, p. 495; Hack. in Mart. Fl. Bras. 11. 3, p. 285; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvin. p. 174.

Anatherum virginicum, Spreng. Pug. n. p. 16 ex Hackel.

Anatherum domingense, Rom. et Schult. Syst. Veg. 11. p. 809; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 559.

Andropogon domingensis, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 61. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 1049).

Andropogon sp.

La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 157).

Andropogon sp.

Barranca cerca de Guadalajara, Noviembre 19 de 1889 (C. G. Pringle, 2755).

TRIBUS III. ZOYSIEÆ.

Anthephora elegans, Schreb. Beschr. Gräs. n. p. 105, t. 44; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 116; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 556; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 51.

Cenchrus lævigatus, Trix. Diss. n. p. 74.

Bancos de las corrientes, Cuicatlán, á 2,000 piés (Est. DE OAXACA), Noviembre 6 de 1894 (C. G. Pringle, 6030).

Hilaria cenchroides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 117, t. 35; Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 21); Bentu. Pl. Hartw. p. 28; Nees in Linnaa xix. p. 686; Peyr. in Linnaa xxx. p. 3; Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 72.

Anthephora belangeri, Steud. Gram. p. 111, ex Munro MSS. var. ciliatus, Scribn., n. var.

Valle de Río Grande de Santiago en Atequiza (Est. de Jalisco), Mayo 17 de 1890 (C. G. Pringle, 3128).

Ægopogon cenchroides, H. B. K. in Willd, Sp. Pl. iv. p. 899; 11. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 132, t. 42; Ch. et Schl. in Linnea vi. p. 36; Rupp. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 6); Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 72.

Ægopogon trisetus, et Æ. quinquesetus, Ræm. et Schult. Syst. Veg. n. p. 805.

Ægopogon setifer, Nees in Linnæa xix. p. 691.

Ægopogon multisetus, Griseb. ex Fournier I. c.

Hymenothecinm trischun, et H. quinquesetum, Lag. Elench. Hort. Matr. Gen. et Sp. Nov. p. 4.

Cynosurus gracilis, Cav. 11. R. M. 1. t. 5, fig. 3, ex Lag.

Atotonileo el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Luis Potosí, 1876 (G. Schuffner, 1000); Volcán de fuego (Est. de Colma), 1886 (M. Bárcena, 404, 415); Cerros cerca de Guadalajara, Septiembre 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3964).

Ægopogon geminiflorus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 133, t. 143; Rupr. in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 5); Nees in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 225; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 71. Schellingia tenera, Steuo. in Flora. 1850, p. 232, t. 1, et Syn. Gram, p. 214.

Ægopogon unisetus, Ræm. et Schult. Syst. Veg. n. p. 805. Hymenothecium unisetum, et H. tenellum, Lag. Elench. Hort.

Matr. Gen. et Sp. Nov. p. 4.

Cynosurus tenellus, Cav. H. R. M. I. t. 5, fig. 2, ex Lag.

La Bufa, Cusihuiriachie (Est. de Chinuanua), Agosto 31 de 1887 (C. G. Pringle, 1407).

var. abortivus, Fourn.

Capas, Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 27 de 1893 (C. G. Pringle, 5396).

Ægopogon gracilis, VASEY.

Suelo delgado de los bordes, Montes de Mapula (Est. de Chinuahua), Octubre 25 de 1886 (C. G. Pringle, \$23),

Tragus racemosa, Hall. Stirp. Helv. II. p. 203; Döll. in Mart. Fl. Bras. II. 2, p. 122, t. 18.

Lappago racemosa, Willd. Sp. Pl. 1. p. 484; Kuntii Enum.
 Pl. 1. p. 170, et Revis. Gram. t. 120; H. B. K. Nov. Gen. et
 Sp. 1. p. 119; Benth. Pl. Hartw. p. 28.

Tragus occidentalis, Nees Agrostol. Bras. p. 286 et in Linnæa xix. p. 668; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 4.

Lappago aliena, Spreng. Neue Entdeck. III. p. 15; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 557.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 1047); Cerros (Est. DE OAXACA), Septiembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 5564).

Schaffnera gracilis, Bentu. in Hook. Ic. Pl. xiv. p. 59, t. 1378.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1070).

TRIBUS IV. TRISTEGINEÆ.

Arundinella deppeana, NEES in Bonplandia 1855, p. 84, et in Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 224, vix Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 54.

Arundinella auletica, Rupr. in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 16, nil nisi nomen); Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 54 (descriptio).

Arundiuella latifolia, et A. scoparia, Fourn. 1. e. pp. 54 et 55. Thysanachne scoparia, Prest. Symb. Bot. p. 12, t. 6, et Reliq. Hienk. 1. p. 253.

Bances pedregosos de las corrientes, Cañón de Tamasopo (Est. de S. Luis Porosí), Junio 24 de 1890 (C. G. Pringle, 3133).

TRIBUS V. PANICEÆ.

Paspalum conjugatum, Berg. Act. Helv. vii. p. 129, t. 8; Kuntii Enum. Pl. i. p. 51; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 541; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 6; Cii. et Sciil. in Linnæa vi. p. 31; Trin. Sp. Gram. Ic. et Descr. t. 102.

Paspalum renggeri, Steud. Gram. p. 17.

Suelo húmedo, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Julio 8 de 1890 (C. G. Pringle, 3129).

Paspalum distichum, Linn. Amæn. Acad. v. p. 391; Kuntu Enum. Pl. t. p. 52; Benth. Fl. Austr. vn. p. 460; Trin. Sp. Gram. Ic. et Deser. i. t. 112; Munro MSS. in Bibl. Kew; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 541.

Paspalum littorale, R. Br. Prodr. Fl. N. Holl. p. 188.

Paspalum vaginatum, Swartz Prodr. p. 21, et Fl. Ind. Occ. 1. p. 135; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 6; Trin. Sp. Gram. Descr. et Ic. 1. t. 120; Thiele in Linnæa 1x. p. 308.

N. V. Grama.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1071); Praderas alcalinas. Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Junio 26 de 1891 (C. G. Pringle, 3695).

Paspalum filiforme, Flügge Monogr. p. 139; Kuntil Enum. Pl. 1. p. 46, excl. syn. Walt. et Poir. ex Fournier Mex. Pl. Enum. Gram. p. 7.

Pauicum filiforme, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 57; Chapman Fl. Southern U. S. p. 572.

Digitaria filiformis, MÜHLENB.; GRISEB. Fl. Brit. W. Ind. p. 543. Suelo arcnoso y delgado, cerros de las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 1.º de 1894 (C. G. Pringle, 4942).

Paspalum gracile, Rudge Pl. Guian. p. 20, t. 26; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 5.

Lugares bajos, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Noviembre 9 de 1890 (C. G. Pringle, 3343).

- Paspalum humboldtianum, Flügge Monogr. p. 67; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 86, t. 23; Ch. et Schl. in Linnea vi. p. 31; Kunth Enum. Pl. 1. p. 42; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 472.
 - Paspalum ciliatum, Rupr. in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 12), non H. B. K.
 - Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 1053).
- Paspalum lentiginosum, Prest. Reliq. Hæntk. r. p. 218; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 9.
 - Paspalum virgalum, CH. et SCHL. in Linnæa, vr. p. 32; RUPR. in Bull. Acad. Brux. IX (reprint. p. 12), non Linn. nec Griseb. fide Fournieri.
 - N. V. Patacite, (pastura.)
 - Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bârcena, 524, 526, 707); Praderas alcalinas, Hacienda de Angostura (Est. de S. Luis Potosí), Julio 14 de 1891 (C. G. Pringle, 3764).
- Paspalum notatum, Flügge Monogr. p. 106; Ch. et Schl. in Linnæa vi. p. 31, partim; Kunth Enum. Pl. 1. p. 51; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 6.
 - S. Pedro (Est. de Jalisco), Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 72); Cerros, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3774).
- Paspalum pittieri, HACK. ex hb. Pringle.
 - Lugares húmedos cerca de Guadalajara, Octubre 7 de 1891 (C. G. Pringle, 4039).
- Paspalum planifolium, FOURN. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 10. Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Campos, Las Canoas (Est. de S. Luis Porosi), Julio 22 de 1891 (C. G. Pringle, 3779).
- Paspalum plicatulum, Michx. Fl. Bor-Am. i. p. 45; Ch. et Schl. in Linnæa vi. p. 32; Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 11); Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 10; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 542.
 - Paspalum undulatum, Poir. in Lam. Encycl. v. p. 29; Chapm. Fl. Southern U. S. p. 571.
 - Paspalum antillense, Husnor. Enum. Glum. p. 13.
 - Laderas, Las Canoas (Esr. de S. Luis Potosí), Julio 18 de 1891 (C. G. Pringle, 3772).

- Paspalum pyramidale, Nees Agrostol. Bras. p. 77; Kunth Enum. Pl. 1, p. 43.
 - Flotando en el agua, cerca de Guadalajara, Octubre 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3854).
- Paspalum tenellum, Willib. Enum. Pl. Hort. Berol. i. p. 89; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 12.
 - Paspalini elegans, Fl.CGGE, Monogr. p. 183, non Jacq. Ecl. t. 23. Paspalini affine, Steub. Gram. p. 24?
 - Praderas alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Porosf, Julio 10 de 1891 (C. G. Pringle, 3755).

Eriochloa lemmoni, VASEY & SCRIB.

- Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 12 de 1891 (C. G. Pringle, 4047).
- Eriochloa polystachya, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 95. t. 31; Kunth Enum. Pl. 1. p. 72; Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. p. 39, et in Benth. et Hook. Gen. Pl. 111. p. 1099 (varietates).
 - Eriochioa punctata, Desv. ex Hamilt. Prodr. Pl. Ind. Occ. p. 5; Kenth Enum. Pl. i. p. 72; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 514.
 - Hetopus punctatus, Nees Agrostol, Bras. p. 16; Fourn. Mex. Pl. Erum. Gram. p. 13.
 - Eriochloa acuminata, Kuxrii Enum, Pl. 1. p. 72.
 - Piptatherum acuminatum, Prest. Relig. Hænk, I. p. 221.
 - Helopus acuminatus, et H. gracilis, Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 13.
 - Valle cerca de Chihuahua, Septiembre 4 de 1885 (C. G. Pringle, 481).

Isachne disperma, DELL.

- Cerros cerca de Orizaba (Est. de Veracruz), Febrero 7 de 1895 (C. G. Pringle, 5570).
- Panicum brevifolium, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 59; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 21.
 - Panicum trichoides, Swartz Prodr. Fl. Ind. Occ. p. 24; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 105; Kunth Enum. i. p. 112; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 552.
 - Lugares arenosos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 23 de 1891 (C. G. Pringle, 3828).

Panicum cæspitosum, Swartz Fl. Ind. Occ. i. p. 146; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 18; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 446 (sub. *P. prostrata*); S. Wats, in Proc. Am. Acad. xviii. p. 172.

En los Morales, cerca de S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1080).

Panicum divaricatum, Linn, in Elmgr. Pl. Jamaic. Pugil. n.º 9; Kunth Gram. i. t. 29; Ch. et Schl. in Linnea vi. p. 32; Steud. Gram. p. 69; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 32 (varietates plures).

Cerros pedregosos, las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Agosto 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3808).

Panicum leucophæum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 97; Kuntu Enum. Pl. 1, p. 124; Trin. Sp. Gram. Ic. et Deser. t. 220; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii, p. 172.

Tricholæna insularis, Griser. Fl. Brit. W. Ind. p. 557; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 35.

Panicum saccharoides, William non Kunth.

Panicum duchassaingii, Steud. Gram. p. 93.

Cerca de los Morales, S. Luis Potosi, 1870 (G. Schaffner, 1064).

Panicum obtusum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 98; Kentil Revis. Gram. t. 116; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 27; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 172. S. Luis Potosf, 1876 (G. Schaffner, 1039).

Panicum paspalodes, Pers. Syn. Pl. I. p. 81; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 18; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 545.

Panicum brizoides, Lam. III. 1. p. 170; Presl. Reliq. Hienk. 1. p. 30, fide Fournier.

Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Septiembre de 1876 (M. Bárcena, 525); En la superficie del lago de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Octubre 22 de 1890 (C. G. Pringle, 3336).

Panicum plantagineum, Link. Hort. Berol. 1. p. 206; Döll. in Hart. Fl. Bras. 11. 2, p. 186; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 18.

Panicum leandri, TRIN. Sp. Gram. Ic. et Descr. t. 335.

Panicum distans, SALZM. in Steud. Gram. p. 61.

En los campos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosí), Agosto 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3904).

- Panicum rhizophorum, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 31. Lugares sombrios y pedregosos, barranca de las Canoas (Est. DE S. Lus Porosb, Agosto IS de 1801 (C. G. Pringle, 3817).
- Panieum sulcatum, Aubl., Guian, I. p. 50; Griseb Fl. Brit. W. Ind. p. 517; Döll. in Mart. Fl. Bras. II. 2, p. 151, 126.

Por las corrientes, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Octubre 31 de 1891 (C. G. Pringle, 3921).

Panicum sp.

Cerea del P. Agrostoides, Munt.

S. Antonio (Est. de Oaxaca), Septiembre 2 de 1894 (C. G. Pringle, 5573).

Ichnanthus pallens, Döll. in Mart. Fl. Bras. H. p. 200.

Panicum pallens, Swartz Prodr. Fl. Ind. Oce. p. 23; Trin. Sp. Gram. Ic. t. 211; Griser, Fl. Brit. W. Ind. p. 550; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 30.

Panicum hemignostum, Steud. Gram. p. 77, fide Fournier.

Bosques fértiles, barranca de las Canoas (Est. de Jalisco), Agosto 22 de 1891 (C. G. Pringle, 3827).

Oplismenus crus-galli, Kuntu Gram. 1. p. 44 et Enum. Pl. 1. p. 143; Trin. Sp. Gram. 1c. et Deser. tt. 161 et 162; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 39.

Panicum crus galli, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 56; Döll. in Mart. Fl. Bras. u. 2, p. 140.

Oplismenns erns-pavonis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 108; FOURN. 1. c.

Panicum crus-pavonis, Nees Agrostol. Bras. p. 259.

N. V. Camelote, Zacate de Manati.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), 1886 (M. Bárcena, 714 et 715).

Oplismenus liebmanni, Four. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 38. Sierra de S. Felipe, à 7,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 5 de 1894 (C. G. Pringle, 4944).

Setaria imberbis, Rom. et Schult, Syst. Veg. II. p. 891; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 46 (varietates).

Panicum imberbis, Poir. Encycl. Suppl. iv. p. 272; Rupr. Bull. Acad. Brux. ix (reprint, p. 16); Döll. in Mart. Fl. Bras. ii. 2, p. 156.

Setaria purpurascens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 110; Cn. et Schl. in Linnæa vi. p. 35.

Panicum purpurascens, Nees Agrostol. Bras. p. 240. S. Luis Potosf, 1877 (G. Schaffner, 1042).

Setaria uniseta, Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 43.

Panicum uniselum, Trix; Steud. Gram. p. 173; Schl. in Linnæa xxxi. pp. 396, 398.

Urochloa uniseta, Prest. Reliq. Hænk. 1. p. 319.

Ixophorus unisetus, Schl. in Linnæa xxxi, p. 421.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1043, 1044); Cerros (Est. DE CIMIUANUA), Agosto 25 de 1885 (C. G. Pringle,)

Setaria verticillata, BEAUV. in hb. Pringle.

Valle de Oaxaca, á 5,200 piés. Septiembre 22 de 1894 (C. G. Pringle, 4920).

Cenchrus tribuloides, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 1050; NEES Agrostol. p. 288; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 51. N. V. Huisapole.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 1046); Colomitos (Est. DE Jalisco), Octubre de 1886 (M. Barcena, 81).

Pennisetum bambusiforme, HEMSL.

Gymnothrix bambusiformis, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 48.

Tallos de 6-10 piés; panojas de 2-3 piés de largo. Sitios pedregosos. Barranca de Metlac, à 3,000 piés (Est. de Vera-CRUZ), Enero 29 de 1895 (C. G. Pringle, 6075).

Pennisetum crinitum, Scribn. in hb. Pringle.

Bancos secos, Sierra de S. Felipe, à 7,500 piès (Est. de Oaxaca), Octubre 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4962).

Pennisetum mexicanum, Hemsi., Biol. Cent. Am. Bot. in. p. 508. $Gymnothrix\ mexicana, {\tt et}\ G.grisebachiana, {\tt Fourn.Mex.Enum}.$ Gram, p. 48.

Praderas húmedas, cerca de Morelia (Est. de Michoacán), Octubre 26 de 1892 (C. G. Pringle, 4316).

Pennisetum multiflorum, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 49. Lugares húmedos de la Barranca, cerca de Guadalajara, Septiembre 15 de 1891 (C. G. Pringle, 3849).

Pennisetum setosum, Rich. in Pers. Syn. Pl. 1. p. 72; Nees Agrostol, Bras. p. 282; Trin. Sp. Gram. Ic. et Descr. t. 20;

Griseb. Fl. Brit, W. Ind. p. 555; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 49.

Pennisetum purpurascens, H. B. K. Nov, Gen. et Sp. i. p. 113; Cn. et Schl., in Linnea vi. p. 36.

La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 140, 341).

Pennisetum tristachyum, Steud. Gram. p. 103.

Gymnothrix tristachya, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 113, vn. i. 678; Foeks, Mex. Pl. Enum. Gram. p. 48.

Gymnothrix distachya, Fourn. 1. c.

Pennisetum distachyum, Rupr. in Bull. Acad. Brux, ix (reprint, p. 16).

Canon. Cuicatlán, á 2,000 piés (Est. de Oaxaca), Noviembre 7 de 1894 (C. G. Pringle, 5558).

Olyra latifolia, Linn. Amœn. Acad. v. p. 408; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 535; Benth. Bot. Voy. "Sulphur," p. 177; Döll. in Mart. Fl. Bras. n. 2, p. 316; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 3. Olyra paniculata, Swartz Observ. Bot. p. 347.
Micos (Est. pe S. Luis Potos), Julio 31 de 1891 (C. G. Printer)

gle, 3795).

TRIBUS VI. ORVZEÆ.

- Luziola peruviana, Pers. Syn. Pl. II. p. 575; Kunth Enum. Pl. I. Suppl. p. 9; Döll. in Mart. Fl. Bras. II. 2, p. 17, t. 5; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 1; Griseß. Fl. Brit. W. Ind. p. 535.
 Luziola mexicana, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. p. 199.
 Agua superficial, cerca de Guadalajara, Octubre 2 de 1891 (C. G. Pringle, 3867).
- Leersia hexandra, Swartz Prodr. Fl. Ind. Occ. p. 21; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 535; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 2. Leersia mexicana, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 195; Kunth Gram. 1. p. 179, t. 1.

Oryza hexandra, et O. mexicana, Döll. in Mart. Fl. Bras. u. 2, p. 10.

Agua superficial del Lago de Pátzeuaro (Еsт. DE Місноаса́я), Octubre 29 de 1890 (С. G. Pringle, 3330).

TRIBUS VII. PHALARIDEÆ.

Hierochlæ mexicana, Bentil. in Journ. Linn. Soc. xix. p. 77, et in Benth. et Hook. Gen. Pl. III. p. 1139.

Ataxia mexicana, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 7), nomen tantum; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 71, descriptio.

Grietas secas, bajo los pinos. Sierra de S. Felipe, á 9,500 piés (Est. de Oaxaca), Junio 22 de 1894 (C. G. Pringle, 4700).

TRIBUS VIII. AGROSTIDEÆ.

- Aristida divaricata, Humb. et Bonpl. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvm. p. 174.
 - S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 1057); S. Pedro (Est. DE JALISCO), Septiembre de 1886 (M. Bårcena, 22, 71, 139).
- Aristida purpurea, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837), ex Trin. et Rupr. Sp. Gram. Stip. p. 107 (β. berlandieri); Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 79.

Cerros y mesas (Est. de Chimuahua), Agosto 15 de 1885 (C. G. Pringle,...); Sitios agrestes y pedregosos, Micos (Est. de S. Luis Potosi), Agosto 1.º de 1891 (C. G. Pringle, 3790).

Aristida scabra, Kunth Revis, Gram. 1. p. 62; et Enum. Pl. 1. p. 193.

Muchlenbergia scabra, Trin. et Rupr. Sp. Gram., Stip. p. 183.

Streptachne scabra, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 80.

Cerros calizos, Las Palmas (Est. de S. Luis Potosi), Julio de 1891 (C. G. Pringle, 3776).

Aristida setifolia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 122; HACK. in Mart. Fl. Bras. II. 3, p. 22, cum. var. β. grandiflora.

Aristida bromoides, H. B. K. loc. cit.; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 174.

Aristida coarctata, H. B. K. loc. cit.; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 79.

Chætaria setifolia, C. bromoides, et C. coarctata, Rem. et Schult. Syst. Veg. н. р. 396.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1066); Atemajac, Valle de Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 23). Aristida sp.

Volcán de fuego, a 3,500 metros, 1886 (M. Bárcena, 405, 406 v 702).

Aristida sp.

Cerca de la A. scabra, Kuntu.

Cerros cerca de Oaxaca, á 5,300 piés, Septiembre 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4857).

Stipa avenacca, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 78; Kunth Enum. Pl. 1. p. 181; A. Gr. Man. Bot. Northern. U. S. ed. 5, p. 617; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 174.

Barranea de Río Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel);

S. Luis Potosí, 1876 G. Schaffner, 1055).

Stipa jarava, Beauv. Agrostogr. p. 19, t. 6, fig. 3; Trin. et Rupr. Sp. Gram. Stip. p. 42; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 76.

Jarava ichu, Ruz et Pav. Prodr. Fl. Peruv. p. 2, t. 1.

Stipa eriostachya, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 127, t. 41.

Stipa ichu, Kuxtu Revis. Gram. 1. p. 60.

Stipa pungens, Nees et Meyex in Mey. Itin. 1. p. 484.

Stipa gynerioides, Puil. in Anal. Univ. Chile, 1870, p. 103, ex Fournier.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1054); Mesas frías, Sierra de las Cruces (Est. de México). Octubre 2 de 1892 (C. G. Pringle, 4281); Sitios descubiertos. Sierra de Clavellinas, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Octubre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 4998).

Stipa mucronata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 125; Kunth Enum. Pl. 1. p. 181; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 73.

Praderas de las montañas, Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4299).

Stipa pringlei, Scribner n. sp. ex hb. Pringle.

Sierra Madre (Est. de Chinuanua), Octubre 13 de 1887 (C. G. Pringle.....)

Stipa tenuissima, TRIN.

Cerros calizos, Paso de Carneros (Est. de Coahulla), Septiembre 20 de 1890 (C. G. Pringle, 3274).

Stipa sp.

Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel). Oryzopsis fimbriata, Hemsl. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 538.

Stipa fimbriata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 126; Kuntii Revis, Gram. 1, p. 263, t. 43; Peyr. in Linnen xxx. p. 5; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 74, cum var β.

Milium mexicanum, Spreng.; Trin. et Rupr. Sp. Gram. Stip. p. 34.

Faldas de la Sierra Madre (Est. de Сипилиил), Octubre 2 de 1888 (C. G. Pringle, 3035).

Muehlenbergia arizonica, Scribn.

Suelo delgado, cerros cerca de Chihuahua, Octubre 19 de 1886 (C. G. Pringle, 964).

Muehlenbergia articulata, Scribn.

Cerros calizos y secos, Cárdenas (Est. de S. Luis Potosi), Octubre 16 de 1891 (C. G. Pringle, 3913).

Muehlenbergia bourgæi, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 86. Barranca de Rio Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Praderas, Flor de Maria (Est. de México), Septiembre 4 de 1890 (C. G. Pringle, 3316).

Muehlenbergia brevifolia, Scribn.

Pendientes húmedas cerca de Guadalajara, Mayo 21 de 1890 (C. G. Pringle, 3442); Capas húmedas cerca de Guadalajara, á 5,000 piés. Mayo 2 de 1894 (C. G. Pringle, 4736).

Muehlenbergia breviseta, Griseb. ex Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 83.

Suelo frío y seco, cerros de Pátzcuaro (Est. de Μισποαςλίν), Noviembre 25 de 1891 (C. G. Pringle, 3944).

Muchlenbergia buckleyana, Scribn.

Sierra Madre (Est. De Спицапил), Octubre 9 de 1888 (С. G. Pringte, 3052).

Muehlenbergia calamagrostidea, Kunth Revis. Gram. I. p. 63, et Enum. Pl. I. p. 199; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 84; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 174.

Calamagrostis quitensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 133. Calamagrostis mexicana, Kunth Synop. Pl. Æquin. Orb. Nov. 1V. p. 473.

Arundo quitensis, Rem. et Schult. Syst. Veg. 11, p. 509. Muehlenbergia longiseta, Benth. Pl. Hartw. p. 28.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1068); Techos de las casas, etc. Oaxaca, a 5,200 piés. Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4852).

Muehlenbergia ciliata, Ткіх. Gram. Unifl. p. 193; Kunth Enum. Pl. i. p. 199; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 83.

Podosæmum ciliatum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 128.

Trichochloa ciliata, Rœm. et Schult. Syst. Veg. 11, p. 386. Polybogou ciliatus, Spreng. Syst. Veg. 1, p. 243.

Mesas húmedas, cerca de Guadalajara, Noviembre 10 de 1892 (C. G. Pringle, 5215).

Muehlenbergia clomena, Ткіх. Gram. Unifl. p. 194; Кихті Р1. Enum. i. p. 203; Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 86; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 174.

Cloniena peruviana, Beauv. Agrostogr. p. 28, t. 7, fig. 10.

Muchlenbergia pusilla, Steud. Gram. p. 177.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1069).

Muehlenbergia debilis, Trix. Gram. Uniff. p. 193, et Agrostiden, n. p. 49; Steub. Gram. p. 179.

Podosæmum debile, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 128, et vii. t. 681.

Podosæmum setosum, H. B. K. Ioc. cit. p. 129.

Muchlenbergia setosa, TRIN. Gram. Unifl. p. 193; FOURN. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 86, cum var. β.

Muehlenbergia microsperma, Trin. ibid.; Fourn. loc. cit. p. 85.

Trichochloa debilis, et T. setosa, Rœm. et Schult. Syst. Veg. n. pp. 385, et 386.

Trichochloa microsperma, DC, Cat. Monsp. p. 151.

Agrostis debilis, et A. selosa, Spreng, Syst. Veg. 1. p. 262.

Agrostis microsperma, Lag. Elench. p. 2.

Tia Juana (Baja California), Abril 6 de 1882 (C. G. Pringle,....)

Muehlenbergia distichophylla, Kuntii Enum. Pl. 1. p. 202; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 81.

Podosæmum distichophyllum, Prest. Reliq. Hænk. 1. p. 231.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Noviembre 11 de 1889 (C. G. Pringle, 2346).

var. mutica, Scribn.

Sitios agrestes de las cañadas, cerca de Guadalajara, Noviembre 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2360); Sierra de S. Felipe, á 10,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 5577).

Muehlenbergia dumosa, Scribn.

var. minor, Scribn.

Mesas húmedas y frías, Sierra de S. Esteban, cerca de Guadalajara, Noviembre, 7 de 1889 (C. G. Pringle, 2355).

Muehlenbergia elongata, Scribn. n. sp.

Cerros (Est. de Chimuanua), Abril 4 de 1885 (C. G. Pringle, 398).

Muchlenbergia exilis, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 84.

Muchlenbergia tenella, Rupr. in Bull. Acad. Brux. Ix (reprint. p. 4), non Trin. ex Fournier.

Mesas húmedas, cerca de Guadalajara, Noviembre 5 de 1889 (C. G. Pringle, 2747).

Muehlenbergia flavida, VASEY.

var. strictior, Scribn.

Lugares húmedos, Sierra Madre (Est. de Chineanua), Octubre 8 de 1888 (C. G. Pringle, 3034).

Muehlenbergia gracilis, TRIN. Gram. Uniff. p. 193; FOURN. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 87.

Podosæmum gracile, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 131.

Montañas de Mapula, á 7,000 piés (Е́ят. DE Спицанса), Noviembre 11 de 1886 (С. G. Pringle, 895).

Muehlenbergia grandis, VASEY.

Barranca cerca de Guadalajara, Noviembre 19 de 1889 (C. G. Pringle, 2765).

Muehlenbergia implicata, TRIN. Gram. Unifl. p. 193; FOURN. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 85.

Podosæmum implicatum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 127. Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Renafiel); La Barranca (Est. de Jalisco), Octubre de 1880 (M. Bárcena, 141, 157); Bancos pedregosos de las corrientes, Montes. Potrero cerca de Cbihuahua, Octubre 12 de 1880 (C. G. Pringle, 818); Suclo delgado de capas calizas, Monte Albán (Est. de Oaxaca), Octubre 8 de 1894 (C. G. Pringle, 4950).

Muehlenbergia lemmonii, Scribn.

Mesas sombrias y húmedas, cerros cerca de Chihuahua, Noviembre 3 de 1886 (C. G. Pringle, 928).

Muchlenbergia monticola, Buckley.

Mesas secas, cerros cerca de Chihuahua, Noviembre 3 de 1886 (C. G. Pringle, 929).

Muchlenbergia mucronata, Trix. Gram. Unifl. p. 194; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 81.

Podosæmum mneronatnm, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 129.

Trichochloa mucronala, Roem. et Schellt. Syst. Veg. II. p. 387. Agrostis mucronala, Spreng. Syst. Veg. I. p. 262.

N. V. Cola de zorra, Escoba dura.

Colomitos (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bârcena, 80, 459, 700).

Muehlenbergia nebulosa, Scribx, n. sp.

Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Octubre 7 de 1891 (C. G. Pringle, 4038).

Muehlenbergia pulcherrima, Scribn, n. sp.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1059); Mesas secas de pórfido, Sierra Madre (Est. de Chinuanua), Septiembre 30 de 1887 (C. G. Pringle, 1416).

Muehlenbergia pringlei, Scribn. n. sp.

Mesas húmedas y frias, cerros pedregosos, cerca de Chihuahua, Agosto de 1885 (C. G. Pringle, 394).

Muchlenbergia scabra, S. Wars, in Proc. Am. Acad. xvm. p. 174.

S. Luis Potosf, 1876 (G. Schaffner, 1067).

Muehlenbergia schaffneri, Founx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 85.
S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1065); Suelo delgado, Montañas cerca de Chihuahua. Octubre 12 de 1886 (C. G. Pringle, 981).

var. longiseta, Scribn. n. var.

Suelo delgado de las mesas, Río Hondo (Est. de Zacatecas), Septiembre 5 de 1891 (C. G. Pringle, 3894),

Muehlenbergia spiciformis, Trin. Agrostidea, n. p. 42; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 86.

Rocas calizas cerca de Oaxaca, Octubre de 1894 (C. G. Pringle, 6025).

Muehlenbergia stipoides, Trin. Gram. Unifl. p. 194; Kunth Enum. Pl. 1. p. 201; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 83.

Podosæmum stipoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 131.

Trichochtoa stipoides, Rem. et Schult. Syst. Veg. n. p. 388. Agrostis stipoides, Spreng. Syst. Veg. 1. p. 263.

Sierra de S. Felipe, à 10,300 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 19 de 1894 (C. G. Pringle, 4905).

Muehlenbergia tenella, Trin, Gram. Unifi. p. 192; Kuntii Enum. Pl. i. p. 199; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 83.

Podosæmum tenellum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 128. Trichochloa tenella, Rœm. et Schult. Syst. Veg. 1. p. 243.

Rocas mojadas, cerca de Guadalajara, Noviembre 10 de 1892 (C. G. Pringle, 5295).

Muehlenbergia sp.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1058).

Muehlenbergia sp.

Cerca de la M. palmeri, VASEY.

Capas de la cima. Sierra de S. Felipe, á 10,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4914).

Lycurus brevifolius, Scribn.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Orillas del Tajo de Nochistongo, Septiembre de 1888 (F. Altamirano); Llanuras de Guadalajara, Octubre 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2470).

Lycurus phleoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 142, t. 45; Kunth Enum. Pl. 1. p. 204; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 92.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 1045); Cerros y mesas (Est. de Chihuahua), Mayo 28 de 1885 (C. G. Pringle,...)

Perieilema ciliatum, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 93. Mesas húmedas y sombrias, Barranca de Tequila (Est. de Jalisco), Septiembre 23 de 1893 (C. G. Pringle, 4606).

Perieilema crinitum, Prest. Reliq. Hachk. 1. p. 233, t. 37, fig. a; Kunth Enum. Pl. 1. p. 235; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 93 cum β. cirrato.

Mesas sombrías de la Barranca, cerca de Guadalajara, Noviembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3381).

Sporobolus atrovirens, Kunth Revis. Gram. 1. p. 68, et Enum. Pl. 1, p. 214.

Agrostis atrovirens, REM. et SCHULT. II. p. 361.

Vilfa atrovirens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 138; Trin. Agrostidea, 1. p. 64; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 101. S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 1034).

Sporobolus capillaris, VASEY.

Mesas secas, Barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 15 de 1801 (C. G. Pringle, 3853).

Sporobolus cryptandrus, A. Gr. Man. Bot. Northern, U. S. ed. 5, p. 610; S. Wars. Bot. Calif. n. p. 268 (var. flexnosns), et in Proc. Am. Acad. xvm. p. 175.

Agrostis cryptandra, Tokk, in Ann. Lyc. N. York, i. p. 151.

Vilfa cryptandra, Trix. Agrostidea, i. p. 47.

Valle cerca de Chihuahua, Octubre 4 de 1885 (C. G. Pringle, 419).

Sporobolus depauperatus, Scribn.

Vilfa ntilis, Torr.

Lugares húmedos, Montes de Sta. Eulalia (Евт. ре Спинаниа), Marzo 29 de 1885 (С. G. Pringle, 4184).

Sporobolus macrospermus, Scribn. n. sp.

Cerros pedregosos, cerca de Guadalajara, Octubre 29 de 1889 (C. G. Pringle, 2447); Suelo granitico, Cerros de las Sedas, à 6,000 piès (Est. de Oaxaca), Septiembre 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4943).

Sporobolus minutiflorus, Link, Hort, Bot, Berol, i. p. 88; Kuntii Enum. Pl. i. p. 214.

Vilfa mimitiflora, Trix. Agrostidea, i. p. 63; Döll. in Mart. Fl. Bras. ii. 3, p. 31; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 101, var. α . et β .

Cerros pedregosos y secos, Las Canoas (Est. de S. Luis Potosi), Julio 9 de 1890 (C. G. Pringle, 3130).

Sporobolus racemosus, VASEY.

Sitios agrestes, arenosos y frios, Sierra Madre (Est. de Culnuanua), Septiembre 22 de 1887 (C. G. Pringle, 1425).

Sporobolus repens, Prest. Reliq. Hænk. 1. p. 241; Kunth Enum. Pl. 1. p. 216.

Filfa repens, Trin. Agrostidea, t. p. 80; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 101.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 1025). Tallos flotando en el agua, y entonces estéril, ó enraizando á la orilla del suelo húmedo. Pantanos de las praderas, Flor de María (Est. de México), Octubre 17 de 1890 (C. G. Pringle, 3317).

Sporobolus shepherdi, VASEY.

Sierra Madre (Est. DE Chiniuaniua), Octubre 12 de 1887 (C. G. Pringle, 1424).

Sporobolus tricholepis, Torr.

Suelo húmedo de la cima, Montañas de Mapula, á 7,000 piés (Est. de Chimuanua), Octubre 26 de 1886 (C. G. Pringle, 822).

Epicampes bourgæi, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 88, cum var. β. mutica.

Bajo los peñascos fríos de la barranca, cerca de Guadalajara, Noviembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3335).

Epicampes lanata, Presl. Reliq. Hank. i. p. 235; Kunth Enum. Pl. i. p. 209; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 89. Agrostis lanata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 136.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1023).

Epicampes macroura, Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX. p. 87, et in Benth. et Hook. Gen. Pl. m. p. 1149.

Cinna macroura, C. setifolia, et C. stricta, Kunth Revis, Gram.
1. p. 67, et Enum. 1. p. 208; Rupr. in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 4).

Crypsis macroura, et C. stricta, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 140.

Crypsis setifolia, PRESL. Reliq. Hænk. 1. p. 245.

Crypsinna stricta, C. macroura, et C. setifolia, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 90.

Epicampes pubescens, Prest. Reliq. Hrenk. I. p. 235; Kuntii Enum. Pl. i. p. 209; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 89. Agrostis pubescens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 136.

Sierra de S. Felipe, á 10,300 piés (EST. De OAXACA), Septiembre 26 de 1894 (C. G. Pringle, 5576).

Epicampes sp.

Montes de S. Miguelito, S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1024).

Polypogon mexicanus, Schl. Hort. Hal. 1842, ex Steud. Gram. p. 185; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 92.

Las Sedas, á 6,000 piés (Est. DE OAXACA), (C. G. Pringle, 5559).

Agrostis fasciculata, Rob. et Sea?

Por los arroyos, á 12,000 piés. Nevado de Toluca (Est. de México), Septiembre 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4251).

Agrostis schiedeana, Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 96.
Bancos húmedos, Sierra de las Cruces (Est. DE México),
Agosto 12 de 1803 (C. G. Pringle, 4485).

Agrostis scabra, Willib. Sp. Pl. I. p. 370; A. Gr. Man. Bot. Northern U. S. ed. 5, p. 611; S. Wats, in Proc. Am. Acad. xviii. p. 17c; Therr. in S. Wats, Bot. Calif. ii. p. 274.

Agrostis laxiflora, Richardson, App. p. 3; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 94.

Agrostis michanxii, Trix. Agrostidea, n. p. 79, pro parte. Trichodium laxiflorum, Michx. Fl. Am-Bor. i. p. 41, t. 8. Trichodium moutanum, Torr. ex A. Gr.

S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 1033); Cerca del Río (Est. DE Chimuanua), Abril o de 1880 (C. G. Pringle,.....)

Agrostis setifolia, Fourx. Mex. Pt. Enum. Gram. p. 97. Sierra de S. Felipe, á 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Septiem-

bre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4895).

Agrostis verticillata, Vill., Delph. p. 74; Trin. Sp. Gram. lc. et Deser. t. 36; S. Wars. Bot. Calif. n. p. 272; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 96.

Agrostis dulcis, Sibth. ex Kunth Enum. Pl. 1. p. 218; Nees in Linnua xix. p. 670; Bexth. Pl. Hartw. p. 28.

Vilfa dulcis, Beauv. Agrostogr. p. 16; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 138.

Agrostis vutgaris, y. dulcis, Pers. Syn. Pl. 1. p. 75.

Barranea de Rio Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1022); La Barranea (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 146).

Agrostis virescens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 135; Trin. Agrostidea, n. p. 74, esel. syn.; Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. reprint. p. 3), var. pumila; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 95.

Sitios boscosos y fríos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 28 de 1892 (C. G. Pringle, 4219).

Agrostis sp.

N. V. Liendrilla. ·

Atemajac, Valle de Guadalajara, Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 25, 711).

Agrostis sp.

Barranca de Río Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel).

Agrostis sp.

Cerro de Sta. Cruz, Valle de Ahualulco (Est. DE Jalisco), Octubre de 1886 (M. Barcena, 480, 527).

Agrostis sp.

N. V. Popote de cohete, vara de cohete.

Arroyo de Enmedio (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 703).

Calamagrostis plumosa, Scribn.

Achæta plumosa, Fourn.

Bajo los pinos de las crestas de la Sierra de S. Felipe, à 10,400 piés (Esr. de Oanaca), Junio 29 de 1894 (C. G. Pringle, 4726).

Calamagrostis orizabæ, Steud. Gram. p. 193.

Deyeuxia orizabæ, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 7); Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 405.

Nevado de Toluca, de 12-14,000 pics, Septiembre 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4243).

TRIBUS IX. AVENEÆ.

Deschampsia cæspitosa, Beauv. var.

Por las corrientes, Nevado de Toluca, á 12,000 piés, Septiembre 7 de 1892 (C. G. Pringle, 4242).

Deschampsia pringlei, Scribn. n. sp.

Lugares húmedos, Ilanuras de pinos, base de la Sierral Madre (Est. de Cimiuanua), Octubre 9 de 1887 (C. G. Pringle, 1429).

Deschampsia elongata, Munro.

Bancos húmedos, Sierra de las Cruces, á 10,000 piés (Est. de México), Julio 25 de 1894 (C. G. Pringle, 4743).

Trisetum deyeuxioides, Kuntii Revis. Gram, I. p. 102, et Enum. Pl. I. p. 297, et Suppl. p. 251.

Avena deyeuxioides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 147, et vii. t. 687.

Llanuras de los pinos, base de la Sierra Madre (Est. de Chi-Huahua), Septiembre 21 de 1887 (C. G. Pringle, 1428). var. pubescens, Scribn. n. var.

- Cerros secos, cerca de Pátzenaro (Est. DE Michoacán), Noviembre 19 de 1891 (C. G. Pringle, 3950).
- Trisetum elongatum, Kunth Revis, Gram. n. p. 101; Rupr. in Bull. Acad. Brux. in (reprint. p. 7), ex Foura. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 108.
 - Avena elongata, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 148.
 - Sierra de las Cruces (Est. de Mexico), Julio 25 de 1889 (C. G. Pringle, 5557).
- Trisetum gracile, Fουκν. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 108. Sierra de las Cruces (Esr. de México), Julio 25 de 1894 /C. G. Pringle, 5556).
- Trisetum paniculatum, Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 109. Bosques de pinos. Sierra de S. Felipe, a 9,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4919).
- Trisetum tolucense, Kunth Revis. Gram. 1. pp. 101 et 297, t. 60; Enum Pl. 1. p. 296, et Suppl. p. 248; Fours. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 107; Rupr. in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 7).
 - Avena tolucensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 148.
 - Trisetum molle, Trix, partim, non Avena mollis, Michx, ex Fournier.
 - En el crater, Nevado de Toluca, Septiembre 25 de 1892 (C. G. Pringle, 4303).
- Trisetum virletii, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 108. Lugares frios de las montañas, cerca de Pátzcuaro (Est. de Michoacán), Diciembre 21 de 1891 (C. G. Pringle, 3979).

Avena sativa, Linn.

- Barranea de Río Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Entre Huehuetoca y Hac, de la Guiñada (Est. de México), Septiembre de 1888 (F. Altamirano).
- Tristachya leiostachya, Nees Agrostol. Bras. p. 459; Kunth Revis. Gram. n. p. 140, et Enum. Pl. 1, p. 308; Döll. in Mart. Fl. Bras. n. 3, p. 106,
 - Tristachya mexicana, Kuntu Enum. Pl. 1. p. 308, et Suppl. p. 259; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 111.
 - Monopogon avenaceus, Prest. Reliq. Hænk. p. 325, t. 44.
 - Cerros graníticos y secos, cerca de Guadalajara, Agosto 16 de 1893 (C. G. Pringle, 4479).

Danthonia mexicana, Scrien. n. sp.

Mesas calizas, Paso de Carneros (Евт. DE Солница), Septiembre 20 de 1890 (С. G. Pringle, 3279).

TRIBUS X. CHLORIDEÆ.

Microchloa setacea, R. Br. Prodr. Nov. Holl. p. 208; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 84, t. 22; Kunth Enum. Pl. i. p. 258, et Suppl. p. 201; Peir. in Linnær xxx. p. 5; Fours. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 135; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 176.

Suelo arenoso, Valle de México, Julio 27 de 1890 (C. G. Pringle, 3465).

Spartina gouini, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 135. Praderas alcalinas, Hac. de Angostura (Est. de S. Luis Porosí), Julio I0 de 1891 (C. G. Pringle, 3760).

Chloris elegans, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 166, t. 49; Kunth Enum. Pl. 1. p. 264, et Suppl. p. 207; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 143; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 176.
 Chloris alba, Presl. Reliq. Hank. 1. p. 289; Steud. Gram. p. 204.

Montes de los Morales, S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1073); Atemajac (Est. de Jalisco), 1886 (M. Bárcena, 24).

Chloris submutica, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 167, t. 50;
Kunth Enum. Pl. 1. p. 263, et Suppl. p. 206; Nees in Linnæa
xix. p. 291; Peir. in Linnæa xxx. p. 5; Fourn. Mex. Pl. Enum.
Gram. p. 143; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 176.
Eustachys submutica, Ræm. et Schult. Syst. Veg. u. p. 614.

Est. de Hidalgo), 1872 (A. Periafiel).

Chloris sp.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1072).

Chloris sp.

Valle de Ahualulco (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Barcena, 523).

Chloris sp.

N. V. Escobetilla,

Arroyo de Enmedio (Est. DE Jalisco), Octubre de 1886 (M. Barcena, 710, 716).

Schedonnardus texanus, Steud.

Montañas cerca de Glorieta (Nuevo México), Agosto 26 de 1886 (C. G. Pringle,)

Bouteloua bromoides, Lag. Elench. p. 5; S. Wars. in Proc. Am. Acad. xviii, pp. 177 et 179.

Dinebra bromoides, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 172, t. 51.

Atheropogon bromoides, RGEM, et SCHULT, Syst. Veg. II. p. 415; FOURN, Mex. Pl. Enum. Gram. p. 140.

Entriana bromoides, Kuxtu Revis. Gram. г. р. 95, et Enum. Pl. г. Suppl. р. 234.

Atheropogon americanus, Fourn, loc. cit?

Dinebra repens, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 172, t. 52.

Atheropogon repens, Roem, et Schult. Syst. Veg. n. p. 416; Fours, loc, cit.

Entriana repens, Kuntu Revis, Gram. 1, p. 95; Enum. Pl. 1, Suppl, p. 235.

Heterostega jmneifolia. Desv.; H. B. K. loc. cit. p. 173, t. 54, ex S. Wars, sed vix.

Boutcloua humboldtiana, Griseb. ex S. Wats.

Atheropogon radicosus, Fourn. loc. cit?

Montes del Mineral del Chico (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Pe-ñafiel); S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1003); Nevado de Colima, á 4,000 metros, Septiembre de 1886 (M. Bárcena, 477); Cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 20 de 1888 (C. G. Pringle,)

Bouteloua burkei, Scribn.

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 13 de 1889 (C. G. Pringle, 2671).

Bouteloua havardi, VASEY.

Cerros cerca de Chihuahua, Agosto 13 de 1885 (C. G. Pringle, 410½).

Bouteloua hirsuta, Lag. Elench, p. 5; S. Wars, in Proc. Am. Acad, xviii. pp. 177 et 178; A. Gr. Man. Bot. Northern. U. S. ed. 5, p. 621.

Chondrosium hirtum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 176, t. 59;

Kunth Enum, Pl. 1. p. 276, et Suppl. p. 231; Fourn, Mex. Pl. Enum, Gram, p. 137.

Actinochloa hirsuta, Rem. et Schult. Syst. Veg. n. p. 149. Chondrosium fænum, Torr. in Emory's Rep. p. 153, t. 12. S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1018).

Bouteloua oligostachya, Torr.: A. Gr. Man. Bot. Northern.
U. S. ed. 5, p. 621; Thurb. in S. Wars. Bot. Calif. n. p. 291;
S. Wars. in Proc. Am. Acad. xvni. p. 177.

Chondrosium oligostachyum, Torr. in Marcy. Rep. p. 300.

Atheropogon oligostachyus, Nutt. Gen. 1. p. 78.

Chondrosium aschenbornianum, Nees in Linnæa xix. p. 692; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 137, fide S. Watson. loc. cit Chondrosium gracile, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 176, t. 58; Nees in Linnæa xix. p. 692; Peyr. in Linnæa xxx. p. 5; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 137?

Actinochloa gracilis, Willd. Ræm. et Schult. Syst. Veg. n. p. 418.

Atheropogon gracilis, Spreng. Syst. Veg. 1. p. 293.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1014, 1015).

var. ramosa, Scribner.

Lugares agrestes y calizos, cerros cerca de Chihuahua, Noviembre 7 de 1886 (C. G. Pringle, 927).

Bouteloua polystachya, Torr. in Pacif. Rail. Rep. v. p. 366, t. 10; Thurb. in S. Wats. Bot. Calif. n. p. 291; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. pp. 177 et 179, cum. var. vestita.

Chondrosium parryi, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 150. Chondrosium polystachyum, Bentil Bot. Voy. "Sulphur," p. 56. Chondrosium microstachyum, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 138?

Cerca de los Morales, y en los montes de S. Rafael. S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1017, 1019, 1020); Llanuras arenosas, Laredo (Texas), Julio 23 de 1889 (C. G. Pringle, 2654).

Bouteloua prostrata, Lag. Elench. p. 5; S. Wars. in Proc. Am. Acad. xvin. p. 176.

Chondrosium humile, Beauv. Agrostogr. p. 41; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. r. p. 175, t. 56; Kunth Enum. Pl. i. p. 276, et Suppl. p. 229.

Actinochloa prostrata, Rœm. et Schult. Syst. Veg. 11. p. 419. Actinochloa humilis, Rœm. et Schult. loc. eit. p. 417? Atheropogon humilis, Spreng. Syst. Veg. 1. p. 293?

Chondrosium tenue, var. & Fourn. Mex.Pl. Enum. Gram. p. 138? S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1016). Llanuras. La Honda (Est. de Zacatecas), Agosto 19 de 1890 (C. G. Pringle, 3453).

Bouteloua racemosa, Lac. Elench. p. 5; Bentil in Journ. Linn. Soc. xix. p. 104; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 177. Eutriuma curtipendula, Trix. Fund. Agrostogr. p. 161; Enum. Pl. 1. p. 280.

Chloris curtipendula, Michx, Fl. Bor-Am, i. p. 59; Jaco. Elog. Gram. t. 7.

Atheropogon apludioides, MUEIILENB; Willd. Sp. Pl. IV. p. 937. Bouteloua curtipendula, A. Gr. Man Bot. Northern. U. S. ed. 5, p. 621.

Dinebra curtipendula, DC. Cat. Hort. Monsp. p. 105.

Cynosurus secundus, Pursii. Fl. Am. Sept. n. p. 728.

Atheropogon curtipendula, FOURN. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 138.

Erucavia glabra, V. Cenv. in La Naturaleza, Nov. 1870, p. 347, e descript. ex Fourn. loc. cit.

S. Luis Potosí, 1876 (G. Schuffner, 1061).

Bouteloua stolonifera, Scribner.

Bouleloua scorpioides, S. Wats. non Lag.

Llanuras, Estación La Honda (Est. de Zacatecas), Agosto 19 de 1890 (C. G. Pringle, 3174).

Bouteloua tenuis, S. Wars. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 76, vix Grisch. Pl. Lorentz, p. 211, et Symb. Fl. Arg. p. 303.

Chondrosium tenue, Beauv. Agrostogr. p. 41; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 176, t. 57; Kunth Enum. Pl. i. p. 276; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 138, pro parte.

Actinochtoa tennis, Rœm. et Schult, Syst. Veg. II. p. 418. S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1012).

Bouteloua triathera, Bentu. in Journ. Linn. Soc. xix. p. 104, et in Benth. et Hook. Gen. Pl. m. p. 1169.

Tritena racemosa, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 178, t. 161; FOURN, Mex. Pl. Enum. Gram. p. 141.

Triathera americana, Desv. Journ. Bot. 1813, i. p. 67; Beauv. Agrostogr. p. 39, t. 9, fig. 4, fide Benth.

Alheropogou triæna, Spreng. Syst. Veg. 1. p. 293.

Eutriana triæna, Trin. ex Steud. Gram. p. 216.

Cerros calizos y secos. Las Sedas, á 6,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto 11 de 1894 (C. G. Pringle, 4782).

Bouteloua sp.

Valle de Zacoalco (Est. de Jalisco), 1886 (M. Bárcena, 326).

Leptochloa dubia, Bentu. ex hb. Pringle.

Llanos, Los Charcos (Est. de S. Luis Porosi), Julio 2 de 1891 (C. C. Pringle,)

Leptochloa (?) mexicana, Scribn. n. sp.

Mesas calizas, Cañon de Tamasopo (Est. de S. Luis Potosfi, Septiembre 28 de 1890 (C. G. Pringle, 3252).

Leptochloa mucronata, Kunth Revis. Gram. 1. p. 91, et Enum. Pl. 1. p. 270; Chapm. Fl. Southern. U. S. p. 558; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 147; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 181. Eleusine mucronata. Michx. Fl. Bor-Am. 1. p. 65.

Leptochloa pellucidula, Steub. Gram. p. 209, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 537.

Leptochloa filiformis, Prest. Reliq. Hænk. 1. p. 288? vix Ræm. et Schult.

Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 18 de 1889 (C. G. Pringle, 2076).

Buchloë daetyloides, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, 1859, p. 432, tt. 12 ct 14; Fourn. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. p. 473, et Mex. Pl. Enum. Gram. p. 135; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 178.

Sesteria dactyloides, Nutt. Gen. N. Am. Pl. 1, p. 65; Kunth Enum. Pl. 1, p. 323; Torr. Bot. Emory Rep. t. 10.

Calanthera dactyloides, Kunth in Hook. Kew. Journ. Bot. viii (1858), p. 18.

Triodria sp., Benth. Pl. Hartw. p. 28.

Lasiostega humilis, Rupr. ex Munro in Benth. Pl. Hartw. p. 347.

Anthephora axilliflora, Steud. Gram. ex Fournier.

S. Luis Potosf, 1876 (G. Schuffner, 1004).

Opizia stolonifera, Prest. Reliq. Hænk. i. p. 293; Steud. Gram. p. 214; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 135.

Casioslega anomala, Rupr. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1x (reprint. p. 6), ex Fournier.

Suelo arenoso y delgado, Tequila (Esr. de Jalisco), Octubre 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4566).

TRIBUS XI. FESTUCEÆ.

- Pappophorum laguroideum, Schrad. in Ræm. et Schult. Mant. n. p. 342; Döll. in Mart. Fl. Bras. n. 3, p. 59; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 133.
 - Bordes del Río. Cañon de Tomellin, á 4,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4814).
- Pappophorum wrightii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 178.
 - Suelo delgado de capas calizas. Monte Albán, á 5,500 piés (Est. DE OAXACA), Septiembre 3 de 1894 (C. G. Pringle, 4846).
- Cottea pappophoroides, Kunth Revis, Gram. I. t. 52, Cerros calizos y secos, Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 29 de 1888 (C. G. Pringle, 1973).
- Cathesteeum erectum, Vasey et Hackel in Bull. Torr. Bot. Club. xi. p. 37, t. 45.
 - Suelo arenoso y seco, cerca de Guadalajara, Septiembre 15 de 1891 (C. G. Pringle, 4046).
- Cathestecum prostratum, Prest. Reliq. Henk. i. p. 295, t. 42; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 133.
 - Suelo delgado y arenoso, Tequila (Est. de Jalisco), Octubre 5 de 1893 (C. G. Pringle, 4559).
- Scleropogon brevifolius, Philippi in Sert. Mendoc. n. 1871, p. 47; Biol. Cent. Am. Bot. nr. p. 570, t. cr.
 - Tricuspis monstra, Munro; Hemsl. Diag. Pl. Nov. Mex. p. 56. Lesourdia karwinskiana, et L. mulliflora. Fourn. in Bull. Soc. Bot. France, xxvii, 1880, p. 102, tt. 3 et 4, et Mex. Pl. Enum. Gram. pp. 133 et 134.
 - Scleropogon karwinskianus, Bentill; S. Wats. in Proc. Am. Acad xviii. p. 181.
 - S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1005, 1006).
- Triodia avenacea, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 156, t. 48. Uralepis avenacea, Kuntu Revis. Gram. 1. p. 108, et Enum. Pl.

1. p. 318; NEES in Linnæa xix. p. 693; Fourn. Mcx. Pl. Enum. Gram. p. 110; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii, p. 180.

Kælera avenacea, Spreng, Syst. Veg. 1. p. 332.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1008, 1009); Cerros calizos y secos, Cardenas (Est. de S. Luis Potosi), Noviembre 3 de 1891 (C. G. Pringle, 3930).

Triodia acuminata, Bentil.

Cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 29 de 1888 (C. G. Pringle,)

Triodia mutica, Benth. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 180.

Uralepis mutica, Fours. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 110?

Tricuspis mutica, Torr. in Rep. Bot. Whipple's Exped. p. 100. Sitios calizos, agrestes, Monterrey (Est. de Nuevo León), Julio 5 de 1888 (C. G. Pringle, 1980).

Triodia pulchella, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. i. p. 155, t. 47; S. Wars. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 180.

Tricuspis pulchella, Torr. Rep. Bot. Whipple's Exped. p. 100. Uralepis pulchella, Kunth Revis, Gram. 1. p. 108, et Enum. Pl. 1. p. 318; Nees in Linava xix. p. 693; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 110.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 1007); Cerros y llanuras cerca de Chihuahua, Mayo 22 de 1885 (C. G. Pringle, 496).

Triodia purpurea, HACKEL.

Triplasis purpurca, Chapm.

Llanuras arenosas, Peña (Texas), Septiembre 16 de 1889 (C. G. Pringle,)

Triodia texana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 180. Valle de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 10 de 1889 (C. G. Pringle, 2716).

Diplachne dubia, Bentu. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 181; Vasey. Grasses U. S. p. 35.

Leptochloa dubia, Nees Agrostol. Bras. p. 433; Kunth Enum. Pl. i. p. 271; Chapm. Fl. Southern U. S. p. 559; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 147.

Chloris dubia, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 169, et v11, t. 694.

Festuca obtusiflora, Willd. Spreng. Syst. Veg. I. p. 356. S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffuer, 1079).

Diplachne fascicularis, Beauv. Agrostogr. p. 80, t. 16, fig. 9; S. Wats, in Proc. Am. Acad, xviii. p. 181; Fourn, Mex. Pl. Enum. Gram. p. 148.

Festuca fascicularis, Lam. III, I. p. 189.

Leptochloa polysłachya, Kuxти Revis, Gram. i. p. 91, et Enúm. Pl. i. p. 271.

Leptochloa fascicularis, A. Gr. Man. Bot. Northern. U. S. ed. 5, p. 623.

S. Luis Potosi, 1877 (G. Schaffner, 1048).

Diplachne spicata, DŒLL. ex hb. Pringle.

Mesas arcnosas cerca de S. Luis Potosí, Septiembre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 32o7).

Diplachne viscida, Scribn.

Llanos en Lagunas (Esr. de Chindanua), Septiembre 17 de 1887 (C. G. Pringle,)

Dissanthelium sclerochloides, Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 112.

Lugares húmedos en la cima del cráter del Nevado de Toluca, á 13,500 piés, Septiembre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4222).

Eragrostis capillaris, Nees Agrostol. Bras. p. 505; Steud. Gram. p. 273; A. Gr. Man. Bot. Northern, U. S. ed. 5, p. 632; Döll. in Mart. Fl. Bras. n. 3, p. 139; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 114.

Poa capillaris, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 68, ed. 2, p. 100.

Eragrostis lugens, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint.p.9). Praderas húmedas, cerca de Guadalajara, Agosto 22 de 1893 (C. G. Pringle, 4492).

Eragrostis ciliaris, Link. Hortus Berol. 1. p. 192; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 532; Chapm. Fl. Southern. U. S. p. 563.

Poa ciliaris, Linn. Elmgren, Pl. Jam. Pug. p. 13, Sp. Pl. ed. 2, p. 102; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 162; Ch. et Scht. in Linnæa vi. p. 38; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 113.

Las Palmas (Est. de S. Luis Porosí), Junio 5 de 1890 (C. G. Pringle, 3472).

Eragrostis limbata, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 116, varietates θ , et θ .

Eragrostis tephrosanthes Steud. Gram. p. 278, partim ex Fournier.

- Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); Campos cerca de Guadalajara, Septiembre 25 de 1891 (C. G. Pringle, 3839).
- Eragrostis lugens, Nees, fide S. Watson in Proc. Am. Acad. xvm. p. 182.
 - S. Luis Potosí, 1876 (G. Schaffner, 1026); Colomitos (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bârcena, 79).
- Eragrostis mexicana, Link. Hort. Berol. 1, p. 190; Nees Agrostol. Bras. p. 503; Döll. in Mart. Fl. Bras. 11, 3, p. 143; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 114.
 - Poa mexicana, Lac. Elench. p 3; Cu. et Scut. in Linniea vr. p. 38,
 - S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1029); Llano de Mexicalcingo (Est. de Jalisco), Octubre de 1886 (M. Bárcena, 164).
- Eragrostis oxylepis, Torr. in Rep. Bot. Whipple's Exped. p. 156; Vasey Grasses, U. S. p. 38.
 - Poa oxylepis, Torr. in Marcy's Rep. p. 301, t 19 (P. interrupta, in tab.).
 - Megastachya oxylepis, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 118, eum β. capitata.
 - Eragrostis veræ-crncis, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 9).
 - Llanuras arenosas, Peña (Texas), Agosto 11 de 1889 (C. G. Pringle,....)
- Eragrostis pectinacea, Steud. Gram. p. 272; A. Gr. Man. Bot. Northern, U. S. ed. 5, p. 632; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 114.
 - Eragrostis unionis, et E. cognata, Steud. loc. cit. p. 273.
 - Poa pectinacea, Micux. Fl. Bor-Am. 1. p. 69.
 - Cerros secos, cerca de Cardenas (Est. de S. Luis Potosí), Octubre 7 de 1890 (C. G. Pringle, 3284).
- Eragrostis pilosa, Beauv. Agrostogr. p. 71; Döll. in Mart. Fl. Bras, n. p. 141, t. 42; Benth. Fl. Austr. vn. p. 645; Griseb. Fl. Brit. W. Ind. p. 532; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 117. S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1028).
- Eragrostis plumbea, Scribn.
 - Lugares húmedos, cerca de Guadalajara, Septiembre 25 de 1891 (C. G. Pringle, 5313).
- Eragrostis poæoides, Beauv. Agrostogr. p. 162, t. 14, fig. 11; Döll. in Mart. Fl. Bras. n. 3, p. 149; S. Wats. Bot. Calif. n. p. 315; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 115.

Poa eragrostis, Lixx. Sp. Pl. ed. 1, p. 68.

Evagrostis powformis, Link. Hort. Berol. I. p. 188.

Poa megastachya, Koel., Gram, p. 181; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1, p. 158; Kuntii Enum. Pl. 1, p. 333.

Briza eragrostis, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 70.

Eragrostis megastachya, Link, Hort. Berol. i. p. 185.

Eragrostis major et minor, Host.; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 182.

Eragrostis flavescens, Prest. Reliq. Hænk. 1, p. 278?

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1031).

Eragrostis purshii, Schrad, in Linhael xII, p. 451; A. Gr. Man. Bot. Northern, U. S. ed. 5, p. 632; Fourx, Mex. Pl. Enum. Gram. p. 116. (varietates α, β, ν, δ.)

Eragrostis parvula, Steud. Gram. p. 277.

Eragrostis tephrosauthes, Steud. 1. c. p. 278, partim ex Fournier.

Llanos cerca de Guadalajara, Diciembre 5 de 1888 (C. G. Pringle,....)

Eragrostis pussilla, Scrien., n. sp.

Suelo arenoso, cerros cerca de Guadalajara, Octubre 7 de 1891 (C. G. Pringle, 4036).

Eragrostis reptans, Nees Agrostol. Bras. p. 514; Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 9); A. Gr. Man. Bot. Northern, U. S. ed. 5, p. 631; S. Wars. Bot. Calif. it. p. 314, et in Proc. Am. Acad xviii. p. 181; Döll. in Mart. Fl. Bras. ii. 3, p. 148; Grisen. Fl. Brit. W. Ind. p. 532.

Poa reptans, Michx. Fl. Bor-Am. I. p. 69, t. 11; H. B. K. Nov. Gen. et Sp. I. p. 156.

Poa hypnoides, Lam. III. 1, p. 185.

Megastachya reptans et hypnoides, Beauv. Agrostogr. p. 74; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 119.

Cima arenosa de los charcos desecados en una barranca, cerca de las Canoas (Est. de S. Luis Potosf), Junio 20 de 1891 (C. G. Pringle, 3699).

Eragrostis rigida, Scribn.

Llanuras arenosas, Peña (Texas), Septiembre 16 de 1890 (C. G. Pringle.....)

Eragrostis secundiflora, P_{RESL} .

En las arenas, Veracruz, Abril 23 de 1894 (C. G. Pringle, 5562). Eragrostis vaklii, Nees ex hb. Pringle.

Llanuras arenosas cerca de Guadalajara, Noviembre 1.º de 1890 (C. G. Pringle, 3334).

Eragrostis sp.

En los arenales, Veracruz, Abril 23 de 1894 (C. G. Pringle, 5561).

Melica laxiflora, CAV.

Montañas de Sta. Eulalia (Est. de Chihuahua), Abril 13 de 1886 (C. G. Pringle, 846).

Melica porteri, Scribn.

Sierra Madre (Est. de Chinuanua), Octubre 9 de 1888 (C. G. Pringle, 2040).

Zeugites latifolia, Hemst. Biol. Cent. Am. Bot. III. p. 577. Krombholsia latifolia, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 122. Suelo húmedo, barranca cerca de Guadalajara, Septiembre 21

de 1891 (C. G. Pringle, 4035).

Zeugites mexicana, Trix. ex Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 121.

Despretzia mexicana, Kuntii Revis. Gram. 11. p. 485. t. 157,
et Enum. Pl. 1. p. 40.

Zengites americana, Rupr. in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 21), non Willd.

Panicum schiederi, Spreng. ex Steud. Gram. p. 411.

Bosques fértiles, barranca de las Canoas (Est. de S. Luis Porosí), Octubre 17 de 1891 (C. G. Pringle, 3919).

Briza rotundata, Steud. Gram. p. 284; S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 182.

Bromus rolundatus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 152.

Chascolytrum rotundatum, Kuntii Revis. Gram. 1. p. 121, et Enum. Pl. 1. p. 373; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 112.

Calotheca rotundata, REM. et Schult. Syst. Veg. n. p. 632.

Chaseolytrum subaristatum, Desv. in Fourn. de Bot. III. p. 71; Kunth Revis. Gram. 1. p. 347, t. 87, et Enum. Pl. 1. p. 373, cum syn.; Döll. in Mart. Fl. Bras. II. 3, p. 134.

Briza amarkiana, Cu. et Chl. in Linnæa vi. p. 39.

Atotonilco el Grande (Est. de Hidalgo), 1872 (A. Peñafiel); S. Luis Potosí, 1877 (G. Schaffner, 1035); Sitios agrestes y calizos, Flor de María (Est. de México), Septiembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3243).

- Poa annua, Linn. Sp. Pl. ed. i. p. 68; A. Gr. Man. Bot. Northern. U. S. ed. 5, p. 629; Döll. in Mart. Fl. Bras. ii. 3, p. 121; S. Wars. in Proc. Am. Acad. xviii. p. 182; et Bot. Calif. ii. p. 311.
 - S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1032).
- Poa conglomerata, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 9); Pryr. in Linnæa xxx. p. 8; Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 113.
 - Bajo los peñascos, en lugares frios y secos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Octubre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4307).
- Poa infirma, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 458; Kunth Enum. Pl. 1 p. 349; Nees in Linnwa xix. p. 693; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 113.

Poa annua, Cu. et Scul., in Linnæa vi. p. 38, non Linn.

Suelo húmedo. Oaxaca, a 5,000 pies, Mayo 30 de 1894 (C. G. Pringle, 4671).

- Poa subuniflora, Steud. Gram. p. 257; Kuxtii Revis, Gram. i. pp. 115 et 339, t. 83, et Enum. Pl. i. p. 354.
 - Devenxia (?) powformis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 146. Suelo humedo y frio, Sierra de las Cruces (Est. de Mexico), Agosto 10 de 1892 (C. G. Pringle, 4184).
- Graphephorum altijugum, Fourn. Men. Pl. Enum. Gram. p. 111.
 - En lugares secos, bajo los pinos, Sierra de las Cruces (Est. DE MEXICO), Octubre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4306); Sierra de S. Felipe, à 10,000 piés (Est. DE OAXACA), Agosto de 1894 (C. G. Pringle, 4775).
- Graphephorum (?) pringlei, Scribn. n. sp.

Cima de la Sierra de S. Felipe, il 10,000 piés (Est. de Oaxaca), Agosto 4 de 1894 (C. G. Pringle, 4765).

- Festuca amplissima, Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix (reprint. p. 10; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 125.
 - Montañas cerca de Patzcuaro, a 8,500 piés (Est. de Michoacax), Noviembre 23 de 1891 (C. G. Pringle, 3945).
- Festuca hephæstophila, Nees in Steud. Gram. p. 310; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 124.
 - Festuca tolucensis, RUPR. in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 10).

Festuca sp. n. Benth. Pl. Hartw. p. 629.

En la cima del cráter, Nevado de Toluca, à 13,500 piés, Sep tiembre 1.º de 1892 (C. G. Pringle, 4221).

Festuca livida, Willd, in Spreng, Syst. Veg. 1, p. 353; Kunth Enum. Pl. 1. p. 399; PEVR. in Linnæa xxx. p. 9; Biol. Cent. Am. Bot. p. 582, t. cu. B. figg. 5-8.

Bromus lividus, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 150, et vii. t. 689; Rupr. in Bull. Acad. Brux. 1x (reprint. p. 10); Cir. et Scul. in Linnæa vii. p. 38.

Schenodorns lividus, Rem. et Schult. Syst. Veg. II. p. 707.

Festuca grandiftora, Steud. Gram. p. 311.

Helleria livida, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 129.

En el cráter, Nevado de Toluca, à 14,000 piés, Septiembre 25 de 1892 (C. G. Pringle, 4301).

Festuca tolucensis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 1. p. 153; Kuntil Enum. Pl. 1. p. 399; Fourx. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 124. Diplachne tolucensis, Spreng. Syst. Veg. 1. p. 351.

Festuca multiculmis, Steup. Gram. p. 311.

Bancos secos, Sierra de las Cruces (Est. de México), Agosto 12 de 1893 (C. G. Pringle, 4484).

Bromus ciliatus, Linx. Sp. Pl. ed. 1, p. 76; A. Gr. Man. Bot. Northern, U. S. ed. 5, p. 635; S. Wars, Bot, Calif. II, p. 320. et in Proe. Am. Acad. xvm. p. 183; Peyr. in Linnea xxx. p. 10.

Bromus hookeri, Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 127, cum varietatibus omnibus.

Bromns purgans, Linn. Sp. Pl. ed. 1, p. 76; Hook. et Arn. Bot. Beech. Vov. p. 119.

Bromus canadensis, Michx. Fl. Bor-Am. 1. p. 65.

Bromus pubescens, Muehl. Calam. p. 169; Kunth Enum. Pl. i. p. 417.

Bromus marginatus, Steud. Gram. p. 322, ex Fourn.

Bromus segelus, Cu. et Scul. in Linnæa vi. p. 38, non H. B. K.

Bronnis pendulinus, Sessé in Lag. Elench. p. 4; Riem. et Schult. Syst. Veg. 11. p. 644; Peyr. in Linnæa xxx. p. 10. Festuca pendulina, Spreng. Syst. Veg. 1. p. 356.

Bromus compressus, Lag. Elench. p. 4.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1075); Lugares humedos,

Sierra Madre (Est. de Chimanua), Octubre 3 de 1887 (C. G. Pringle, 1173).

Bromus sp.

Cerca del B. grandiflorus, 1100k.

Sierra de S. Felipe, à 9,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4897).

Bromus sp.

Cerea del B. purgans, L.

Sierra de S. Felipe, à 9,500 piés (Est. de Oaxaca), Septiembre 18 de 1894 (C. G. Pringle, 4898).

Brachypodium cæspitosum, Ræm. et Schultt; S. Wats. Proc. Am, Acad. xvnt. p. 183.

S. Luis Potosi, 1876 (G. Schaffner, 1076).

Brachypodium mexicanum, Link, Hort, Berot, t. p. 41; Fourn. Mex. Pl. Enum. Gram. p. 125.

Festuca mexicana, Rem. et Schult. Syst. Veg. n. p. 732.

Festuca scabra, Lag. Elench, p. 4.

Triticum scaberrimum, Tauscu, in Flora, 1837, p. 118.

Sierra de las Cruces (Est. de Mexico), Agosto de 1892 (C. G. Pringle, 4231).

Brachypodium pringlei, Scriby, n. sp.

Bancos húmedos, Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Junio 15 de 1889 (C. G. Pringle, 2525).

Tribus XII. HORDEÆ.

Agropyrum repens, P. B.

Sierra Madre (Est. de Chinuanua), Octubre 18 de 1887 (C. G. Pringle, 1176).

Elymus canadensis, Linn. var.

Valles (Est. de Chihuanua), Octubre 30 de 1885 (C. G. Pringle, ..)

TRIBUS XIII. BAMBUSEÆ.

Chusquea sp.

Bosques próximos al Río Muerto, cerca de S. Juan Bautista (Est. de Tabasco), Marzo de 1888 (J. N. Rovirosa).

GYMNOSPERMEÆ.

ORDO CCVIII. GNETACEÆ

Ephedra trifurca, Torr.

Mesas (Est. de Синианиа), Mayo 20 de 1887 (С. G. Pringle, 1589).

ORDO CCIX, CONIFERÆ.

TRIBUS I. ABIETINEÆ.

SUB-TRIBUS II. ABIETINEÆ.

Pinus cembroides, Zucc. Pl. Nov. fasc. 1. p. 392; Flora, 1832, II.
Beibl. p. 93; DC. Prodr. xvi. 2, p. 397; Bentil. Pl. Hartw. p.
58; Gord. in Journ. Hort. Soc. Lind. 1. p. 236, cum ic. xylogr.
Pinus fertilis, Roezt., ex Gord. Pinet. Suppl. p. 76.

Pinus llaveana, Scinede in Linnea xii. p. 488; Antoine Conif. p. 36, t. 16, fig. 1; Forbes, Pinet. Woburn. p. 49, t. 17; Torr. Bot. U. S. & Mex. Bound. Surv. p. 208, t. 53.

Pinus osteosperma, Engelm. Bot. Wisliz. Exped. p. 5.

Cerros, paso de Carneros (Est. de Coahulla), Septiembre 7 de 1889 (C. G. Pringle, 2659, 4018).

Pinus leiophylla, Schiede et Deppe in Linnæa vi. p. 354, et xii. p. 490; DC. Prodr. xvi. 2, p. 401; Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 336; Engelm. Rev. Gen. Pinus, p. 20.

Pinus gracilis, P. comonfortii, P. huisquilucænsis, P. verrucosa, P. montealicgri, P. decandolleana, P. dependens, et P. cedrus, Roezl. Cat. Grain. Conif. Mex. ex Gord. Pinet. Suppl. pp. 71-86.

Sierra de Ajusco, á 7,500 piés (DISTRITO FEDERAL), Noviembre 2 de 1895 (C. G. Pringle, 6180).

Pinus montezumæ, Lamb. Pin. ed. 1, m. p. 149, t. 64, et ed. 2, t. p. 23, t. 22; DC. Prodr. xvi. 2, p. 398; Carr. Conif. p. 317; Engelm. Rev. Gen. Pinus p. 20.

Pinns occidentalis, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11, p. 4, et Cn. et Schl., in Linnea v. p. 76, non Swartz.

Pinns devoniana, Lindl. Bot. Reg. 1839, Misc. p. 62, n. 96; Endl. Synop. Conif. p. 153; Gord. Pinet. p. 221.

Pinus russelliana, Lindl. Bot. Reg. 1839, Misc. p. 63, n.º 97; Antoine Conif. p. 314.

Pinns pseudostrobus, Gord. Pinet, p. 237, non Lindl.

Pinns tenangensis, P. sonlangeana, P. trouvezkoiana, P. grandis, P. elegans, P. boothiana, P. spinosa, P. rumeliana, P. boncheana, P. van geertii, P. northumberlandiana, P. sanrafaeliana, P. keleleerii, P. dolleriana, P. van hontlei, P. paxtoni, P. thibaudiana, P. haugeana, P. hendersonii, P. valida, P. monstrosa, P. nesselrodiana, P. coaretata, P. bullala, P. thelemanni, P. horizontalis, P. rubescens, P. ortgiesiana, P. rinzii, P. angulata, P. aztecaensis, P. zacatlana, P. michoacaensis, P. magnifica, P. ocampii, P. zitaenaria, P. verschaffeltii, P. mitida, P. tomacocaensis, P. pawlikonskiana, P. ocote, P. leroyi, et P. cornea, Roezl. Cat. Conif Mex. ex Gord. Pinet. Suppl. pp. 71-86, et Parlat. in DC. Prodr. xvi. 2, p. 399.

N. V. Ocote; Mex. Ocotl.

Sierra Madre, cerca de Monterrey (Est. de Nuevo León), Agosto 27 de 1889 (C. G. Pringle, 2657).

Pinus oocarpa, Schiede in Linnæa xh. p. 491; DC. Prodr. xvi. 2, p. 401; Antoine, Conif. p. 38, t. 17, fig. 2; Engelm. Rev. Gen. Pinus, p. 25.

Cerca de Guadalajara, Noviembre 14 de 1892 (C. G. Pringle, 5249).

Pinus teocote, Cham. et Schl. in Linnæa v. p. 76, et xh. p. 487; DC. Prodr. xvi. 2, p. 396; Antoine, Conif. p. 35, t. 16, fig. 3.

Pinus vilmorinii, P. besseriana, P. microcarpa, P. milleriana, P. hugelii, P. jalocole, et P. interposita, Roezl. Cat. Grain. Conif. Mex., ex Gord. Pinet. Suppl. pp. 71-86, et Parlat. in DC. Prodr. xvt. 2, p. 396.

N. V. Jalocote; Mex. Xalocotl.

Lomas arçillosas y secas, Sierra de S. Felipe, á 9,000 piés (Est. de Oaxaca), Diciembre 13 de 1895 (C. G. Pringle, 6243).

Abies religiosa, Cham, et Scul, in Linnea v. p. 77.

Pinus religiosa, H. B. K., et P. hirtella, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 5; Antoine, Conif. p. 75, t. 28, fig. 2; Seem. Bot. Voy. "Herald," p. 335.

Abies hirtella, Lindl. in Penny Cyclop.; Carr. Conif. p. 203. Picea hirtella, Loud., et P. religiosa, Loud. Arbor. Brit. 1v. p. 2349.

Abies glaucescens, et A. tlapalcatuda, Roezl. Cat. Grain. Conif. Mex, 1858-59, ex Parlat. in DC. Prodr. xvi. 2, p. 420. Picea glaucescens, Gord. Pinet. p. 149.

N. V. Oyamel; Mex. Ovámetl.

Sierra de las Cruees, á 9,000 y 11,000 piés (Est. de México), Octubre 21 de 1892 (C. G. Pringle, 4357).

SUB-TRIBUS, III. TAXODINEÆ,

Taxodium mucronatum, Ten. Osserv. su di una Pianta Conif. del genre Taxod. tt. 1 et 2; DC. Prodr. xvi. 2, p. 441.

Taxodium distichum, H. B. K. Nov. Gen. et Sp. 11. p. 4, non Rich.; SEEM. Bot. Voy. "Herald," p. 335.

Taxodium montesumæ, Dene. in Bull. Soc. Bot. de France, ı. p. 71.

Taxodium mexicanum, CARR. Conif. p. 147.

N. V. Sabina, Ahuehuete; Mex. Ahuehuetl.

Florece en Octubre v fructifica en Noviembre.

En las corrientes de agua. Las Canoas (Est. de S. Luis Po-Tosí), Noviembre 3 de 1890 (C. G. Pringle, 3321).

TRIBUS II. CUPRESSINEÆ.

Sub-Tribus, VI. CUPRESSINEÆ.

Cupressus arizonica, GREENE in hb. Pringle.

Montañas cerca de Paso de Carneros (Est. de Coahuila), Septiembre 8 de 1889 (C. G. Pringle, 2658).

SUB-TRIBUS, VII. JUNIPERINEÆ.

Juniperus flaccida, Schl. in Linnæa xh. p. 495; DC. Prodr. xvi. 2, p. 492.

Juniperus fætida, Θ. flaccida, Spach. in Ann. Sc. Nat. sèrie 2, xvi. p. 300.

Sabina flaccida, Antoine, Conif. tt. 49 et 50.

De 20-30 piés. Cerros secos, Las Sedas, á 6,000 piés (Est. de Oaxaea), Septiembre 15 de 1894 (C. G. Pringle, 4794).

Juniperus mexicana, Schiede in Linnæa v. p. 77, et xii. p. 494; Parlat. in DC. Prodr. xvi. 2, p. 491.

Juniperus deppeana, Steud. Nomencl. Bot. ed. 2, p. 835. Juniperus gigantea, Roezl. Cat. p. 8; Gord. Pinet. p. 122.

Sabina mexicana, Antoine, Conif. p. 38, t. 51, et S. gigantea, ead. ibid. p. 36, tt. 48 et 50.

Cerros calizos cerca de Tehuacán, á 7,000 piés (Est. de Pue-Bla), Diciembre 21 de 1895 (C. G. Pringle, 6298).

Juniperus occidentalis, Hook.

var. conjungeus, Engelm.

Sierra de Sta, Eulalia (Est. de Chihuahua), Marzo 30 de 1886 (C. G. Pringle,....); En terrenos bajos, Haeienda de Angostura (Est. de S. Luis Potosi), Julio 14 de 1891 (C. G. Pringle, 3771).

Juniperus tetragona, Scht. in Linnæa xii. p. 495; DC. Prodr. xvi. 2, p. 491.

Cupressus sabinoides, H. B. K. Nov. Gen. et. Sp. II. p. 3. Juniperus mexicana, Spreng. Syst. Veg. III. p. 909.

Sabina tetragona, Antoine, Conif. p. 40, t. 53.

Terrenos de la Sierra de Ajusco, á 9,800 piés (DISTRITO FEDERAL), Octubre 4 de 1895 (C. G. Pringle, 6284).



ÍNDICE.

		Pågs. →		P	ágs. –
Abelia	coriacea	112	Acacia	glandulifera	75
	floribunda	112	_	hartwegii	75
Abies 2	laucescens	418	_	hirsuta	74
	irtella			lumilis	76
- r	eligiosa	418	_	insignis	74
- 1	lapalcatuda	418		micrantha	75
ABIETIN	Б.Е	416	-	obliquifolia	77
Abron	ia turbinata	296	_	pennatula	75
Abutil	on amplexifolium	24	_	pringlei	75
	attenuatum	24		pulverulenta	74
_	crispum	24	_	riparia	75
	jacquini	24	_	spadicigera	75
	sidoides	24	-	stipellata	74
_	sonoræ	24	_	tequilana	75
_	triquetrum	24		texeusis	74
Acacia	albicans	77	-	trichandra	74
	angulosa	75		umbellulifera	75
_	callistemon	76			74
-	chlorantha	75		elongata	81
	cochliacantha	74		l 160 y	
	constricta	74	Acalipho	a billbergiana	
	cuspidata	74	-	dissitiflora	
	diversifolia	74	_	diversifolia	
	elcgaus	74	_	erubescens	
	esculenta	74	-	flavescens	
4-1-47	fasciculata	73	-	fournieri	
	filicina	74		genuina	
_	glabrata	74	_	glandulifera	322

	Págs,	Pa	ágч.
Acalipha hypogæa	322	Actinochtoa humilis	101
- interrupta		- prostrata	
- leptostachya		- tennis	
- lindheimeri		Actinocyclus secundus	
- longipes		Actinomeris pedunculosa	
- multispicata	. 323	Acuyo	
- neo-mexicana	. 323	Adelia barbinervis	
panameusis		- dodecandra	322
phleoides	. 323	Adenanthereæ	72
 polystachya 	. 323	Adenopetalum ellipticum	314
 purpurascens 	. 323	- graminemm	311
 rivinæfolia 	. 323	- hoffmannii	314
 schiedeana 	. 323	→ mcxicamm	314
 subviscida 	292	- wrstedii	
ACANTHACEÆ	271	Adolphia infesta	
Acece,	276	Æginetia tongiftora	
ACERACEÆ	. 45	Ægopogon cenchroides	
Accrates viridiflora	. 216	- geminiflorus	
Achæta plumosa	. 400	- gracilis	
Achætogeron linearifolius	140	- multisetus	381
- pinnatifidus	140	quinquesctus	
Achillea millefolium	. 186	- setifer	
Achimenes coccinea	. 268	- trisctus	
- cordata	. 268	- unisetus	
ghiesbrechtiana.	. 268	Æschynomene americana.	59
- gloxiniflora	. 268	 amorphoides 	59
- grandiflora	. 268	- ciliata	59
Achyrantes assessment	. 268	– fascicularis	59
Achyrodian def	. 298	glaudulosa	59
Achyrocline deflexa	. 145	- hispida	59
Achyronychia parryi Achyropappus authemoides	. 297	- hispidula	59
zienyropappus anthemotdes	. 177	- longifolia	57
Achyrophorus roseus	. 178	- petræa	59
Acleisanthes longiflora	. 200	- picta Aganippea bellidiflora	
Acourtia formosa	. 296		
hebeclada	. 197	Agave house	
- rigida	. 196	Agave brunnea	
Actinea chrysanthemoides	106		
Actiuella linearifolia	. 186	cohnianafalcata	
- odorata			
Actinochloa gracilis		guttatamegalacantha	
- hirsuta			
"" and "" "	. 404	- variegata	330

K-11	48
Agavo yuccæfolia 33	Alchemilla pinuata 81
	sibbaldiæfolia. 81
— teterrima 30	93 — velutina 81
Ageratella micropbylla 26	00 Alcina ovalifolia
	24 Alectoroctonum cotinifolium 313
	24 _ wildenowj 313
- callosum 1	24 Alegria
 glanduliferum. 1 	25 Alevia leptostachya 322
- pedatum 1	78 Alfilerillo
punctation 13	25 Algarobia dulcis
- tomentosum 1:	25 — glandulosa 72
Agropyrum repens 1	15 ALLIEÆ 355
	90 Allionia aggregata 295
Agrostis atrovireus 3	
- cryptandra 3	
- debilis 39	33 Allium glandulosum 356
— dnlcis 39	99 — longifolium 356
- fasciculata 3	98 — scaposum 356
— lanata 3	98 — striatum 355
— laxiflora, 3	99 Allocarpus integrifolius 173
— michanxii 3	99 — scabrifolius 173
- microsperma 3	93 Alnus acuminata 330
- mncronata 3	95 Alonzoa caulialata 253
- pubescens	98 Aloysia floribunda 277
- scabra 3	99 — Lycioides 277
- schiedeaua 3	99 Alsine.e 16
— setifolia 3	99 Alsodeia parvifolia 12
— setosa 3	93 Alsodeie.e
 stipoides 3 	95 Alstræmeri.4 348
- verticillata 3	99 Alstræmeria ovata 348
- virescens 3	99 Alternanthera canescens 299
Aguja del pastor	35 <u> latifolia 300</u>
Aliueliuete 4	18 - richardii 300
Almehuetl 4	18 Alvaradoa amorphoides 38 y 45
Ahuilote 25	81 ALYSSINE# 7
Altuitule 1	22 Amapolita morada
Aile 3	30 AMARANTAĆEÆ 297
Ајисопреж	94 Amaranteæ
	29 Amarantus hypocondria-
Alcahueil	95 cus 297
Alchemilla hirsuta	81 — palmeri 298
orbiculata	81 Amate amarillo
perfoliata 1	50 - blanco 325

Págs,	Págs,
Amate prieto 326	Andropogon floridus 378
Amarylleæ	- lirtiflorus 379
AMARYLLIDEÆ 346	- incompletus 380
Ambliyanthera tubiflora 214	- leucopogon 379
Ambrina ambrosioides, 301	- lbotzkyi 378
- fætida 301	- macrourus 379
Ambrosia artemisiæfolia 151	- mclanocarpus 378
Amellus pedunculatus 175	— myosurus 379
Amicia zygomeris 59	- nutans 379
Ammanieæ 87	- obtusifolius 378
Ammineæ	- paniculatus 378
Ammi visnaga 105	piptatherus 380
Amoreuxia wrightii 13	- provincialis 380
AMPELIDACEÆ 43	 saccharoides 380
Ampelideæ	- scoparius 378
Ampelopsis quinquefolia 43	- scrobiculatus 378
Amphilophium molle 260	- sorghum 380
Amyris madrensis 38	— tenellus 378
— parvifolia 38	- virginicus 380
Anacahuite	Androsace cinerascens 209
ANACARDIACEÆ 45	Anemiopsis bolanderi 307
Anacheilium cochleatum 336	— californica 307
Anagallis arvensis 209	Anemoneæ 2
Anatherum domingense 380	Angelica nelsoni 107
— <i>macrourum</i> 379	- pringlei 107
- virginicum 380	Angelonia angustifolia 255
Ancyrostemma micranthum 94	Anisacanthus insignis 275
Andrieuxia mexicana 153	– virgularis 275
Andromedeæ	- wrightii 275
Androphoranthus glandulosus 321	Anisillo 177, 178, 183 y 271
Andropogoneæ	Anisophyllnui amæunm 312
Andropogon acuminatus 378	- densiflorum 312
— alopecuroides 377	— humboldtii 314
— allionii 379	— lindenianum 312
- brevifolius 378	- senile 317
— condensatus 378	Anoda brachyantha 21
- contortus 378	- crenatiflora 21
— <i>debilis</i> 378	— cristata 21
densus 378	- dilleniana 21
- domingensis 380	— hastata 21
— elythrophy-	— incarnata 21
llus 379	- lanceolata 21
— erianthus 377	- parviflora 21

PAgs	Págs.
Anoda triangularis 21	Apodanthes pringlei 306
- triloba 21	Arabide.e 7
 — wrightii 21 	ARALIACEÆ 109
ANONACE.E 4	Aralia pubescens 109
Anona chsrimolia 4	Aralteæ
- globiflora 4	Árbol del perú 46
→ tripetala 4	Аквител 204
Anthemide.r	Arbutus densiflora 204
.Inthemis buphthalmoides 153	- pilosa 206
- globosa 155	- varians 204
— ovalifolia	- xalapeusis 205
Anthephora axilliflora 406	Arceuthobium robustum 311
belangeri 381	- vaginatum. 311
- slsgans 381	Arctostaphyllos glauces-
Anthericum leptophyllum, 354	cens 204
— leucocomun 354	oaxacaua, 204
- nanum 354	pungeus?. 205
- reflexum 354	- rupsstris. 205
- sessile 346	- serratifo-
Antirrhinum maurandioi-	lia 205
dss 256	- tomentosa 205
Anthospermer	Ardisia crennlata 210
Anthoxanthum gigauteum 377	→ pickeringia 210
Antheriem 364	→ revoluta
Anthurium cordifolium 364	Arecea
Auticlea mexicana	Arsnaria alsinoides 16
- volcanica 358	- decussata 16
Antigonon flavescens 305	— diffusa 16
viride 305	— nemorosa 16
Antiphytum floribundum 238	næhringioides 16
Antirrhinese 256	- rsptans 16
Aphanostephus arizonicus 140	Arethusa grandiflora 339
- arkansanus . 140	Aretillo 355
- humilis 140	Argemons mexicana 5
Apium ammi	Argythamnia humilis 321
- lsptophyllum 105	schisdsaua. 321
Aplopappus discoideus 139	Aristida bramaides 390
- gymnocephalus 141	- coarctata 390
- ranulosus 145	- divaricata 390
APOCINACEÆ 213	- purpursa 390
Apodanthera buræavi 97	- scabra 390
- pringloi 97	- setifolia 390
undulata 97	Aristolochia brsvipes 306

Págs	Págs.
Arietolochia guadalajara-	Aeclepias longicornu 217
na 306	- macrophylla 217
 longecaudata 306 	- macroura 217
- longipes 306	
 odoratissima. 306 	- mexicana 217
 pardina 306 	- nyctaginifolia 217
ARISTOLOCHIEÆ 306	- anotheroides 217
AROIDEÆ 364	- ovata 218
Arracacia acuminata 104	- pratensis 218
 atropurpurea 104 	- roeea 218
bracteata 104	- schaffneri 218
 filiformis 104 	- setosa
- mariana 104	- verticillata 218
- multifida 104	Asclepiodora circinalie 219
— pringlei 104	ASPHODELEÆ
- trifida 105	Aepilia angustifolia 159
- vaginata 105	- mexicana 159
Artanthe adunca	Aster caricifolius 141
- aurita 307	- ericæfolius 140
- seemanniana 307	- gymnocephalus 141
Artemisia dracunculina 186	- hesperius 141
— filifolia 186	– lima 141
- laciniata 186	- linifolius 141
- ludoviciana 186	- moranensis 141
- mexicana 186	— palmeri
- redolens 187	- pauciflorus 141
ARTOCARPE.E	— * prinnatus
Arundinella auletica 382	- potosinus 141
deppeana 382	- rivularis 142
- latifolia 383	- epinoeus 141
- scoparia 383	ASTRROIDEÆ
Arundo quitensis	Astragalus dispermus 57
ASCLEPIADEÆ. 215	- humboldtii 57
Aeclepias arenaria 216	- leptocarpue 57
- brachystephana. 216	- nuttallianue 57
- curaesavica 216	parvue 58
jasetentuta 217	- pringlei 58
8	— strigulosus 58
Brandoncolonis 217	- tolucensie 58
January 114	- triflorue 58
141145 1106a 21/	Astrephia pratensis 119
11114114	Astrogine crotonoides 320
— ' lindheimeri 217	Astronómica 90

Pags	Págs.
Atanasia amarga 134	Baccharis pterionioides 144
Ataxia mexicana 390	- ramulosa 144
Atexnchil	- rhexioides 145
Atheropogon americanus 403	- scandens 145
- apludioides 405	- seemanni 145
 bromoides 403 	- sordescens 145
- curtipendula 405	- veneta
— gracilis 404	- wrightii 145
- humilis 404	- xalapensis 141
 oligostachyus 404 	Bæria gracilis 176
- radicosus 403	Bahia absinthifolia 177
- repens 403	- anthemoides 177
- triana	- neo-mexicana 177
Atherospermea	— ucpetæfolia
Atlanchana 80	- schaffneri
Atmosférica	- schkuhrioides 177
Atriplex acanthocarpa 302	- sinnata 177
Atriplice # 302	Baileya multiradiata 176
Atropeæ 251	BALANOPHORE.E 312
Aurantie.e 38	Bambuseal
Avena deyenxioides 400	Banara mexicana 94
- clongata 401	Banareæ. 94
- sativa 401	Banisteria? panientata 33
— tolnccnsis 401	Banisterie.e
Avene.e	Barbas de chivo 1
Axiniphyllum tomentosum 154	Barbas de gato 1
Ayacotl 65	Barbudilla 324
Ayatito 357	Barcena gnanaxuatensis 42
Ayenia berlandisri 28	Barlsria discolor 273
— glabra 28	Barleriopsis discolor 274
- pussilla 28	Barroetea subuligera 136
Azafrancillo 261	Bassovia donnell-smihtii 250
Baccharis alamani 143	- mexicana 250
— asperifolia 143	Bastardia berlandieri 23
- conferta 144	Batalas heterophylla 241
— * cnncata 144	= wildenowii.; 241
- elegans 144	Bauhinia dipetala, 71
glutinosa 144	- divaricata 71
 hstsrophylla 144 	- lunarioides 71
- hirtella 144	- platypstata 71
- mucronata 144	— pringlsi 72
- potosina 144	BAUMNIE
ptarmicæfolia 144	Beaucarnea humilis 353

Pags	Págs,
Begoniaceæ 99	Bidens grandiflora 171
Begonia crenatifolia 99	- heliauthoides 171
- franconis 99	- heterophylla 171
- gracilis 99	- humboldtii 170
- lepidota 99	- inermis 171
- manicata 99	- lencantha 172
- palmaris 99	lindleyi 170
- palmata 99	- ludons 171
parviflora 99	- ocymifolia 166
- portillana 100	- odorata 171
- schizolepis., 99	- ostruthioides, 172
Bejaria mexicana 206	- palmeri 172
Beleño blanco 252	— pilosa 172
Beloperone fragilis 274	- procera 172
pringlei 274	– ригригса
Bellis mexicana 140	- scabiosoides 170
- xauthocomoides 140	- squarrosa 172
Berbereæ	- snlphurca 170
BERBERIDEÆ 5	- tenuisecta 172
Berberis fasciculata 5	- tereticaulis 172
- gracilis 5	tetragona 172
- pinnata 5	Bigelovia hartwogi.,, 139
Berendtia spinulosa, 259	veneta 139
Berengena 247	Bignonia æquinoctialis 269
Bernardia interrupta, 321	 buccinatoria, 269
- mexicana 322	cherere 269
Berulla angustifolia 106	diversifolia, 269
Beschorneria tubiflora 349	lencoxyla 270
Bessera elegans 355	— linearis 270
miniata	sarmentosa, 269
— multiflora 355	- stans 270
Ветилеж 330	- tecomoides 270
Bidens angustissima 170	BIGNONIACEÆ,,,
anthriscoides 171	Bignonie. 269
- arguta 171	Bis 26
- caudata 170	Віхеж 13
coreopsides 172	BIXINE.E 13
crocala 164	Blairia mexicana 279
dahlioides 171	Bletia aphylla, 336
decolorata 171	- campanulata,,,,,, 336
- ferulæfolia 171	fulgens 336
- fœniculifolia, 171	- furfuracea 337
- formosa 169	- palmeri 336

Pags	Págs.
Bletia roezlii	Bonteloua humboldtiana 403
sscunda 336	- oligoetachya 404
Bocconia arborsa 6	- polystacbya 404
fruteecens 6	- prostrata 404
- latieepala 6	- racemosa 405
Babera chrysanthemoides 180	- scorpioides 405
- fastigiata	- stolonifera 405
- incana 181	— tenuie 405
Bahmeria ampullacea 328	- triathera 405
- caudata 328	Bouvardia coccinea 113
- flagelliformis 328	— jacquini 113
nivea 327	- Ieiantba 112
- petiolaris 328	- longiflora 115
Boerhaavia arborea 296	- myrtifolia 113
- arboresceus 296	obovata 113
— erecta 295	- ecabra 113
_ viscoea 296	— splendens 113
Bolanoea coulteri 122	— ternifolia 113
Boldoa ovatifolia 296	- triphylla 113
Bomarea sdulis 348	. — versicolor 113
- ovata 348	Brachistus pringlei 250
Вомнасел	Brachycome xanthocomoides 140
Bombax palmeri 26	Brachypodium cæspito- sum 415
Bonplandia gsminiflora 231	mexica-
Borla de S. Pedro	num 415
BORRAGINEÆ. 237	pringIsi 415
Borrago officinalie	Brachyramphus intybacens 199
Borraja silvestre	Brahsa dulcis363
Borreria lævis	Brasil
- psyllioides 118	Brassica napus 8
- vamisparsa 118	- olsracsa 8
- verticillata 118	Brassiceæ 8
Borrichia fruteecens 159	Bravoa cœtocapuia
Boshi	- geminiflora 349
Botrydium schraderi 301	Bricho 69 y 70
Bouchetia erecta 254	Brickellia bstonicæfolia 134
- procumbens 254	- cavanillesii 134
Bouteloua bromoidss 403	- corymbosa 134
— burkei 403	coulteri 134
, curtipendula 405	—. cuspidata 134
havardi 403	— diffusa 134
— hirsuta 403	- hebecarpa 134
	Вот.—108.

Pags	Págs.
Brickellia hymenochlæna. 134	Bucholzia obovata
- laciniata 135	Buddleia acuminata 224
- lanata 135	- americana 223
- lancifolia 135	- callicarpioides 223
- nutans 135	- chapaleneie 224
- oliganthes 135	- decurrens 223
- palmeri., 135	- floccoea 224
scoparia 135	- humboldtiana 224
secundiflora 135	- lanceolata 224
eimplex 135	- macrophylla 224
spinuloea 135	- marrubiifolia 224
equamulosa 136	- occidentalis 223
thyrsiflora 136	- perfoliata 224
veronicæfolia 136	- pringlei 225
wielizeni 136	' - rufescens 224
Briza amarkiana 412	ecordioides 225
eragrostis411	- sperantha 224
- rotundata 412	. — verticillata 225
BROMELIACEÆ342	Buettnoria carthaginensie. 28
Browns canadensis	BUETTNERBEAG
Omatue 414	Bulbostylis cavanillesii 134
compresus 414	, — diffusa 134
- hookeri	hebecarpa 134
**************************************	- lanata 135
- marginatus 414	- ncpetæfolia 134
penantimis 414	oliganthes 135
Photherns 414	- pedimentosa 131
F. 8	- rigida
- rotundatus 412	- secundiflora 135
- segetus 414 Brongniartia folioloea 55	- veronicæfolia 136
	Bumelieze
***	Bumelia cuneata
	Bunchosia aquatica
	- bilocellata 31
·	- discolor 31
.=	- palmeri 31
73	- pringlei 31
D C C	Burro
	Bursera bipinnata 38
	- cuneata 38
- lithospermifolia 262	- fagaroides 38
	- galeottiana 39
- pilosa 262	kerberi 39

	Page.	Pá	gs.
Bursera lancifolia	39	Calanthera dactyloides 4	106
- lanuginosa	39	Calboa globosa 2	242
mexicana	39	Calceolaria mexicana 2	255
- palmeri	39		255
pringlei	39		255
Byrsonima cumingiana	31		231
- crassifolia	31		173
Cabeza de negro	238	- aspera	163
Cacabus mexicanus	251		173
Cacalia amplifolia	188		173
ccrvariæfolia	188	- clegans 1	173
— cordifolia	188	- integrifolia	173
- decomposita	188	- manicata	173
hederæfolia	188	— palmeri 1	174
jatrophoides	188	pedimontal ion	174
longipetiolata	188	salmiæfolia 1	174
napeæfolia	188	DOM DITTO II COLLEGE	173
paucicapitata	189	— urticæfolia	17-1
— peltata		Zucus Gententi	174
peltigera		ourenine mining bitter in the	174
- poculifera	189	Calebrachys peduncularis	174
prenanthoides		Ottomatia omemans	193
- pringlei		CHIEADURACERIA	193
racemosa		Calliandra conferta	76
— radulæfolia		- cumingii	76
schaffneri		- gracilis	76
sinuata	189	- grandiflora	76
tussilaginoides	140	- herbacea	76
Cacaloxôchitl		- humilis	76
Cacomite		- kunthii	76
Cacomitl		— nitida	77
CACTEÆ	100	- pallens	77
Cæsalpinia mexicana	68	portoricensis	77
- multiflora	68	Catabian promise action	254
pulcherrima	68	Omrigor ber range u Orman	281
Calabacilla venenosa	96	Current and Barrett and Comment of the Comment of t	361
Calamagrostis mexicana		Callitriche auetini	85
orizabæ		heterophylla	85
- plumosa		- verna	85
- quitensis		Calochortus bouplandianus	
Calamintha macroetema		- flavus	
- potosina		— pallidus	
Calandrinia acaulis	18	- purpureus	ฮอิบ

	Págs	Págs,
Calomea pulcherrima	185	Capsicum baccatum 250
Calomopotl		Capsicum microphyllum 250
Calonyction dubium	241	Capulin 30 y 78
Calophanes bilabiatus	272	Capulincillo
- capitatus	272	Capulin cimarrón
- decumbens		- manso 210
linearis	272	Cardiospermum molle 44
oblongifolia	272	Cardo santo
Calopogonium galactoides	64	Carduus subcoriaceus 195
Calotheca rotundata	412	Carex anisostachya 374
Calycoseris wrightii	199	- cladostachya 374
Calydermos longifolius	174	- densa
- peduncularis	174	— fanea 375
- salmiæfolius	174	- halleriana 374
- scaber	174	hartwegii 374
Calyptrostylis schiedeana	373	- leporina 375
	295	- maculata 375
Calzón de indio	264	- mexicana 374
	249	- monticola 375
Camelote.	387	- muehlembergii 375
Camote del monte	56	- oaxacana 375
— de ratón	69	- olivacea 375
Canavalia multiflora	64	planostachys 374
rostrata	64	 polystachya 374 y 375
villosa	64	 pringlei 375
Canchalagua.	227	 schiedeana
Canelillo.	146	— spilocarpa 375
Canilla de mulito	163	— straminea 375
Canna indica	341	— turbinata 375
CANNEÆ.	341	Cariceæ 374
	230	Carlowrightiahapalocarpa 274
	230	- pubens 274
Cantueso	289	Carminatia tenuiflora 128
Cañafístula	70	Carne de doncella 99
Caperonia palustris	321	Carpinus americanus 330
Capitaneja 164 y	166	Carpochæte grahami 136
CAPPARIDEÆ	10	Carroa diffusa 51
Capraria gratioloides	260	—glandulosa 51
CAPRIFOLIACEÆ		Carya olivæformis 329
Caprifolium pilosum	112	— . tetraptera 329
Capsella mexicana	8	CARYOPHYLLEÆ 15
- ? schaffneri	8	Casearie.e
.— . stellata	8	Cassimiroa edulis 37

	Pags.	Pags.
Casie.#	69	Castillsja pallida 263
Casiostega anomala	406	- schaffusri 264
Cassia absus	69	 scorzonsræfolia. 264
acapulceusis	69	— speciosa 264
— alcaparillo		- tsnuiflora 261
bacillaris	69	- tenuifolia 264
bicapsularis	69	- tolucensis 264
biflora	69	Castilloa slastica 326
browniana	70	Cathestecum srsctum 407
- canesceus	70	- prostratum 407
crotalarioidss		Cazahuate
— clliptica	70	Csauothus azureus 42
- smarginata	70	— buxifolius 42
fabaginæfolia	71	— grsggii 42
fistula	70	— infestus 43
— fistuloides	70	Cebadilla 357 y 358
— geminiflova	69	Csdronslla msxicana 291
- Ioptocarpa	70	- pallida 292
- multiflora	70	CELASTRINEÆ41
— multiglandulosa	71	Celosia procumbens 299
— occidsutalie		Celtide.e
— ovalifolia	69	Celtis pallida 324
- palmsri	70	— tala 324
- polyautha	70	Cempoalxóchitl grande 182
- puberula	69	pequeño 183
rotundifoliaseunoides	70	Cenchrus lævigatus 381
- scandides	69.	- tribuloidss 388
- tomentosa	71	Cenicilla
	71	Centunculus minimue 209
— xiphoides Castanoa vulgaris	69	Cephalantus occidentalis 112
Castaño	333	Cephalophora anthemoides 185
Castillsja angustifolia	333	Csrastium molls 16
— anthewidifolia		Cerasus capollin
- arvensis		- capuli 78
- cauoscsus	- 1	Cercocarpus betulæfolins 80
- foliolosa		- betuloides 80
- gracilis	263	 fothorgilloidee 80
- lanata		- parvifolius 80
 lithospermoidss. 	263	Cerdia cougsstifiora 18
- longibracteata		- glauca
	263	- purpurascane 18
- macrostigma		Cereus baccifera 100
- mexicana	263	geomstrizans 100

1	Págs,	Pags.
Cervera thevetia	213	Chenopodium fremontii 302
thevetioides	213	- graveolens 301
Cestrine#	252	- schraderianum, 301
Ceetrum fasciculatum	253	Chia 282 y 289
— dumetorum	252	Chicalote 5
- lanatum		Chicalotl 5
- nitidum	253	Chichicamolli 98
- parqui	253	Chichicaste 133
	253	Chichimecapatl
Cevallia sinuata	94	Chichimecatl
Chachahua	312	Chichiquahuitl
	390	Chilillo 1 y 47
- coarctata		Chiliophyllum globosum 155
- setifolia	390	Chilopsis linearis 270
Chælospora ferruginea	373	- ealigna 270
	363	Chilquan 142
		Chiltepiquín 250
	363	Chimaphyla maculata 207
	195	— menziesii 207
	196	- umbellata 207
Chapúz	185	Chinchayote 99
Chaquira	42	Chiococca phænostemon 116
Charaluteso	169	- racemosa 116
	412	Сиюсосселе 116
- subaristatum	412	Chioplé
Chayote	99	Chiqueo de monjas 241
Cheiroetsmon platanoidee.	98	Chirimolla4
Creen	27	Chironieæ
Chalona angusticati	256	Chismes 244
	257	Chlamydostylus multiflorus 344
	257	- tenuis 345
	257	Силопован
- campanulata		Chloris alba
campanutoraes	257	- curtipendula 405
eregans	257	- dubia
**************************************		- elsgane 402
703000,		- submutica 402
- ruellioides	257	Chomelia pringlei 116
CHENOPODIACE		Chondrosium aschenborniamm, 404
Chan an adjum ambuggi sides	301	— fænum 404
Chanopodiumambrosioidas		- gracile 404
- effussum		- hirtmn 403
— fœtidum	301	- humile 404

Pá	Págs.
Chondrosium microstachynm 40	4 Cirsium platicephalum 195
 oligostachyum 40 	
- parryi 40	4 CISSAMPELIDEÆ 4
- polystachyum 40	4 Cissampelos acuminata 4
- tenue 40	
Chopo 33	4 _ pareira 4
Chrysactinia mexicana 18	Cissus ampelopsis 44
- pinnata 18	
- truncata 18	
Chrysanthellum integrifolium 17	
 procumbens, 17 	
Chrysanthemum parthe-	Clavigera corymbosa 134
nium. 18	
Chrysophania fastigiata 15	5 _ scoparia 135
Chrysopogon nntans 38	0 _ spinnlosa 136
Chthamalia nummularia 22	Claytonia perfoliata 19
Chupire 31	3 CLEMATIDEÆ 1
Cichoriaceæ	8 Clematis dioica 1
Cicuta 10	4 — grossa 1
Cielo raso 21	3 — pitcheri 1
Cihuapatli 15	7 - sericea 1
Cinchona caribaa 11	4 CLEOME.#
CINCHONE.E	Cleomella mexicana 10
Cinco Ilagas 171 y 18	Cleome longipes 10
— negritos 27	6 potosina 10
Cineraria augustifolia 19.	
 petasitis	
 platanifolia 19: 	
— pracox 19	
salicifolia 19:	
Cinna macronra 39	
setifolia 39	
stricta	
Cipura graminea 34	Clomenocoma aurantia 180
— hmnilis 34-	
paludosa 34	
Cirsium cernuum 19-	
— heterolepis	
 jornllense	
— lanceolatus 19-	4
— maximum 195	
- mexicanım 19-	jorullensis 194
- nivale 19-	linearifolius 194

Págs,	Págs.
Cnicus mexicanus 194	Colubrina greggii 42
- nivalis 194	— infesta
- reglensis 194	Comaclinium aurantiacum 181
 rhaphilepis 194 	Comarostaphyllis glaucescens 204
subcoriaceus 195	— oaxacana 204
- tolucanus 195	— polifolia 205
— velatus 195	COMBRETACEÆ
Cnidium peucedanoides 105	Сомветел
Coachipitin 50	Combretum farinosum 86
Coamecate 305	Comida de pajarito 9
Coamecate azul	Commelina angustifolia 359
Coamecate de cerro 34	— decumbens 359
Coamecatl	- gramiuifolia 359
Coanenepilli 80 y 296	pallida 359
Cobæa scandens 232	- rubeus
Coccolobeæ305	- tuberosa 360
Codo de fraile	COMMELINACEÆ359
Cœlestina albida 124	Commeline &
- tomentosa 125	COMPOSITÆ 121
Cætocapnia geminiflora349	Conanthera albiflora 354
Coffee arabica	- echeandia 354
Coil anthe moçini	CON1FERÆ 416
Coix arundinacea	Conium maculatum 104
— lacbryma 377	CONNARACEÆ 47
Cola de alacrán	Connare 47
— borrego 263	Conobea alata 259
— mico	- pusilla 260
— zorra 197 y 395	Conopholis mexicana 266
Coldenia canescens 236	Conostegia xalapensis 86
Colecitas	Consuelda mayor 233
College 43	Contra ranilla de bestias 44
Collegia cavanillesi259	Contrayerba 218 y 325
Collomia cavanillesiana 230	CONVOLVULACEÆ 240
- longiflora 230	Convolvuleæ
Cologania birta	Convolvulus albiflorus? 244
Janscana 63	- arvensis 244
— ovatifolia	- bonariensis 244
- procumbens 63	- capillaceus 240
pulchella 63	- dissectus 244
Colorin	- equitans 244
Colubrina buxifolia	- glaucifolius 244
- ehrenbergii 42	- incanus244
glomerata 42	- macranthus 242

Págs	. Pags.
Convolvulus staus 243	Coriaria thymifolia 47
— suffultus 243	CORIARIE.E 47
Conyza asperifolia 143	CORIDE.E
— coulteri 143	Coripha dulcis
- gnaphalioides 143	Совірнеж
- hispida 143	CORNACE 110
- microcephala 143	Cornus disciflora 110
 pulchella 143 	— excelsa 110
 sophiæfolia 143 	- florida 110
— tricuncata	- grandis 110
Copal	- stricta 110
_ chino 38	Correosa
— de santo 39	Corrigiola andina 297
Copito 235	CORYLEÆ
Cornl	Cosmanthus mexicanus 232
Coralillo	Cosmea Intea 171
Corallorhiza ehrenbergii 336	Cosmos bipinnatus 169
Corchorus siliquosus 29	- caudatus 170
Cordia alba 234	- crithmifolins 170
— boissieri 234	— purpureus 170
- brevispicata 234	- scabiosoides 170
- cana	- sulphurens 170
— deutata 234	— tenuifolius 170
 dodecandra 235 	Costomate
 macrocephala 235 	Cotoneaster denticulata 82
 podocephala 235 	Cottea pappophoroides 407
- pringlei 235	Cotyledon batesii 83
Совыеле 234	— grayi 84
Cordón de S. Francisco 299	- parviflora 84
Cordylanthus orcuttianus. 265	- subrigida 84
- wrightii 265	Conlterophitum laxnm 108
Corcopsis amplexicanlis 163	Coztipatli
— artemisiæfolia 170	Coztomatl
— diversifolia 171	Cranichis schaffneri 338
fernlæfolia 171	Crantzia lineata 106
— formosa 169	_ schaffneri 106
gcorgina 169	CRASSULACEÆ83
- heterophylla 158	Cremospermeæ98
- linearifolia 168	Crinum erubescens 347
— mutica 168	Critonia daleoides
- petrophylla 168	- hebecarpa 130
— tetragona 172	Crossandra? fascicularis 274
Coriaria atropurpurea 47	Crotalaria acapulcensis 48

	Pags.	I ³	ags.
Crotalaria eriocarpa	47	Crypsis stricta	398
 guatemalensis. 	47	Cuajiote amarillo	39
- incana?	48	Cuaulote	29
- lupulina	48	Cucharilla	353
maypurensis	48	Cucumerine.e	96
— pumila	48	CUCURBITACE E	96
sagittalis	48	Cunde amor?	256
— setifera	48	Cunila longiflora	284
— triantha	48	— polyantha	283
Croton argenteus	321	- pycnantha	283
calvescens	319	Cuphea æquipetala	87
 castaneæfolius 	321	 appendiculata 	87
cortesianus	319	— atrosaiguinea	87
 ciliato-glandulosus 	319	- avigera	87
— dioicus	320	- bracteata	88
elæagnoides	319	- calcarata	88
- fruticulosus	319	- coccinea	88
- gracilis	320	— cyanea	88
- lobatus	320	- eminens	88
— maritimus	320	- floribunda	87
- monanthogynus	320	- hyssopifolia	88
- morifolius	320	— jorullensis	89
- panamensis	320	- lanceolata	88
— penicillatus	319	- liebmanni	88
- repens	320	- mesochloa	88
- trichocarpus	319	- micropetala	88
CROTONEÆ	319	- ocimoidcs	87
CRUCIFERÆ	7	- palmeri	89
Crusea brachyphylla	117	- pringlei	89
calocepbala	117	procumbens	89
- coronata	117	— pubiflora	88
— cruciata	117	- purpurea	89
- megatocarpa	117	- reipublicæ	89
- subulata	117	- retroscabra	89
- villosa	117	- scabrida	87
Cryphiacanthus angustifolius	273	- silenoides	88
- barbadensis	273	— strigillosa	88
- viscosus	273	- strigulosa	88
Crypsinna macroura	398	- tolucana	89
setifolia		— violacea	87
— stricta	398	- virgata	87
Crypsis macroura		Cupressineæ	418
— sctifolia	398	Cupressus arizonica	418

P	ags		Págs
Cupressus sabinoides 4	119	CYPERAC	CE.E 366
	330	Cyperus	amabilis 366
	202	- 31	aristatus 366
	319	_	articulatus 366
	245	_	asperrinus 369
	245	_	atropurpureus 366
5	245 [aurautiacus 366
	245		aureus 366
	245	_	bourgæi 366
	245	_	brainerdi 366
	245	` —	bromoides 366
	245	_	buckleyi 367
	246	_	compressus 367
	245	_	diandrus 367
	98		divergeus 369
	98		falciculosus 366
	98	_	flavus 367
	98	_	glareosus 366
•	97		gracilis 367
Cyclobothra barbata 3		_	haspan 367
— flava 3		_	humilis 367
- grandiflora 3		_	incompletus 367
— lutea		_	inflexus 366
- pallida 3			lævigatus 367
- propingna 3		_	lateriflorus 367
— purpurea 3		_	luzulæ 368
Cycloloma platyphyllum 3		_	nıanimæ 369
Cyclostigua deuticulatum 3		_	melanostachyus 368
— panamense 3	- 4	_	nnicronatus 368
Cydista æquinoctialis 2		_	mutisii 368
- diversifolia 2		_	nudus 367
	82	_	ochraceus 368
Cymbopogon condensatus 3	- 4	_	oligostachyns 366
— melanocarpus 3			patzcuarensis 368
Cynancheæ2		_	prolixus 368
Cynanchum mexicanum 2		_	purshii
- prostratum 2			scaberrinus 369
Cynara carduunculus 1			seslerioides 369
Cynaroideæ1			spectabilis 369
Cynoglossum mexicanum 23		_	squamosus 366
Cynosurus gracilis 3			surinamensis 369
— secundus 40		_	teuerrinms 367
- tenellus 35	₈₂ [_	triceps 369

	Págs.		Pags	s.
Cyperus tristachyus	369	Dalea	lasiostachya 5	2
— uniflorus	369		lemmoni 5	2
variegatus	368	_	leporina 5	1
viscosus	369	-	leucostachya 5	2
wrightii	369	_	leucostoma 55	2
Cypripedie.e	341		luisana 5	2
Cypripedium irapeanum			lutea 5	2
- lexarzæ		-	microphylla 5	2
- molle		_	mollis 5	2
- splendidnm	341	_	mucronata 5	3
Cyrilla pulchella	368	-	mutabilis 5	3
CYTINACEÆ	306	-	naviculifolia 5	3
Cytinus oxylepis	306	_		3
Dahlia bidentifolia	168	_	nutans 5	3
- cervantesii	168	_		2
coccinea	168	_		3
- crocata	169	_	plumosa 5	3
- decaisneana	169	-		3
- disecta	168	_		3
glabrata	169	-	polyphylla 5	1
— merckii	168	_		3
- minor	169	-		-1
- pinnata	169	_		4
Parococomo	169			54
- rosea	169			54
- sambucifolia	169			54
Superjuite	169	-		4
- variabilis		-		54
Dalog olbidana	67	_		54
Dalea albiflora	51	_		54
- alopecuroides	51	_		54
- argyrostachys	52	_		54
carycosa	51	-		5.4
- citriodora	51	_		5.‡
Cimor Hana	51	_		51
- crenulata	53	_		55
diffusadomingensis	51	Dalia s	ilvestre 16	
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	51		па 95 у 18	34
- elegans	53		nonia mexicana 40)2
- frutescens	51	Dasyl	irion acrotichum 35	53
— gracilis		_	- gracile 35	
- gracillima	52	-	graminifolium 3	53
inconspicua	52	_	- inerme 35	53

Pags.	Pags.
Dasylirion pitcairniafolium 342	Desmodium strobilaceum 61
— wheeleri 354	- subspicatum 61
Dasystoma laciniata 262	- tortuosum 62
Datura ceratocaula 252	Despretzia mexicana 412
- quercifolia 252	Deutzia mexicana 83
- stramonium 252	Devenxia orizabæ 400
- tatula 252	— ? powformis 413
Daucus montanus 107	Diaphoranthema recurvata 343
— toriloides 107	— 1miflora 343
Deanea nudicaulis 109	Diastema gloxiniflorum 268
Decachæta hænkeana 124	Dichondra argentea 245
Decatropis coulteri 37	Dichondreæ
Delphiuium azagræanum 3	Dichromena ciliata 371
- azureum 4	- globosa 371
- madrensis 4	- leucocephala 370
Delucia obstruthioides 172	- nervosa 371
Demetria spathulata 138	- pringlei 371
Dendropanax arboreum 109	— pura 371
Dermatophyllmn speciosum 68	— schicdeana 373
Deschampsia cæspitosa 400	Dichrophyllum marginatum 317
- elongata 400	Dicliptera brachyata 275
- pringlei 400	- peduncularis 275
Desmanthodium ovatum 148	Dicraurus diffusus 301
- perfolia-	- leptocladus 301
tum 148	Dictyanthus campannlatus 220
Desmodium amans 60	 ceratopetalus 220
- asperum 60	pavonii 220
- gramiueum 60	- tuberosus 220
— guadalajara-	Didymæa mexicaua 119
num 60	Dienia majanthenrifolia 335
- hartwegia-	— myurns 335
num 60	Diente de León
- jaliscanum 60	Digitale.e
- lindheimeri 60	Digitaria filiformis 383
- linearifolium. 61	Dinebra bromoides
- macrosta-	- cartipendula 405
chyum 61	- repens 403
- molliculum 61	Diodia teres
- orbiculare 61	Diomedea bidentata
- plectocarpum. 61	DIOSCOREACEÆ
- psilophyllum. 61	Dioscorea composita 350
- scorpiurus 61	- convolvulacea 350
- spirale 61	- galeottiaua 350

Pags	Págs
Dioscorea grandiflora 351	Dracocephalum mexicanum 291
- hīrsuticaulis 351	- moldavicum, 291
— jaliscana 351	Drejera puberula275
— laxiflora 351	— wrightii
— militaris 351	Drymaria anomala 17
— minima 351	- arenarioides 17
- multinervis 351	fendleri 17
— plumifera 351	- frankeuioides 17
- pringlei 351	- gracilis 17
 remotifiora 351 	- longepedun-
Diplachne dubia 408	culata 17
 fascicularis 409 	- nodosa 17
— spicata 409	- tenuis 18
- tolucensis 414	- villoea 18
- viscida 409	- xerophylla 18
Diphalangium graminifolium., 355	Duhamelia patens 115
Diphysa floribunda 57	Dysodia accrosa 181
- sennoides 57	appendiculata 180
- suberosa 57	- cancellata 180
Diploma villosa 138	- chryeanthemoides. 180
Diplopappus ericoides 141	- fastigiata 180
Diplostephium moranense 141	- glandnlosa 180
Diplothria acerosa	— grandiflora 181
Dipteracanthus geminiflorus 273	- incana 181
— linearis 272	- integerrima 181
— paniculatus, 273 Dissanthelium sclerochloi-	- porophylloidee 181
	— pubescens 181
des 409	— serratifolia 182
Distreptus spicatus	- tagetiflora 180
D	Dysodium divaricatum 149
	Echeandia albiflora 354 y 355
Dolichos urens	- graminea 354
	- hænkeana 354
D	- leptophylla 354
Doretenia contrayerba 324	— leucantha 355
- drakena 325 - excentrica 325	- nodosa 354
- honstoni 325	- terniflora 351
	Echeverria paniculata 84
	Echinacea heterophylla 158
Draba jorullensis 7	Echinocacter
— myoeotidoides 7	Echinocactus cornigerue 100
- tolucensis 7	Echinocyetis cirropeduncu-
Dracæneæ	latus 97

Págs	Pags.
Echinocystis coulteri 97	Elensine mueronata 406
— floribunda 98	Elionurus barbicularis 377
- pubescens 98	Elvira biflora 148
Echinopepon horridus 97	Elynus canadensis 415
Echinops sphærocephala 193	Elytraria apargiafolia 272
Echinopterys lappula 32	_ bromoides 272
Echinospermun mexica-	- calicosa 271
num 237	_ canlescens 272
- redows-	* fasciculata 271
kii 238	_ frondosa 271
Echites brachysiphon 213	- microstachya 272
— hypolenea 215	- pachystachya 272
- macrosyphon 215	_ ramosa 271
— secundiflora 214	- tridentata 271
- snaveolens 215	Empueshte
— tubiflora 214	Encelia amplexicaulis 163
Есштіреж 214	— cordata 163
Echium candicans 240	 glutinosa 163
Eclipta alba 154	— hypargyrea 163
— humilis 155	- lagascæformis 163
Egletes humilis 140	— uexicana163
— viscida 139	- rhombifolia 163
Ehretia cordifolia 235	— sanguinea 163
- elliptica 235	- subaristata 164
— luxiana 235	Encina de miel
— mexicana 235	Encinilla 320
Ehretieæ	Engorda cabras 54
Einomeia brevipes 306	Enslenia ligulata 219
Elaterium carthaginense 98	Epazote 301
— ? coulteri 97	Epazotl 301
 pnbescens 98 	Ephedra trifurca 416
ELATINEÆ 19	Epicampes bourgæi 398
Elatine americana 19	- lanata 398
Eleogenus capitatus 370	— macroura398
 modulosus	- pubescens 398
Elephantopus angustifolius 122	Epidendreæ
— carolineanns 123	Epidendrum bracteolatum 337
— martii 123	- cochleatum 336
— mollis 123	— marginatum 337
— scaber 123	- radiatum 337
— spicatus 123	radicans 337
— tomentosns 123	— rhizophorum 337
Elefantosis angustifolia 122	— rigidum 337

Págs	Pags.
Epidendrum vandifolium 337	Erigeron heteromorphus 142
- verrucosum. 337	- lanatus 142
Epilobium bonplandianum 90	- longipes 142
— mexicanum 90	- mucronatus 142
Eragroetis capillaris 409	- palmeri 142
— ciliaris 409	- pathulatus 145
— cognata 410	- ecaposue 142
- flavescens 411	- subdecurreus 145
— limbata 409	ERIOCAULE.E 365
 Iugene 409 y 410 	Eriocaulou benthami 365
 mayor et minor 411 	- microcephalum 365
 megastachya 411 	Eriochloa acuminata 385
- mexicana 410	- Iemmoni 385
oxylepis 410	- polyetachya 385
- parvula 411	— punctata 385
- pectinacea 410	Eriocoma floribunda 157
- pilosa 410	- fragans 157
- plumbea 410	Eriodendron tomentosum. 26
— poæformis 411	Eriogoneæ
poæoidee 410	Eriogonum abertiana 303
— purshii 411	 rotundifolium . 304
- pussilla 411	- thomasii 304
reptane411	 wrightii 304
151dd	Erioeema diffusum 67
occumuliora 411	- grandiflorum 67
reprisonantines 409 V 411	- multiflorum 67
- unionis 410	- palmeri 67
- vaklii 412	- pulchellum 67
- veræ-crucis 410	Eritrichium floribundum 238
Erechtites hieracifolia 187	- hispidum 238
Erianthus alopecuroides 377	— jameeii 238
- brevibarbis 377	- linifolium 238
- contortus 377	micranthum 238
eaccharoides 377	pusillum 238
ERICACEÆ204	Erodium cicutarium 35
Ericala spathacea. 228 Erigeron affinis. 142	— moranenee 35
alamacana	Erucaria glabra
- alamoeana 141	Eryngium bonplandii 102
- cinereus 142	- bromeliæfolium 102
- coronopifoliue 142	- carlinæ 102
- delphinifolius 142	- comosum 102
- divergens 142	- deppeanum 102
 gnaphaliodee 142 	 ghieebreghtii 102

	Pags.	Págs.
Eryngium involucratum	102	Estrellita
- longirameum		Eucæsalpinieæ
- mexicanum	102	Euchlana giovanninii 376
	103	- luxurians 376
 nasturtiifolium. 	103	— mexicana 376
 phyteumatos 	103	Eucuemis brevilabris 338
- protæflorum	103	Eucnide lobata94
 ranunculoides 	103	Eugenia schiedeana 86
scaposum	103	Eulineæ
- serratum	103	Euloganieæ
wrightii	103	Eulophia dilatata
Erythræa calycosa	226	Eulophus peucedanoides 105
- chilensis	226	Eulorantheæ 310
chironioides	226	Eumimose.e. 72
divaricata	226	Eumyrsineæ 210
macrantha	226	Eupapavereæ 5
— madrensis	226	Eupatoriaceæ
— mexicana	226	Eupatorium adenopho-
- setacea	227	rum 128
speciosa?	227	 adenosper-
stricta	227	mum 128
tetramera	227	ageratifolium 128
Erythroxyleæ	31	albicaule 128
Erythroxylon macrophy-		 amplifolium 129
llum	31	 aschenbornia-
Erythryna coralloides	63	num 129
— longipes	63	 bellidifolium . 129
- setosa	63	brevipes 129
Escoba colorada 51 y	52	- bustamanta 129
	395	— calaminthæ-
	261	folium 129
- linearis		— capillare 134
- stricta		- collinum 129
Escobetilla		collodes 129
Escobilla		— conyzoides 129
Escobilla ó hierba de las escobas		daleoides 130
Escorzonera		- deltoideum 130
Espanta lobos		— denticulatum 133
Espejoa mexicana		— diffusum 134
Espinosilla	231	espinosarum. 130
Estafiate 186 y		- filicaule 130
Estrella		- glabratum 130
— de agua	153	- glandulosum 128
		Вот.—112.

		Págs.		Pags.
Eunstonia	grandidenta-	- "		-
wp and I tull		100	Eupatorium	veronicæfolium 136
	tum	- 1	_	wrightii 133
	greggii hastile		Euphorbia	adenoptera 312
-	hebecarpa		_	ammatotricha 313
-	houstonis		_	anecps
_				antisyphilitica 313
	hyssopinum incomptum		-	biformis 313
-	ivæfolium		_	bonplandii 317
	leptopodnin		_	brasiliensis 313
	longipes		_	callitrichoides 312 y 316
-	macrocepha-	191	_	calyculata 313
	lum	131	-	campestris 313
-	macrophy-	101	_	canaliculata 314
	llum	121	_	cotinifolia 313
-	monanthum.		_	cumbræ 314
_	nigrescens		_	cuphosperma 314
-	nutans		_	cuspidata 315
	occidentale		_	delicatula 314
	oliganthes		_	dentata 314
	palmeri		_	dietyosperma 314
_	pedunculosnu		_	dioica
_	petiolare	131	_	erytrophylla 316
_	popocatepe-	101		francoana 314 graminea 314
	tlense	131		heterophylla315
-	populifolium.		_	humboldtii 314
_	pringlei			hypericifolia 315
-	pulchellum	132	_	jaliscensis 315
-	pycnocepha-		_	laredana 315
	lum	132	_	lathyris 315
-	quadrangu-		_	leptalea 314
	lare	132	_	longecornuta 315
	rhodochlami-		_	macropoides 315
	deum	132	_	marginata 317
_	saltivarii	132	_	mendezii 315
_		132	_	misella 315
_	scordioides	132		multiseta 316
_		135	_	nuda 314
	sordidum	132	_	nudiflora 314
		134	_	occulta 313
_	triangulatum.	132	_	ocymoides 312
		133		perforata 316
	tubiflorum	133	_	pilulifera 316

Pag	s. Pags
Euphorbia prostrata 310	Exostemma caribæum 114
 pulcherrima 316 	mexicaua 114
- radians 316	Eysenhardtiaamorphoides 50
 retroscabra 316 	
- scabrella 316	Fallugia paradoxa 80
' ssrpens 316	
- serpyllifolia 317	
- serrula 317	1
 sphærorrhiza 317 	
- stictoepora 317	
 subpsltata 317 	
 subreniformis., 317 	-
- tenella 316	
torrida 317	- fascicularis 409
 trichogoua 316 	- grandiflora 414
- villifera 317	
Euphorbie.e	
EUPHORBIACEÆ 312	— mexicana
Euphrasie.e	- multiculmis 414
Euphrosine parthenifolia 151	- obtusiflora 408
Euphytolacceæ 303	- pendulina 414
EUPOLYGONEÆ	— scabra 415
Eustachys submutica 402	- tolucensis 413 y 414
Eustoma silsnifolia 227	Festuceæ 407
Eutetrae palmeri 176	FICOIDEÆ101
Eutoca andrienxii	Ficue bonplandiana 325
— техісана 232	- fasciculata 325
- pimpinelloides 232	- guadalajaraua 325
Entriana bromoides 403	— jaliscana 325
 curtipendula 405 	- obtusifolia 325
- repens 403	- petiolaris 326
- triæna 405	— pringlsi 326
Euvaccineæ	- tecolutensis 326
Evolvulus aleinoides 244	Fimbristylis autumnalis 371
— linifolins 244	- capillacea 371
- linoides 244	— capillaris 371
 microphyllus 244 	- crassipes 372
- pilosissimus 244	- laxa 372
proetratus 244	FLACOURTIEE 13
Exadenns parviflorus 229	Flaveria angustifolia 179
Exogonium bracteatum 240	- longifolia 179
— olivæ 240	— repanda 179
- spicatum 240	Fleischmannia schaffneri 128

Pags	Pags.
Flor de arete	Fuirena simplex 372
— de borla	FUMARIACEÆ 6
— de estrella	Fumaria parviflora 6
— de gloria 246	Furcraa tubiflora
— de hielo 228	Gaillardia mexicana 185
— de hueso 349	— piunatifida 185
— de la campana 232	— pulchella 185
— de la manita 27	Galactia brevistyla 64
— del camarón 68	— filiformis 64
— del muerto, 181	— hispidula 64
de nabo 8 y 9	— multiflora 64
— de Noche Buena 316	— pilosa 64
— de pericón	? purpurea 63
44 0. Oujetano	- tenuiflora 64
— de S. Juan 115 y 215	Galardia bicolor
Florestina pedata 178	Galeana hastata 179
Flourensia ceruna	Galege.e
Foragions phelipseide	GALIEÆ118
Forestiera phyllyreoides 212 racemosa 212	Galinsoga balbisioides 174
- racemosa 212 - tomentosa 212	- parviflora 173
Elma analis	- trilobata
ragaria mexicana 80 - vesca 80	Galium aschenbornii 118 — microphyllum 119
Franseria tenuifolia 151	 microphyllum 119 uncinulatum 119
Fraxine	- uropetalum 119
Fraxinus cuspidata 212	Gallinitas
greggii 212	Gallitos
- schiedeana 212	Galphimia angustifolia 32
	— glandulosa 32
Fremontieæ	- glanca 32
Frijol del monte	- gracilis 32
— de ratón	- hirsuta 32
Fritillaria barbata 357	- humboldtiana. 32
 ригригеа	- multicaulis 32
Frælichia interrupta 299	- sessilifolia 32
Fucaldea? tomentosa 122	GARDENIEÆ
Fuchsia arborescens 92	Gardoquia betonicoides 292
— fulgens 92	Garrya laurifolia 110
- microphylla 92	— macrophylla 110
- parviflora 92	- ovata 110
— pringlei 92	Gaudichaudia acuminata 33
Fuirena obtusiflora 372	- cynanchoi-
schiedeana 372	des 33

P	ágs.	Págs	3
Gaudichaudia filipendula.	34	GESNERACE.E 267	7
- mncronata	34	Gesnera deppeana 268	3
Gaudichaudieæ	33	- elongata 268	8
Gaultheria ciliata	205	- lasiantha 268	3
	206	GESNERE.E 267	7
- hirsuta	206	Gilia floccosa 230	0
- hirtiflora	206	- glomeriflora 230	J
Gaura coccinea	93	- inciea 230)
- epilobioides	93	- longiflora 230	
- odorata	93	— polycladon 230)
- suffrutescens	93	- pringlei 230	
Gaya suhtriloha	22	Gilibertia arborea 109	
Geissolepie euædæfolia	200	Girandra chironioides 226	
Geniostemon schaffneri	227	Girasol 160	
Genistea	47	- amarillo 170	
Gentiana acuta	228	Gladiolue psitacinus? 346	
— adsurgens	228	Gloxinia funbriata 268	
— amarella	228	- glabrata 267	
angustifolia:	228	Glycine caribæa66	
- calyculata	228	- discolor 63	
- lanceolata	228	- eliptica 63	
— spathacea	228	— lamarckii66	
wislizeni		Glyphosperma palmeri 355	
8	229	Gnaphalium arizonicum 145	
	226	hourgovii 145	
	169	eoncinnum 146	
det gine cer cum com in the contract of	168	gracile 146	
Cocomicus	168	AL CLASS DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR	,
•	168	_ lavandula-	
	169	ceum 146	
	169	- leptophyllum. 146	,
GERANIACEÆ	35	- leucocepha-	
Geranieæ	35	lum 146	
Geranium mexicanum	35	- oxyphyllum 146	,
- schiedeanum	35	- popocatepe-	5
	262	CILIT CLEAN TO THE	
	262	pringlei 146	
- punctata		- rhodanthum 146 - roseum 146	
0	262	- roseum 140 - schraderi 147	
Gerardie		- schraderi 147	
Gerbera untans		caule 147	7
— secmanni		sphacelatum . 147	
Gerontogea microtheca	114	- spnaceratum. 147	

	Págs.	Págs.
Gnaphalium spicatum	147	Grama 383
- wrightii		GRAMINEÆ
GNETACEÆ	416	Granada cimarrona
Gobernadora de México		Granadillo90
de Puebla		Granado 90
Gochnatia hypoleuca	196	Graphephorum altijugum. 413
Goliomena heterophyllum.	200	- ? pringlei., 413
Gomphocarpus viridiflorus	216	Gratiola mexicana 260
Gomphrena decumbens	298	Gratioleæ
— globosa	299	Greggia camporum 8
- interrupta	299	Grewieæ
— latifolia	300	Grindelia? coronopifolia 137
- nitida	299	— inuloides 138
- prostrata	299	 squarrosa 138
GOMPHRENE.E	298	Guaco 133
Góngora	303	Guaje 74
GONOLOBEÆ	220	Gualda 10
Gonolobus atratus	220	Guallabillo
 chihuahuensis. 		Guardiola atriplicifolia 148
- congestus	220	— rotundifolia 149
- diadematus	220	- tulocarpus 149
- erianthus	220	Guau 43 y 46
** a boi mus	220	Guazuma ulmifolia 28
granulatus	221	Gilereña 188
- jaliscensis	221	Guettardeæ 116
nemorosus		Guilleminea densa 298
- niger	221	— illecebroides 298
— nigrescens — nummularius	221	- illecebrum 298
mummularius	221	Güizapol de borrego 29
- pilosus	221	Gusanillo
- prostratus	221	Gntierrezia alamani
reticulatus schaffneri	221	- berlandieri 138
- sororius	221	- euthamiæ 138
Gonzalea glabra	222	Gymnacanthus geminiflorus 273
Gordolobo	115	Gymnolomia canescens 156
Gossypianthus rigidiflorus	140	- decumbens 156
Gothofreda cordifolia	298	- ghiesbreghtii 156
Gouania domingensis		— multiflora 156
— glabra	43	— patens 156
GOUANIEÆ	43	— rudis 156
Govenia brevilabris	43	- squarrosa 156
elliptica	338	- triloba 157
- elliptica	338	Gymnopsis uniserialis 157

	F	Pags		Págs.
Gymnosperm	a corvmbo-		HARPULLIE.	æ
J 1	sum	137		legans 92
_	eriocar-			m macrophyllum 131
	pum	137		glomerata 342
_	multifio-			pedicellata 342
	rum	137		pringlei 342
GYMNOSPERME	Æ 4	416	Hecubæ	a scorzoneræfolia. 176
Gymnothrix bamb	husiformis	388	Hedecandi	ra maritima 320
— dista	chya 3	389	Hedeom	a drummondii 284
– grise	bachiana	388	_	palmeri 284
- mexi	cana	388	_	piperita 284
	achya			tenella 284
Gynamblosis mar	itima	320.	_	thymoides 284
Gynandropsis :	-	10	Hedera ar	borea 109
GYROCARPE.E		86	Hediondill	a
Gyrocarpus amer		86		走114
	uini	86	Hedyotis s	stenophylla
Habenaria bra				£ 58
	vifolia 3			m molliculum 61
	peata			licifolia 90
– cra	ssicornis (340		EÆ 176
	usa (-	Heleniur	n amphibolum 185
	ora 3		_	mexicanum 184
	uosa 3	}	_	ooclinium 185
	scana 3	- 1	_	quadridentatum 185
	ıglei 3		_	scorzoneræfolium 176
-	thacea 3	- 1	Holeocha	aris atropurpurea. 370
	rberi 3		_	cancellata 370
Habrantus concole		346	_	capitata 370
Habrothammus fa		253	_	geniculata 370
Halenia crassic		229		mutata 370
-	ornu 2		_	nodulosa 370
	lora 2	229		palustris? 370
		229	_	subcancellata 370
	ei 2		Helianth	ella mexicana 164
	cki 2	229	_	pringlei 164
HALORAGEÆ		85	Helianth	emum argenteum. 11
Hamelia patens			_	coulteri 11
Hamelie.e		115	_	glomera-
Haplopappus ra		138		tum 11
	p inolo sus 1		_	patens 11
	toloniferus. 1	139	_	polyfolium 11
Haplostylis mexic	ana 3	373		pringlei 11

		Págs.	P	ágs.
Helianthoid	EÆ	147	Hemicarpha drummondii	372
Helianthu	ıs annue	162	- subsquarroea	
_	buddleiæformis		Hemimeridea	
_	cernua		Henrimeris mutissii	
_	ciliarie	162	— parviflora	
	dentatus	161	Henrya costata	
_	excelsus		Hermannia inflata	27
_	gigantens		- texana	27
-	laciniatus	162	Hermannieæ	27
_	linearis		Herpestie auriculata	260
_	squarrosus	161	- callitrichoides	
	tubæformis	160	- rotundifolia	260
Helichrys	um orientale	147	Hesperaloe eugelmanni	352
Heliocar	ous americanue	29	Hesperanthes leptophylla	354
-	arborescene	29	Heteranthera acuta	359
	tomentosue	29	- alismoides	358
Heliogenes	longifolia	153	- limoea	358
Heliopsie	annua	153	- mexicana	359
_	buphthalmoides.	153	- pubescens	359
	canescens	153	· - reniforme	359
HELIOTROPH	E在	236	- reniformis	359
Heliotrop	oium americanum	236	Heterochlamys quiuquenervia	321
_	anguetifo-		Heteromeris mexicana	11
	$\operatorname{lium}_{\dots}$		Heteropogou acuminatus	
_	canescens		- contortus	
-	cinereum		— glaber	379
_	curaseavi-		- hirtus	379
	cum		- scrobiculatus	
_	filiforme	237	Heteropterys beecheyana.	33
_	inundatum		- gayana	
-	limbatum,		- portillana	
_	pringlei	237	- tomcutosa	
_	procumbens		Heterospermum piunatum.	. 168
Helmia ehr	enbergia	351	- tagetinum	
Helonias vi	irescens	357	Heterostega juncifolia	
Helopus ac	uminatus	385	Heterotheca inuloidee	
	acilis		- leptoglosa	
— <i>фи</i>	uctatus,	385	Hetorotoma arabidoides	
Helosciadii	um leptophyllum	105	- tenella	203
HELOSIDEÆ.		312	Heuchera longipetala	. 82
	iexicana		- mexicana	. 82
	B		Hexalectrie aphylla	. 336
Helleria lia	vida	414	Hibisceæ	. 25

	Págs.	Págs.
Hibiscus betulifolius	25	Houstonia longiflora 114
- betulinus		- polypremoides, 115
fasciculatus?		Houttuyna califoruica 307
- pedunculatus		Huamuchil 77
- phœniceus		Huinari
- rosa-sinensis		Huisache 77
- tiliaceus		Huisapole 388
- tubiflorus		Huitzitzilin
Hidalgoa lessingii		Huizapotillo
- ternata		Hule 326
Hieracium crepidispermum		Hunnemannia fumariæ-
- mexicanum		folia 6
 præmorsiforme 	199	HUNNEMANNIEÆ6
— pringlei	199	Hydrangeæ
Hierochloe mexicana	390	Нуркосотуреж
Hilaria cenchroides	381	Hydrocotyle bonariensis 101
Hinojo	106	_ ? grumosa 101
Hippeastrum concolor	346	mexicana 101
Hirwa acuminata	33	 verticillata 101
- macroptera	33	Hydrolea dichotoma 233
- mucrouata		- spinosa234
Нікжеж	33	Hydrole-E 234
Hoatzin	74	HYDROPHYLLACEÆ 232
Hoffmanseggia jamesii	68	Hymenatherum acerosum. 181
stricta	69	berlandie-
Hoitzia aristata	231	ri 181
— capitata	231	- gnapha-
cærulea	231	liopsis 182
— cervantesii		greggii 182
— coccinea	231	_ pentachæ-
conglomerata	231	tum 182
— elata	231	- polychæ-
glandulosa		tum 182
mexicana		— serratifo-
— nepetæfolia		lium 182
— spicata		tenuifo-
Hoja de ajan		lium 182
Hordeæ		- tenuilobum 182
Hosackia angustifolia	50	Hymenocallis dilleni 348
— mexicana	50	- galvestonensis 348
- puberula	50	- lacera 348
Houstonia angustifolia		- palludosa 348
— coccinea	113	- rotata 348
		Box 114

Págs	Pags.
Hymenopappus flavescens. 177	Inga laurina 77
pedatus 178	- peunatula 75
Hymenostephium mexica-	- ? speciosa 76
num 167	- vera 78
Hymenothecium quiuquesetum 381	Inge,u 76
— tenellum 382	INULOIDEÆ
— trisetum 381	Ionidium polygalæfolium . 12
— unisetum, 382	Iostephane heterophylla 158
Hymenothrix palmeri 178	- trilobata 159
Hymenoxis chrysanthemoi-	Ipomwa armata 240
des 186	- bracteata 240
- odorata 185	— capillacea 240
HYOSCYAME.E 252	- coccinea 241
Hyoscyamus albus 252	— dubia 241
Hyperice-E	- hastigera 241
HYPERYCINEÆ 19	- hederifolia 241
Hypericum denticulatum 19	- heterophylla 241
 pauciflorum 19 	humboldtiana 241
schaffneri 19	- intropilosa 241
Hypoxideæ316	- læta
Hypoxis decumbens 346	- leptotoma 241
- mexicana	- longepedunculata 241
Hyptis albida 282	- longicuspis? 242
- aspera 282	- llaveana 242
- emoryi 282	- macrantha 242
- macrocephala 282	- madrensis 242
- polystachya 282	- muricata 240
- spicata 282	- murucoides 242
- stellulata 282	- pedatisecta 242
- suaveolens 283	- perlonga 242
- tomentosa 283	pringlei 242
- urticoides 283	- sauguinea 241
 verticillata 283 	- schaffneri 242
Ichnanthus pallens 387	— sidæfolia 243
ILLECEBRACEÆ	— spicata 240
Itlecebrum densum 298	- stans 243
Ilysanthes gratioloides 260	— suffulta 243
Indigofera densiflora 55	- versicolor 243
- excelsa 55	— wildenowii 241
 leptosepala 55 	Iresine canescens 299
 lindheimeri, 55 	- celosioides 299 y 300
- palmeri 55	— diffusa 300
Inga anomala 76	— eriophylla 300

Págs.	Págs.
Iresine floribunda	Janacahuate 56
- gossipina? 300	Jaramago 9
- gracilis? 300	Jarava ichu 391
- interrupta 300	Jarilla 173, 190 y 192
- latifolia 300	Jarritos 201
- laxa 300	Jatropha multifida 319
— polymorpha299	_ spatulata 319
- pringloi 300	JASMINEÆ
- schaffneri 300	Jaumea peduncularis 176
1R1DE.E 343	Jazmin
Isachne disperma 385	Jiricua 208
Isnardia palustris 91	Jolocin
Isolepis asperula 371	Jonote
— bufonia 371	JUGLANDEÆ329
— capillaris 371	Juglans mexicana 329
— cæspitula 373	- olivæformis 329
subsquarrosa	Julocroton argenteus 321
Isoloma deppeanum 268	— quinquenervius 321
- jaliscanum 269	JUNCACEÆ 361
Ítamo real 96	Juncagineæ
Iva ambrosiæfolia 151	Juneus acuminatus 361
Ixcuinpatli	— balticus 361
Ixie.e	— bufonius 361
Ixora americana 113	- canaliculatus 362
- ternifolia 113	— debilis 361
Ixoreæ	- marginatus 362
Ixophorus unisetus 388	 microcephalus 362
Ixquahuite 59	- nodosus 362
1xtauhyat1	- radicans 361
Jabonera 209 y 303	- teuuis 362
Jacobinia aurea 274	— xiphioides 362
- incana 275	Jungia altissima 289
— mohiutli 275	JUNIPERINEAL 419
stellata 275	Juniperus deppeana 419
Jacquemontia smithii 244	_ gigantea 419
Jacquinia ruscifolia 210	— flaccida 419
Jægeria calva 154	— fætida 419
⊢ hirta 154	- mexicana 419
- macrocephala 154	 occidentalis 419
— pedunculata 154	— tetragona 419
Jaliscoa pringlei 133	Jussiwa erecta 91
Jalocote 417	- hirsuta 90
Jaltomate 249 y 250	- repens 90

Pilgs	Pags.
Jussiæa suffruticosa 91	Lamourouxia exserta 265
— villosα	- laciniata 265
Justicia coccinea 275	macrantha. 265
 pringlei 274 	- microphylla 265
 quadrifida 275 	— multifida 265
reflexiflora 274	- ovata 265
 virgularis 275 	- parvifolia 265
JUSTICIEÆ 273	- pringlei 265
Kallstræmia grandiflora 34	- rhinanthifo -
Keerlia mexicana 140	lia 266
— linearifolia 137	- viscosa 266
Keithia marifolia 284	Lantana aculeata 276
Kerneria helianthoides 171	- bracteosa 277
Kleiuia colorata 179	- camara 276
- tagetoides 180	- hirsuta 276
- viridiflora 180	- horrida 276
Kælera avenacea 408	- lippioides 277
Kosteletzkia digitata 25	- macropoda 276
Kowalewskia integerrima 207	- origanoides 277
 serrulata 207 	- polyacantha276
Krameria cytisoides 15	— scabrida 276
Krombholzia latifolia 412	Lappago aliena 382
Krynitzkia floribunda 238	— racemosa 382
— linifolia	Larrea mexicana 31
Kuhnia eupatorioides 136	Lasiostega humilis 406
- rosmarinifolia 136	Lathyrus parvifolius 62
Kyllinga cæspitosa 369	Laurentia michoacana 203
— punila	- ovatifolia 201
LABIATÆ 282	LAURINEÆ 309
Lachnostoma prostratum 221	Lechea major? 11
Lactuca intybacea 199	- mexicana
Lælia furfuracea 337	- skinneri 11
Lænnecia gnaphalioides 143	Leersia hexandra 389
Lagascea angustifolia 147	- mexicana 389
- helianthifolia 147	LEGUMINOSÆ 47
 heteroppapus 147 	Leianthus cuspidatus 226
— latifolia 147	- lanceolatus 228
- rubra 147	- nigrescens 226
- suaveolens 147	Leiboldia ovata 121
Lágrimas de S. Pedro 377	Leighia linearis
Lambrisco	LEMNACEÆ
Lamourouxia betonicæfolia 265	Lemna gibba
- cordata 266	— polyrhiza 364
	F-23-22-21

Pá	gs. Pags.
Lengua de vaca 30	5 Leucopsidium humile 140
LENNOACEÆ 20	
Lennoa madreporoides 20	
Lentejilla 9 y 36	
LENTIBULARIEÆ 26	7
Lepechinia procumbeus, 28	
- spicata 28	
Lepidine.e	8 Lilæa subulata 365
Lepidium alyssoides	9 LILIACEÆ
- lasiocarpum	9 Limnanthemum humbold-
	9 tianum. 229
	9 Limnochloa geniculata, 370
— sordidum	9 — mutata, 370
virginicum	9 Limoncillo
Lepidococca sieberi 32	1 Limosella aquatica 260
Leptanthus ovalis 35	
- reniformis 35	
Leptocallis quinata 24	0 Linda tarde 93
Leptochloa dubia 406 y 40	8 Lindleya mespiloides 79
- fascicularis 40	
 filiformis 40 	
 7 mexicana 40 	
- mucronata 40	6 Linum mexicanum 30
— pellucidula 40	6 - neo-mexicanum 30
 polystachya 40 	9 — orizabæ 30
Leptoglossis texana 25	
Leptophragma prostrata 25	4 - rupestre 30
Leptosyne mexicana 16	s — scabrellum 30
— pinnata 16	s - schiedeanum 31
 priuglei 16 	8 Liparis galeottiana? 335
Leria nutans 19.	
Lesourdia karwinskiana 40	
— multiflora 40	
Leucæna diversifolia 7	
eeculenta 7	
 macrophylla 7. 	
 pulverulenta 7- 	
Leucanthea ræmeriana 25	
Leucocarpus alatus 259	
— perfoliatus 259	
Leucophylleæ 258	5 — lycioides 277
Leucophyllum minus 255	
— texanum 255	5 — myriocephala 278
	Вот.—115.

	I	Págs.	Págs	
Lippia	nutans	278	Lobelia xalapensis 201	
_	oaxacana		LOBELIACE.E	
_	panamensis		LOBELIEÆ	
_	purpurea	278	Læselia aristata231	
_	queretanensis	277	— cærulea 236	
	umbellata	278	— cervantesii 231	
Lisian	thus cuspidatus	226	- ciliata 231	
_	nigrescens	226	- coccinea 231	i
Lithos	spermum arvense	239	- conglomerata 231	
	- calcicola	239	- glandulosa 231	
	 distichum 	239	- nepetæfolia 231	
	- spathula-		LOGANIACEÆ223	3
	tum	239	Lonicera pilosa112	2
	strictum	240	- tubulosa	
LITSEAG	EÆ	310	LONICEREÆ111	
Litsea	parvifolia	310	Lopezia angustifolia 93	
LOASE	EÆ	1.9	- coronata9	
Lobelia	angulato-dentata	202	- mexicana 93	
_	angustifolia	201	- pubescens 93	
_	arabidoides	203	- pumila9	
-	berlandieri	201	- racemosa 99	
	cavanillesii	201	- trichota 93	
_	cliffortiana	201	Lophospermum erubescens 250	
_	cordifolia	203	LORANTHACEÆ 310	0
-	ienestralis	202	Loranthus augustifolius 31	1
_	formosa	202	- crassipes 310	
_	fulgens	202	- microphyllus 310	
_	hartwegii	202	- palmeri 310	
	ignea	202	- spirostylis 310)
_	lanceolata	202	- viscifolius 31	
_	laxiflora	202	Lorentea atropurpurea 15	
_	novella	203	LOTEÆ 50	
	ovalifolia	202	Loureira cuneifolia 319	9
_	parviflora	202	Ludwigia palustris 9	
_	pectinata	202	Lupinus bilineatus 4	8
_	persicæfolia	201	- ehrenbergii 4	8
	picta	203	- elcgans 4	8
-	rigidula	202	– glabellus 4	
_	spicata	202	— mexicanus 4	
_	splendens	202	- montanus 4	
	stricta	202	Luziola mexicana 38	
_	texensis		— peruviana 38	
_		202	Luzula harbata 36	

Pags	Págs.
Luzula caricina 362	Malva carolineana 24
- interrupta 363	- lactea 20
- racemosa 362	— фегичіана 20
- spicata 363	- spicata 20
— vulcanica	- vitifolia 20
Lychuis pulchra	MALVACEÆ 20
Lycium brachyantum 251	Malvastrum coccineum 20
- carolinianum 251	— leprosum 20
- pallidum 251	— peruvianum 20
- torreyi 251	- roseum 20
Lycurus brevifolius 396	— schaffneri 20
 phleoides 396 	— spicatum 20
Lysiloma acapulcensis 76	— vitifolium 20
 microphylla 76 	Malvaviscus acerifolius 25
Lysimachie.e	— arboreus 25
LYTHRARIEÆ 87	— drummondii 25
LYTHREÆ 87	Malveæ 20
Lythrum album 89	Mamillaria acauthophleg-
- gracile 89	ma 100
 keunedianum 89 	geminispina 100
- maritimum 89	_ recta 100
Machæranthera setigera 141	Mauihot pringlei 321
Macpaexochitl	Mano de León
Macromeria discolor 239	Manzanilla
— exserta 239	del país
Macrosiphouia berlandieri. 215	Margaranthus solauaceus. 250
- brachysi-	tenuis 250
phon 215	Margaris barbigera 111
— hypoleuca., 215	Marica palndosa 344
Madroño 204 y 299	Mariscus karvinskianus 368
— borracho 205	— lougiradiatus 367
Mahonia fascicularis 5	_ mexicanus 368
Maiz de Tejas 162	_ mutisii
— primitivo 376	oaxacensis 368
Majagua 26	— patulus 367
Mala muger 46 y 248	Marmota 15
Malaxis majautheurifolia 335	Marrubium hamatum 293
Mallinoa corymbosa 200	vulgare 293
Mal ojo 152 y 310	Marsdenia coulteri 222
MALPIGHIACEÆ31	 maculata 222
Malpighia glabra 31	— zimapanica 222
Malpighieze 31	Marsdenie #
Malva angustifolia 23	Martynia fragrans 271

	Págs.	Pág	5.
Martynia violacea	271	Melanthera deltoidea 1	63
Martynieæ		- hastata I	62
Mastuerzo	35		86
Mataburros	358		86
Matamoria spicata	123		40
Matarique		Melica laxiflora4	12
Matizadilla	276		12
Matricaria chamomilla	186		49
Maurandia antirrhiniflora	256		23
barclayana	256		27
erubescene	256		27
- personata	256		27
- scandens	256		27
 eemperflorene 	256	Membrillo	82
Maxillaria cucullata	338	— eimarrón	82
obecura	338	Mendezia bicolor 10	67
Maydeæ	376	MENISPERMACEÆ	4
Mayitos		Menodora coulteri 2:	11
Mazimowiczia lindheimeri.	97	 helianthemoides 2: 	11
Mazorquilla	303	- scoparia 2	12
Medicago denticulata			83
Megastachya hypnoides	411	- rotundifolia 2	83
— oxylepis			94
reptans	411		94
Melampodium bibractea-			94
tum	149		94
coronopifo-		- stipitata	94
lium			95
 divaricatum 			29
- glabrum			29
hiepidum			93
longipilum .			88
microcepha		Metaetelma anguetifolium. 2	19
lum			19
montanum.			19
oblongifo-			19
lium		- parviflorum 2	19
ovatifolium		 ecblechten- 	
paludosum		dalie 2	
 perfoliatum 		Meyenia fasciculata 2	53
- sericeum			72
— tenellum			86
— ? ternatum	169	Microchloa eetacea 4	02

Pags.	Pags.
Micromeria brownei 284	Minkerlesia biflora 65
Micropetalon lanuginosum 16	Mirabilie.e
Micropleura reuifolia 101	Mirabilis aggregata 295
Microsperma lobata 94	Mirasol
- rudis 95	Mirasolia scaberrima 158
Microstylis corymbosa 335	MIRTACE/E86
- crispifolia 335	MIRTER
 fastigiata 335 	Mirto 287
- montana 335	Mixpatli
myurus 335	Mixtlacotl
- tenuis 335	Mocinna serrata
Mikania denticulata 133	Moco de guajolote 304
— gonoclada 133	Modiola caroliniana 24
— houstonis 133	— multifida 24
Milefolio 186	Mæhringia nemorosa 16
Mil en ruma 186	Mohintli 275
Milium mexicanum, 392	Mollugine.e
Milla biflora 355	Mollngo verticillata 101
Milleria augustifolia 179	Monacillo
— biflora 148	— del río 26
- dichotoma 148	Monarde.e 285
- glandulosa 148	MONIMIACEÆ 309
- quinqueflora 148	Monniua wrightii 15
Mimosa acanthocarpa 72	- xalapensis 15
- berlandieri 72	Monopogon avenaccus 401
— biuncifera 72	Monosis foliosa 121
- distachya 72	- salicifolia 122
— dulcis77	— ? tomentosa
fagifolia 78	Monotropa coccinea 207
- fasciculata 73	- hypopithys 208
— floribunda 73	- uniflora 207
- leucænoides 73	MONOTROPEÆ 207
— malacophylla 73	Montanoa arborescens 157
- monancistra 73	atriplicifolia 157
— plana 75	- floribunda 157
- portoricensis 77	- frutescens 157
- prolifica 73	graudiflora 157
- racemosa 73	— heterophylla 157
— tequilana 73	- patens 157
— zygophilla 73	- tomentosa 157
Mimulus glabratus 259	Moradilla 189
perfoliatus 259	Moræa acorifolia 345
Mina lobata 243	- chimboracensis 345

Pág	s. Pags.
Moræa foliosa	
Моглел	- scabra 393
MOREÆ 32	gehaffneni 205
Morenoa globosa 242	setosa 393
- grandiflora 249	spiciformie 395
Mortonia greggii 4:	
Moschoxylon cuneatum 46	- Bupolues 395
- veraguense 40	
Mostacilla	
Motita morada 200	MITCAODT
Moussonia deppeana 268	Margarian air ann 1-4-
Mozinna spathulata 210	scabrella 108
Mucuna urens	
muehlenbergia arizonica 399	Musenium alninum tot
articulata 392	Muss grape g
bourgæi 399	Mustalia substania 105
brevifolia 392	Mutinois calabase
 breviseta 393 	Murretter
 buckleyana 399 	Myriocarpa brachystachys 328
- calama-	- longipes 328
grostidea 399	Navachamini hamaina co
- ciliata 393	Myroxylon pereiræ 68
- clomena 393	Muyulio andina
— debilis 393	MYRSINEÆ
- disticho-	Nabo cimarrón
phylla 393	Nagelia denticulata 82
- dumosa 39	
- elongata 394	NAIADACEÆ 265
- exilis 39.	Nama dichotomum 233
 flavida 39. 	— echioides
gracilis 39.	- hirsutum 233
 grandis 39. 	- hiepidum 233
 implicata 39. 	- longiflorum 234
— lemmonii 39.	origanifolium 233
- longiseta 399	- palmeri
 microsperma, 393 	- sericeum
 monticola, 394 	
 mucronata 395 	
 nebulosa 393 	
- pringlei 39	
- pulcherri-	- tanacetifolium 7
ma 395	
— pusilla 393	

Pag	s. Pags.
Nectouxia bella 251	NYCTAGINEÆ295
- formosa 251	NYMPHÆACEÆ 5
Negritos 66	_
Negundo aceroides 45	
Nelsonie.e	
Nemacladus oppositifolius 203	
Nemastylis brunnea 344	
— cælestina 345	
— flava 344	
 multiflora 34- 	
- nana 345	o cerome contract
— tenuis 343	Ocimum carnosum 282
Neogœzia gracilipes 109	
- minor 109	
Neonelsonia ovata 109	
Neottia aurantiaca 339	
— cinnabarina 339	maculatum 338
NEOTTIE-E 338	_ membrana-
Nepetele 291	сент 338
Nertera depressa 116	Odontotricum cirsiifolium 188
Nerteria depressa	
Nesæa salicifolia 96	Enothera cuprea 91
Nicandra physaloides 251	- dissecta 91
Nicotiana parviflora 25-	- rosea 91
- repanda 253	
— rustica 253	
Nierembergia angustifolia 25	
- anomala 25	
— staticæfolia 254	
Nigua 87	
Nissolia confertiflora 58	Oldenlandia angustifolia 114
- fruticosa 58	
— multiflora 58	
— schottii 58	
— wislizeni 58	
Nocca lalifolia14	
Nolina humilis 353	
Nothites ovatifolia 12	
Nothoscordum striatum 353	Caracter Control Contr
Nueve hojas 4-	Omphalodes mexicana 237
Nuez encarcelada 329	ONAGRARIEÆ 90
meca 329	Oncostylis arenaria 372
Nurite 284	- ciliata 372

F	ags.	P	ágs.
Oncostylis dubia:	372	Oxybaphus angustifolius	295
- temuifolia 371 y			
- truncata	372	Oxylobus glanduliferus	
Ouosma strigosa		Oxypetalun riparium	
- trinervia	239	Oyamel	
Onosmodium strigosum		Oyametl	
Ophrydeæ	340	Oyedæa ovatifolia	
	124	_ `	
Ophthalmacanthus speciosus	273	Pajaritos	35
Opizia stolonifera	406		178
Oplismenus crus-galli	387	- texana	178
— crus-pavonis 3	387	Palancapatli 176 y	193
- liebmanni	387	- de Puebla	138
Oplotheca interrupta	299	Palma apachi	363
Opuntieæ	001		363
ORCHIDEÆ	335		201
Orégano de la sierra	284	Palmira	243
 de monte 	136		320
Oreinotinns microphyllus 1	111	Palo amarillo	5
Oreja de ratón	245	- ceniso	165
Oreodapne benthamiana	309	- de bálsamo	68
Oreomyrrhis andina	106	- del muerto	32
Ornithogalum bivalve	355	- dulce	50
OROBANCHACEÆ	266	- guaco	133
ORTHOSPERMEÆ	97	- hediondo	86
Orthrosanthus chimbora-	- 4	- loco	192
censis	345	Palomillas	35
Ortiga 234 y 3	327	Palomitas 6 y	269
	389	Pambotano	76
— mexicana 3	389	Panaceæ	109
ORYZEÆ	389	Paucratium disciforme	348
Oryzopsis fimbriata	392	- mexicamm	348
Osmorrhiza mexicana 1	106	- rotatum	348
Oteiza acuminata	173	Paniceæ	383
Otopappus acuminatus	166	Pauicum brevifolium	385
 alternifolius 1 	166	→ brizoides	386
Ottoa œnanthoides	106	cæspitosum	386
Oxalideæ	36	crus-galli	387
Oxalis berlandieri	36	crus-pavonis	
decaphylla	36	- distans	386
— divergens	36	- divaricatum	
hernandezii	36	 dischassaingii 	386
Oxybaphus aggregatus	295	- filiforme	

Pags,	Págs.
Panieum hemignostum 387	Paspalum distichum 383
- imberbis 387	— elegans 385
- leandri 386	— filiforme 383
 lencophæum 386 	— gracile 383
- obtusum 386	- humboldtianum. 384
- pallens 387	— lentiginosum 384
- paspalodes 386	— littorale 383
- plantagineum 386	- notatum 384
purpurascens 388	— pittieri 384
- rhizophorum 387	- planifolium 384
- saccharoides 386	plicatulum 384
— schiederi 412	- pyramidale 385
- sulcatum 387	— renggeri 383
- trichoides	- tenellum" 385
unisetum 388	- undulatum 384
Pañete 208	— vaginatum 383
Paño de Holanda 316	— virgatum 384
Papa	Passiflora bryonioides 95
Papaloquelite	= exndans 95
Papaloquilit1	— fœtida 96
PAPAVERACEÆ 5	inamœna 96
Papilionaceae	- liebmannii 96
Pappophorum laguroideum 407	— mexicana 96
- wrightii 407	— tuberosa 96
Parathesis cronulata 210	PASSIFLORACEÆ 95
Parietaria floridaua 328	Passifloreæ95
— linguæfolia 329	Pastora
- microphylla 328	Patacite
- orizabæ 329	Pata de León (R. hooteri) 3
 pennsylvanica 329 	Pata de León (R. petiolaris) 3
Parkinsonia aculeata 69	Pata de León
Parouychia mexicaua 297	Patata 248
 wilkinsoni 297 	Patol
Paronychife	Paullinie.e
Parthenium incanum 150	Pavonia lasiopetala 21
— lyratum 150	_ melanommata 24
- ramosissimum 150	_ rosea
- tomentosum 150	Pectidopsis augustifolia 184
Pasionaria silvestre 96	Pectis angustifolia 184
Paspalum affine 385	— diffussa
— antillense 384	- fastigiata
— ciliatum 384	— filipes 184
— conjugatum 383	– jaliscana 184

Pag	Págs-
Pectis prostrata 18	Peperomia blanda 308
- sessiliflora	- edulis 308
- tenella	_ iglicaana 200
PEDALINEÆ	- magnalimfalia 200
Pedicularis mexicana 266	— mülleri 308
— orizabæ 260	- reflexa 308
- tripinnata 966	umbiliante 200
Pedilanthus pringlei 315	Peraltea lupinoides 56
— tomentellus 319	osubhalla 56
Pedilea	Perdicium cordatum 196
Pegajosa	
Peinecillo	14- 1
Peiston	- dugesii 196
PELARGONIEÆ.	111 - 1 - 10/
Pennisetum bambusiforme 389	michoacana 196
- crinitum 388	nana
- distachyum 389	
— mexicanum 388	a oxylenis 196
- multiflorum 389	_ parryi 197
- purpurascens 380	nlatvnhvlla 197
— setosum 388	reticulata 197
tristachvum 200	micrido 107
Tentstemon angustifolius 257	_ schaffneri 197
- atropurpureus 257	thyracides 197
- baccharifolius 256	_ vernonioides 197
- barbatus 257	— wislizeni 197
 campanulatus 257 	Perieilema ciliatum 396
- coccineus 257	
- connatus 258	Peritre 142 y 167
- cordatus 258	Perlitas 111
- elegans 257	Permanente 299
- humboldtii 258	Pernettya ciliaris 205
- imberbis 257	— pilosa 206
- kuntii 257	Perseæ
— perfoliatus 258	
— pulchellus 257	
— pumilus 258	
— roseus 257	- discolor 162
 rotundifolius 258 	- mendezii 162
 stenophyllus 258 	 parvifolium 162
— tenuifolius 258	- tenellum 162
- verticillatus 258	Perytile jaliscana 176
Peonía 66	- microcephala 176

Pags.	Págs.
Peshto 130 y 136	Phaeeolue truxillensis 65
Petasostylis nigresceus 226	Phenax galeottianus 328
Peteria scoparia 56	- gandichandianns 328
Petræa arborea 280	- mexicanue 328
- crecta 280	Pherotrichis balbisii 222
- mexicana 280	— leptogenia 222
- ovata 280	Philactis longipes 151
— volubilis 281	Philibertia crassifolia 215
Petunia parviflora 254	 cynanchoides. 215
Peucedane 107	- elegans 216
Peucedanum tolucense 107	- linearis 216
Phaca candolliana 58	— pavoni 216
- clongata 58	Phlox piunata
— mollis 57	Phoradendron angustifo-
— triflora 58	lium 311
Phacelia cærulea 232	- bolleanum, 311
- circinata 232	- rubrum 311
- congeeta 232	- tomento-
— pimpinelloidee 232	sum 311
Phacelie #	Phyllactis prateusie 119
Phabe hartwegii 309	PHYLLANTHEÆ 318
Phædruutus buccinatorium 269	Phyllanthue acuminatus 318
- cinerasceus 269	- galeottianus. 318
- exsertns 269	- lycioides 318
- lindleyanns 269	— nincronatus 318
Phanixopus intybaceus 199	- ruscoides 318
Phalarideae	. — tequileusis 318
Phania arbutifolia 124	Physalis angulata 249
Pharbitis cuspidata 242	- fœtene
- heterophylla 241	- fætidissima 249
 longepedniculata 241 	- glutinosa 249
- speciosa 242	- leptophylla 249
Pharium fistnlosum 355	— linkiana 249
Phaseoleæ	- microphysa 249
Phaeeolus acutifolius 65	— mollis 249
adenantlins 65	Physodium dubium 27
- amæms 65	PHYTOLACCACEÆ 302
- anisotrichue 65	Phytolacca decandra 303
— cirrhosus 65	- longispica 303
- heterophyllue 65	- octandra 303
- multiflorue 65	— rugosa 303
- parviflorus 65	Pica-pica
- retusus 65	Picca glancescens 418

Pags	Pags
Picea hirtella 418	Pinns hirtella 418
- religiosa 418	- horizontalis 417
Picosa 319	— hugelii 417
Picramnia filipetala 38	- huisquilneanensis 416
Picramnieæ	- interposita 417
Picridium vulgare 199	— jalocote 417
Pilea glabra 327	— keteleerii
- mexicana 327	- leiophylla 416
- microphylla 327	— leroyi
- muscosa 328	- llaveana 416
Pimpinella mexicana 106	— magnifica
Pinaropappus roseus 200	- michoacanensis 417
Pingüica 205	- microcarpa 417
Pingnicula bakeriana 267	— milleriana
- caudata 267	— monstrosa 417
- flosmnlionis 267	- monteallegri 416
- heterophylla 267	- montezumæ 417
- macrophylla 267	- nesselrodiana 417
- moranensis 267	— nitida 417
- oblongiloba 267	- northumberlandiana 417
- orchidioides 267	- ocampii
- parvifolia 267	- occidentalis 417
Pinns angulata 417	- ocote
- aztecaensis 417	- oocarpa
— besseriana 417	- ortgiesiana 417
— boothiana 417	— ostcosperma 416
- boncheana	- pawlikonskiana 417
— bnllata 417	— paxtoni 417
— cedrns	- pseudostrobus 417
00mb101d68 416	- religiosa
— coarctata 417	— rinzii 417
— comonfortii 416	— , rubescens 417
— cornea 417	— rumeliana 417
— decandolleana 416	- russelliana
- dependens 416	— sanrafaeliana 417
— devoniana 417	— sonlangeana 417
— dolleriana 417	— spinosα
- elegans 417	— tenangensis 417
- fertilis 416	- teocote 417
— gracilis 416	— thelemanni
— grandis 417	— thibaudiana 417
- haageana 417	- tomacocaensis 417
- hendersonii 417	- tronvezkojana 417

	Pags.	Págs.
Pinns valida	417	Pitillo 227
- van-geertii		Pitos 63
- van-houttei	417	Plagiosperme. 2
- verrucosa	416	Planta de la abeja
— verschaffeltii	417	PLANTAGINEÆ 294
- vilmorinii	417	Plantago caulescens 294
— zacatlanæ	417	- floccosa 294
— zitacuaria	417	— galeottiana 294
Piñoncillo	315	— hirtella 294
PIPERACEÆ		_ linearis 294
Piper aduncum	307	= mexicana 294
- auritum	307	patagonica 294
berlandieri	308	wirginica 294
- blandum		PLATANACE.£329
— jaliscanum	308	Platanillo
- leucophyllum	308	Platanus mexicana 329
— magnoliæfolium	308	Plato y taza
— reflexim	309	2 intypier to er central
- sanctnm	308	i teetopanti junet
Pipereæ	307	8.1107.111111111111111111111111111111111
Pipiloxóchitl15 y		- gloxiniflorum 268 Pluchea bifrons 145
Pipitzahuac	196 385	- camphorata 145
Piptatherum acuminatum Piptothrix palmeri	125	- floribinida 144
Piqueria laxiflora	123	Plumajillo
- pilosa		PLUMBAGEÆ
- pringlei	123	PLUMBAGINEÆ208
- serrata	123	Plumbago mexicana 208
- trinervia	124	— pulchella 208
Piscidia erythrina	67	. — rhomboidea 208
Pisonia hirsuta	296	- scandens 208
- hirtella	296	Plumeria gonani
- mexicana		- lambertiana 214
PISONIEÆ	296	- mexicana 214
Pistacia mexicana	45	Plumerieæ 213
Pitcairnia jaliscana	342	Pneumonanthe bicuspidata 228
Pitcairnieæ	342	Poa annua 413
Pithecoctenium buccinatorium	269	— capillaris 409
hexagonum	269	— ciliaris 409
Pithecolobium albicans	77	- conglomerata 413
— brevifolium	77	— eragrostis 411
- dulce	77	- hypnoides 411
schaffneri	77	- inflrma 413
		Bor118.

Pags.	Pags.
Poa megastachya 411	Polygala michoacana 14
- mexicana 410	- obscura 14
- oxylepis 410	- ovalifolia 14
- pectinacea 410	- ovatifolia 14
- reptans	- pringlei 14
- subunifiora	- puberula 14
Podosæmum ciliatum 393	- rivinæfolia 13
- debile 393	- scoparia 14
- distichophyllum 393	— sub-alata 15
— gracile 394	urightii 14
mucronatum 395	POLYGALE.E 13
- implicatum 394	POLYGONACE.E 303
serusum 393	Polygonatræ
stipoides 395	Polygonum acre 304
Pogonia moriane 396	— aviculare 304
Pogonia mexicana. 340 Poinciana pulcherrima. 68	 lapathifolium. 304
	— mexicanum 304
- hylchamia	- pennsylvaui-
- pulcherrima 316	c um 304
- radians	- persicaria 305
FOIR MISIS II wind - 1 1	 persicarioides. 305
	puuctatum 305
Polemonium mexicanum 230	Polymnia aspera 148
Polianthes gracilis 348	- maculata 148
- mexicana 349	uvedalia 148
- tuberosa are	Polypogon ciliatus
Poliomintha marifolia 284	— mexicanus 398
Pollichieæ297	Polypremum linnæi 223
Pollomate	- procumbens 223
Polyactidium delphinifolium 142	- schlechtendalii 223
L'OLYCARPEÆ	Роме <i>ж</i>
Polygala acicularis 17	Ponchishui
- americana 13	PONTEDERIACEÆ
aparinoides 13	Popote de cohete
berlandieri 14	Popotillo
- caracasana	Populus alba 334
- conferta	- fremontii 334
- glochidiata 14	Porophyllum coloratum 179
gracillima 14	- erbendbergii. 179
- greggii 14	- filifolium 180
- longicaulis 14	- macrocepha-
- mexicana 14	lum 180
	14111

P	ágs	Pág	s.
Porophyllum pringlei 1	180	Prune.e	7S
1	180	Prunus capuli 7	78
- tagetoides 1			78
	180	Psacalium peltatum 18	39
¿Portulaca foliosa	18	Psilactie coulteri 14	10
- parvula	18	Psilocarya schiedeana 37	73
— pilosa	18	Psoralea citriodora 5	51
PORTULACEÆ	18	- lutea 5	52
Ротамел 3	365	— nntans 5	53
Potamogeton zizii 3	365	 pentaphylla 5 	()
Potentilla caudicans	80	Ptelea angustifolia 3	37
 fosca	81	Pteroetemon mexicanus 7	19
— hematochroa	81	Ptilostephium coronopifolium 17	5
- humboldtiana	80	— trifidum 17	
— lineariloba	80		Ю
- macrorhiza	81	Pyrethrum bonplandiamm 13	
 ranunculoidee 	81	Pyrola liebmannii 20	
POTENTILLE.E	80	- macnlata 20	
Poterier	81	 secunda	
Ротновреж 3	364	Pyroleæ 20	-
Pouzolzia palmeri 3	328	Pyrrhopappus multicaulis. 19	
PRIMULACEÆ 2	209	Quamoclit grandiflora 24	
Primule.e 2		 hastigera 24 	
Prionoeciadium madrenee. 1	.07	- hederifolia 24	
- megacar-	- 1	- mina 24	
pum 1	.07	- pedata	
— mexica-		- russelliæflora 24	
num 1		Quauhchichic	
— pringlei 1		Quauhtlahuac 29	-
- watsoui 1		Quelite 297 y 298	
Priva armata 2		Quercine.e	
•	79	Quercus acuminata 33	
- mexicana 2		— alamo 33	
- tuberoea 2		- calophylla 33	
Proboscidia fragrans 2		- castanea	
— violacea 2		COMMISSION CONTRACTOR	
Prochnianthee virideecene 3		- crassifolia 33	
0	34	- craeeipee 33	
	72	— decipiens	
	72	- glabreecens 33	
	72	grahami 33.	
	72	— intermedia 33	
Pronstia reticulata 19	97	 magnoliæfolia 33. 	1

		Pags.	F	ags.
Querens m	exicana	. 331	Rauwolfia hsterophylla	213
- m	icrophylla	. 331	Reana giovanninii	
- "	ncronata	. 331	- Inxurians	
– ni	tens	. 332	RESEDACEÆ	10
 ре 	tiolaris	. 332	Rsseda lutsola	10
— ро	lymorpha	. 332	Retama de tierra caliente	71
— pı	ılchslla	. 332	Retamilla	5
- rs	ticulata	332	Rsvsrchonia arsnaria	318
- rn	gosa	331	RHAMNACEÆ	41
– si	dsroxyla	332	RHAMNEÆ	41
— sp	icata	332	Rhamms elegans	42
- sp	innlosa	331	— glomeratns	42
- tri	stis	331	humboldtianus	41
- tui	perculata	332	— palmsri	41
– ur	dulata	332	- ssrratus	41
_ va	rians	332	- serrulatus	41
QUILLAJEÆ.		79	Rhipsalis cassytha	100
Rabanillo		193	Rhodocalyx hypoleuca	215
RAFFLESIEÆ		306	- snaveolens	215
naiz de con	trayerba	50	Rhodochlamys speciosa	290
del ma	nso	307	RHODOREÆ	206
Ramie		327	Rhodosciadium glaucum	105
Ramio		327	 dissectum. 	105
Mandia pr	inglsi	115	pringlsi	108
- W	ausoni	115	 tuberosum 	108
RANGICUI	LACEÆ	1	Rhus filicina	46
reanuncuio (R. dichotomus).	2	- microphylla	46
Panumoul	R. pstiolaris)	3	- mollis	46
rean uneun	us circinatus	2	pachyrrachis	46
_	dslphinifolius.	2	potsntillæfolia	46
	dichotomus	2	ssmpervirsns	46
_	donianus	2	terebinthifolia	46
_	geoides	3	 toxicodsndron 	46
_	humillis	2	- virsns	46
	hooksri	3	Rhynchosia caribæa	66
_	pstiolaris	3	 grandiflora 	67
	stolonifer	3	 longeracsmosa 	66
-	tridsntatus	3	- macrocarpa	66
	vagans	3	- mexicana	66
RAPHANEÆ		9	- minima	66
Raphanus	raphanistrum	9	phaseoloidss	66
	axiflorum	202	- pringlsi	66
_ s	plendens et fulgens	202	- pimctata	66

Pags.	Págs.
Rhynchosia texana 66	Roulinia acrotricha 353
Rhynchospora eximia 373	- gracilis 353
_ kunthii 373	Rourea oblongifolia 47
- lencocephala., 370	Rubeæ 79
- mexicana 373	Ribia acuminata 119
— nervosa 371	RUBLACEÆ
- pura 371	Rubus adenotrichus 79
- schiedeana, 373	 flagellaris
— stellata 370	occidentalis 79
— vahliana 371	- trilobus 79
Rhynchosporeæ,	- trivialie 79
Ribes ciliatum	Ruda 36
— jorullensis 83	Rudbeckia alata
— odoratum 83	- columnaris 158
Ridesie.e	- tagetes 158
Ricinella barbinervis 323	Ruellia bourgei 273
Riddellia tagetina 177	- clandestina 273
Riedleia heterotricha 27	dnlcis 274
— serrata 27	- geminiflora 273
Rigidella flammea 344	— ovata 272
— inmaculata 344	- paniculata 273
Rivina brasiliensis 302	- pulcherrima 273
— glabrata 303	- tuberosa 273
- humilis 302	- tweediana 273
- lævis 302	Ruellieæ
- lanccolata 303	Rumex obtusifolius 305
- mexicana 303	- patientia 305
- orientalis 302	Rumfordia floribunda 153
— purpurascens 302	Rumiceæ
RIVINE.E 302	Russelia multiflora 259
Rodilla de Cristo 344	— paniculata 259
Roldana lobata 192	polycdra259
Romerillo 161, 184, 217 y 262	- sarmentosa 258
Rondeletieæ	- syringæfolia 259
Rondeletia gracilis 114	ternifolia
- ligustroidee 114	RUTACEÆ36
ROSACEÆ 78	Ruta graveolens 36
Rosa de Castilla cimarrona 278	Ruteж 36
Rosa montezumæ 82	Sabazia glabra 155
Roseæ	- humilis 155
Rosilla	- michoacana 156
Rotala dentifera 87	- microglossa 156
Rottboellia compresa 377	— subnuda 156

Pags.	Pags.
Sabbatia gracilis 227	Salvia coccinea
Sabina 418	- cyanea
Sabina flaccida 419	- cyanifera 286
- mexicana 419	- deltoidea290
- tetragona 419	- elegans 287
Sacachichic 143 v 174	- elongata287
Sacamecate	- elscholtzioides 288
Saccharum gigantenn 377	* fimbriata 290
Sageretia elegans 42	- fulgens 287
_ wrightii 42	- galcottii 286
SALICINEÆ333	glancesceus 286
Salix bonplandiana 333	- glechomæfolia 287
333	- grahami 287
333	- helianthomifolia 287
- longifolia 333	- hispanica 288
— microphylla	- humboldtiana 288
***61a	 hyptoides
- taxifolia	- incarnata 287
Salmea enpatoria 167	— laucæfolia 288
8 and Ceps 167	- lanceolata 288
- palmeri	lasiantha 288
Salpiglossideæ	— lavandulæfolia 288
	- lavanduloides 288
Salvia	laxa 286
Salvia alamosana 225	- leucantha 288
- amara 285	- liucarifolia 289
amarissima 285	- littæ
- angustifolia 285	1011g15p10tt1tt
- aspidophylla 288	- melissæfolia 289
assurgens 285	montcana
- ballotæflora 286	2010 Opily 114 269
- betonica 287	- mocinoi
- brevicalyx 286	- polystachya 289
- cæsia	- pringlei 290
- cardinalis 287	- prismatica 288
- chamædryfolia 286	- proxima
chamædryoides 286	- pruiuosa 289
- chamædrys 286	- pseudococcinea 286
— ciliata 286	- pubescens 289
- cinnabarina 286	- punicea
- circinata 285	- purpurea 289
- clinopodioides 286	- reflexa 288
	200

	Pags.	Pags.
Salvia regla	. 290	Satureine.e
- reptans		Sauce 333
rosea		Saucillo 333
semiatrata	. 290	Sauco
- sessei	. 290	Saurure.e
sessilifolia	. 290	SAXIFRAGACEÆ 82
— simplex,	. 287	Saxifrageæ 82
stolonifera	. 290	Sebastiania pringlei 324
— subincisa		Schaffuera gracilis 382
— tetragona		Schedonnardos texanus 403
— thymoides		Schellingia tenera 382
— tiliæfolia		Scheuodorus lividus
- trichostemoides		Schilleria awita 307 Schings molle 46
tricuspidata		Deninus monetiment
— virgata		Schistocarpa bicolor 187
- vitifolia		Contaro print agrici.
Sambuce.e		Schizachyrium brevifolium 378 — condensatum 378
Sambucus mexicana		
SAMIDACE.E		- hirtiflorum 379
Samodia ebracteata		— myosurus 379 Sehizocarnum filiformo 97
Samolus ebracteatus		Schizocarpum filiformo 97 parviflorum 97
Sangre de Drago		Schkuhria abrotanoides 177
Sangregao		- glomerata 178
Santa Marta		- hopkirkia 178
Sanvitalia angustifolia		- platyphylla 178
- ocymoides		- pringlei 178
- procumbeus		- virgata 178
- villosa		- wrightii 178
SAPINDACEÆ		Schenocaulon drummondii 358
SAPINDEÆ		- interme-
Sapindus galeottii		dium 358
- marginatus		texanum 358
Sapium celayense		- tenuifolium. 358
Saracha umbellata?		Schwnoprasum longifolium 356
Sarcostemma bicolor		Schæpfia arborescens 40
- bilobum	. 215	_ schreberi 40
crassifolium	. 215	Schrankia aculeata 73
- cynanchoides	. 215	- distachya 74
- elegans	. 216	Schultesia mexicana 227
- linearis		Sciadoseris vaginata 188
Sartwellia mexicana		Scirpeæ
Sarzaparrilla	. 352	Scirpus autumnalis 371

Pags.	Pags.
Scirpus capillaris 371	Senecio barba-johanis 190
 cyperoides 372 	- berlandieri 190
- heterocarpus 372	- calcareus 190
— micranthus 372	- calophyllus 189
- potosinus 372	— canicida 190
- pringlei 372	- cardiophyllus 188
- subsquarrosus 372	- cervariafolius 188
- tennifolius 371	- chapalensis 190
Sclarea mexicama	 cinerarioides 190
Scleria reticularis 373	- deformis 190
Salara again 373	- douglassii 190
Scleropages busicalis 157	 erbenbergii
Scleropogon brevifolius 407	- ghiesbreghtii 191
- karvinskianus 407 Selerothrix fasciculata 94	- gracilipes 191
Scoparia annua	— grahami 190
Scoparia annua 261	- grayanus 188
- duleis	- grandifolius 191
SCROFHULARINEÆ255	— guadalajarensis 191
Scutellaria cærulea 255	- hederæfolins 188
- dummer 292	- helodes 189
drummondii 292	— jaliscana 191
hispidula 292	- jatrophoides 188
purpurascens 292 rumicifolia 292	- lineolatus? 191
	- lincolatus 192
Sebastiania pringlei 324	— lineolatus? 191
	- lobatus 191
	longilobus 191
	- monterreyana 191
Degun houses!	 multidentatus 191
	- napeæfolius 188
	— pauciflorus 193
files	— peltiferus 189
	- petasitis 191
	- platanifolius 191
	- præcox 192
- modumen	- procumbeus 192
772 0 740 74 744 7	- radulæfolia 189
	- roldana 128
— pringlet 85 Sempiterna 147 y 299	- saliguus 182
0 11	- sanguisorbæ 192
	- sinuatus 192
	— sinuatus? 191
- angustifolius 190	 steechadiformis 192

Págs	Págs.
Senecio tolucanus 193	Sida rotundifolia 22
- veruns 192	— spiræfolia 22
- vulneraria 193	— stipulata 22
Senecionide.e	- triangularis 21
Sericographis incana 275	Sideroxylou cuneatum 211
Sorjania racemosa 44	Siegesbeckia cordifolia 153
- schiedeana 44	- droseroides 154
Sesbania cavanillesii 57	— jorulleusis 154
 picta 57 	- orientalis 153
Seselineæ 106	- repens 154
Sesleria dactyloides 406	Siete colores
Setaria imberbis 387	Silans? pencedanoides 105
 purpurascens 388 	Sileneæ
— uniseta 388	Silene allamani
- verticillata 388	- antirrhina 15
Seymeria virgata 262	← greggi 15
Sibthorpia parvifolia 261	- laciniata 15
— pichinchensie 261	— mexicana
— rctusa 261	— moçiniana 15
Siche	— thurberi 16
Sicydium tamnifolium 99	Siler trilobum 107
Sicyolde.e 98	SIMARRUBACEÆ 38
Sicyos angulatus 98	Simonillo 143
Sida acuta 22	Simsia amplexicaulis 163
— alamosana 22	— auriculata 163
— altheifolia 22	— cordata
— brachypetala 22	— lagascaformis 163
- carpinifolia 22	- sauguinea 163
— caudatifolia 22	- subaristata 164
- ciliaris 22	Sinclairia discolor
— cordifolia 22	Sinvergüenza
— crcuatiflora 21	Siparuna riparia 309
— cristata 21	Sisyrinchieæ
- diffusa 22	Sisyrinchium alatum 345
— herbacea 22	- arizonicum. 345
— hondensis	- hartwegii 345
- lepidota 22	- laterale 345
11111101120	— moritsianum 345
— micaus	- platyphy-
	llum 345
— occidentalis 22	— polycladon 345
- plauicaulis 22	pringlei 346
- rhombifolia 23	schaffneri 346
	Bor.—120.

Pág	s. Pags.
Sium angustifolium 106	Solidago bigelovii 139
Smilaceæ	- californica 139
Smilacina bertolonii 352	- limonifolia 139
 flexuosa	
Smilax bona-nox 352	- velutina 139
 flexnosa	Solimán
 invenusta 352 	Sonaja
platycentron 352	Sonchus oleraceus 200
— tannoides, 352	Sonova 276
Smyrnium ægopodioides 105	Sophora secundiflora 67
- 2 lineare 105	- sericea 68
Sogalgina balbisioides 174	- speciosa 67
— trilobata 175	Sophoreæ 67
SOLANACEÆ 246	Sorghum nutans 379
Solaneæ 246	- secundum 380
Solano negro 247	Sosa 248
Solanum appendiculatum . 246	Spartina gonini
- cervantesii 246	Spergularia mexicana 17
coronopus 249	SPERMACOCEAE
 crenato-dentatmm 247 	Spermacoce asperifolia 117
 dulcamara 246 	- diodina 117
 elæagnifolium 247 	- hænkeana 117
- ferrnginemn 248	lævis 117
- heterandrnm 248	- parviflora 118
- beterodoxum 247	- patula 118
- hindsianum 247	 podocephala., 118
- jamesii 247	- pringlei 118
- lamberti 247	- psyllioides 118
- leprosmm 247	- tenella 118
- macrantherum 247	- tenuior 118
— nigrum 247	verticillata 118
— nodiflornm 247	Sphacele mexicana 285
— oleracemm 247	Sphæralcea angustifolia 23
- pringlei 247	- vitifolia 23
- pterocanion 247	Sphæroma augustifolium 23
— фивідегит 246	Spigelia bumboldtiana 223
— ræmeriannm 247	- scabrella 223
- refractum 248	— speciosa 223
- rostratum 247	Spilantbes alba 166
— tequilense 247	- beccabunga 166
— texense 247	- bicolor 167
- torvum 248	botterii 167
- tuberosum 248	- crocata

		Pags.		Pāgs.
Spilanthes	karwinskiana	167	Stella	ria prostrata 16
	rutea	78		aadenia mollis 214
	folia	78		palmeri 214
	olor	78	Stemo	dia bartsioides 259
	osa	78	_	durantifolia 260
		78	_	verticillaris 260
	ieaua	78	Stenai	ndrium dulce 274
Spir.ee.e		78		nthium frigidum 357
	s aurantiaca	339	Stenolol	bium galactoides 64
_	cinnabarina	339		molle 270
_	criophora	339	_	stans 270
	graminea	339	Stenorr	hyuchus aurantiacus 339
-	jaliscana	339	-	cinnabarinus 339
_	pauciflora		_	- pauciflorus 339
_	polyantha			ULIACEÆ 27
	pringlei	339	Stevia	berlandieri 125
Spirodela po	lyrhiza	364		elinopodia 125
	wukeana		_	elatior 125
Spodiopogon	foliatus	377	_	enpatoria 125
_	vaginatus	377	_	hyssopifolia 125 y 126
			_	laxa 126
Sporobolu	e atrovirens			laxiflora 126
-	capillaris		_	linoides 126
_	cryptandrus			lucida 126
-	depauperatus		-	macella 126
	macrospermus		_	micrantba 126
_	minutiflorus		-	monardæfolia 126
_	racemosus		-	multifida
-	repens		_	origanoides 126
_	shopherdi		_	paniculata 126
	tricholepis		-	pedata 178
	· • · • · · · · · · · · · · · · · · · ·			phlebophylla 126
	gelowii		-	plummeræ 126
	rdinalis		-	punctata 125
	occinea			purpurea 126
	ummondii		_	rhombifolia 127
	celsa		_	salicifolia 127
	erlii		_	seemannii 127
	losissima		_	serrata 127
	epens		_	stenophylla 127
Stachytarpheta acuminata			_	subpubescene 127
Steffensia adunca 30		307	_	trifida 127
Stellaria lar	niginosa	16	_	venosa 128

Page		Ke
Stevia viminea 128	Tageles congesta 1	83
- viscida 128	- corymbosa 1	
Stigmaphyllon lupulus 33		82
Stillingia torreyana 324		82
 celayensis 394 		s3
Stipa avenacea 390		82
 eriostach ya 391 		83
- fimbriata 302		83
- gynerioides391	1	82
- ichu391		83
— jarava 391		80
- mucronata391		83
- pringlei 391		83
— pungens 391	- pussilla 18	83
tenuissima 391		83
Strelitzia reginæ 341		83
Streptachue scabra		83
Streptanthus longifolins 7	Talclote 20	
Stylosanthes dissitifiora 59	Taraxacum dens-leonis 19	
mucronata 59	- mexicannu 19	
STYRACEÆ211	- officinale	
Styrax Jaliscana 211	Tatalencho 13	
30/EDEÆ	TAXODINEA41	IS
Swertia parviflora 229	Taxodinm distichum 41	
- plantaginea. 990	- mexicanum 41	
Swertie 228	— montezumæ 41	
Symphoricarpos glancesceus 111	- mucronatum 41	IS
microphy-	Tecoma mollis 27	70
llus 111	- sorbifolia 27	70
montanns 111	- stans 27	0
Symplocus pringlei 211	- stans 27	
Synceposianthus decinione tot	Тесомеж 27	0
Syneurella Vialis 167	Té de Michoacán	34
Syntblipsis greggii8	de milpa, amarillo 17	72
Syphocampylus bicolor 202	— de milpa, blanco 17	
SYSYMBRIER 0	Tejocote morado 8	32
Sysymbrium canescens 8	Telanthera obovata 29	8
- palmeri 8	Telmatophace gibba 36	4
Tabachin	Telondilla 31	9
Tabaquillo 253	Tenmadenia secundiflora 21	4
Tabebuia leucoxyla 270	Tenquanete 31	3
Tacopaste 306	Teoxintli	
Tæniostema micranthum 11	Tephrosia affinis 5	6

Pags	Págs.
Tephrosia lindheimeri 56	Tigridia vanhouttei 344
- macrantha 56	TILIACE.E 28
- toxicaria 56	Tilia americana 30
Tepopote	- mexicana 30
Tepopotl	Тилеле 29
Tepozán 224, 225 y 281	Tillæa angustifolia 83
Tepozancillo	Tillandsia azurea 343
Tepozán cimarrón ó de cerro 224	- fasciculata 342
Терига	- flavescens 343
Teramnus uncinatue 63	 polystachya 342
TERNSTRŒMIACEÆ 19	— pringlei 342
Ternstramia lineata 19	- recurvata 343
tepezapote 19	— uniflora 343
Ternstræmeæ	- variabilis 343
Tetlate 46	— vestita 343
Tetlatia 46	Tillandsieæ
Tetrachyron manicatum 173	Timbre 71
Tetraclea coulteri 294	Tinguara
Tetragonotheca texana 158	Tithonia angustifolia 160
Tetramerium aurenm 276	- brachypappa 160
- costatum 276	- excelsa 161
Tetrapteris mexicana 33	- macrophylla 160
echiedeana 33	- scaberrima 158
Teucrium cubense 294	tubæformis 160
THALAMIFLORÆ 1	Tithymalopsis sphærorrhiza 317
Thalictrum mexicanum 2	Tithymalus calyculatus 313
- tomentellum 2	Tlachichinoa 236
Thamnosma texana 36	Tlacoxiloxóchitl 76
Thelypodium longifolium 7	Tlahuitol 75
Thenardia galeottiana 214	Tlalayotl 217
Тиеорнкаятеж	Tlalcapollin 41
Thevetia neriifolia 213	Tlanchalagua 227
- yoyotli 213	Tlanepaquilitl
Thlaspideæ 9	Tlantlacuaye 301
Thouse 44	Tlaxisqui 82
Thouinia pringlei 44	Tlemolitos 183
Thumbergia alata 271	Tlepatli 208 y 236
Thumbergie.e 271	Toddalies 37
Thymophyllum greggii 182	Toloache
Thysanachne scoparia 383	Toloatzin
Tigridia grandiflora 343	Tomate 247
- pavonia 343	Tomate de culebra 251
- pulchella 343	Toritos 271

Pág	s. Págs,
Tornaloco 255	Trichocoronis greggii 124
Torongil99	Trichodinm lariflorum 200
Torongil del país 299	moutanna 200
Tostón en Cuba 178	Tricholæna insularis 386
Tournefortia hirsutissima. 236	
- laurifolia 236	
- mexicana 236	— pnlchella 408
- trichocaly-	Tridax balbisioides 174
cina 236	- bicolor 174
_ velutina 236	- corononifolia 175
Tovaria flexnosa	- lentophyllo 175
Trachelospermum stans 214	- palmeri 175
Trachypogou scrobiculatus 279	- procumbons 175
Tradescantia angustifolia. 360	- trifida 175
 crassifolia 360 	- trilobata
- herba-ratti 360	Trifolieæ
– karwinskya-	Trifolium amabile 49
na 360	- fimbriatum 49
- lanuginosa 360	- involueratum 49
- linearis 360	
Tradescantieæ 360	Trigonospermum melampo-
Tragoceros mocinianus 151	dioides . 148
 schiedeanus 151 	Trimetra ficoidea
zinnioides 151	Triodia acuminata 408
Tragns occidentalis 382	- avenacoa 407
- racemosa 382	- mutica
Trébol	- pulchella 408
Trevirana grandistora 268	- purpurea 408
- pulchella 268	- texana 408
Triæna racemosa 405	Tripa de pollo
Triathera americana	Triplasis purpurea 408
Tribulus grandiflorus 34	Tripolium caricifolium 141
Trichetostylis mucrounlata 371	Tripsacum compressum 376
Trichilia havanensis 40	- dactyloides 376
- spondioides 40	- lanceolatum 376
TRICHILIEÆ40	- monostachynm 376
Trichochloa ciliata	Trisetum deyeuxioides 400
 debilis 393 	- elongatum 401
— microsperma 393	- gracile 401
- mucronata 395	- molle
- setosa 393	- paniculatum 401
 stipoides	- tolucense 401
— teuella 396	- virletii

Pags	Fitgs.
Tristachia leiostachya 401	Urostigma bonplandiana 325
— mexicana 401	— petiolare 326
Tristegine.e	- tecoIntensis 326
Tristicum scaberrimum, 415	Urtica aquatica326
Triumfetta brevipes 28	— сагасавана 327
— habanensis 29	 dioica
— insignis 29	— mexicana 327
 palmeri 29 	— nivea 327
- semitriloba 29	— spiralis 327
Trixis angustifolia 198	URTICACEÆ324
- frutescens 198	URTICEÆ
- hyposericea 198	Urvillea dissecta 44
- involucrata 198	- ulmacea 44
- latifolia 197	Usteria antirrhiniflora 256
Trompetilla 113	— scandens 256
Tromsdorffia canescens 299	Utricularia denticulata 267
Tronadora 48	Uvilla cimarrona
Tropwolun aduncum 35	VACCINIACEÆ 204
— majus 35	Vacciuium geminiflorum 204
— peregrinum 35	Valeriana affinis 119
Tulipán	 albonervata 120
Tulipeæ	densiflora 120
Tullidora 41	— edulis 120
Tulocarpus mexicanus 149	- galeottiana 119
Tumba vaqueros 243	 palmeri 120
Turnera aphrodisiaca 95	 pilosiuscula 120
— palmeri 95	— scandens 120
— ulmifolia 95	scorpioides 120
TURNERACEÆ 95	— sorbifolia 120
Turpinia? tomentosa 122	— subiucisa 120
Tympananthe subcrosa 220	— tolucana 120
UMBELLIFERÆ 101	VALERIANEÆ 119
Uncinia jamaicensis 374	Vallesia chiococcoides 213
— mexicana 374	— dichotoma 213
— phleoides 374	- glabra 213
Uña de gato 271	— mexicana 213
Uralepis avenacea 407	symbæfolia 213
- mutica 408	Vandeæ
- pulchella 408	Vara de S. Miguel 122
Ureneæ	Varronia calyptrata 234
Urera caracasana 327	Vauquelinia corymbosa 79
Urochloa uniseta	Venenillo
Urostephauus gonoloboides 222	Veratre. £ 357

	Págs.	P	ágs.
Veratrum frigidum	. 357	Verbesina salicifolia	165
- virescens			165
Verbena	. 280		165
- affinis			166
bipinnatifida	. 279	1	166
— biscrrata	279		166
- canescens			166
caroliniana	. 279		166
– ciliata	. 280		166
gracilis			209
- hirsuta			121
— ligustrina	278	- ascheuboruiana.	121
- littoralis	. 280	- deppeana	121
menthæfolia			121
— mexicana	279		121
— officinalis	280	 karvinskiana 	121
– pancifolia	279	leiboldiana	121
polystachya	279		121
- recta			122
- remota	279	- schiedoana	122
- remota	280		122
- setosa	280		122
squamosa	272		121
- veronicæfolia	279		261
VERBENACEÆ	276		261
Verbeneæ	276	Vesalea floribunda	112
Verbesina alata	164	Vesicaria schaffneri	7
 atriplicifolia 	157		111
- anrea	159	Vicia americana	62
– capitaneja	164	- mexicana	62
ceanothifolia	159	— pulchella	62
 chihuahuensis 	164	VICIEÆ	62
— coahuilensis		Vigna strobilophora	66
- crocata	164		160
encelioides	164		161
— fraseri	165		160
nicaraguensis	165	- cordifolia	161
oncophora	165	- decurrens	161
persicifolia	165		161
— pinnatifida	165		161
platyptera	165	 grammatoglossa. 	161
potosina	165	-	161
— pringlei	165	- laxa	161

Págs.	Págs.
Viguiera linearis 161	Wenderothia discolor 64
- pringlei 161	Wigandia caracasana 232
- quinqueradiata 161	— kunthii 233
- tenuis	- scorpioides 233
	- urens 233
Vilfa atrovireus 396	Wimmeria concolor 41
- cryptandra	Wirtgenia mexicana
dulcis	Wislizenia refracta 10
- minutiflora 397	Wissadnla mucronnlata 23
_ repens 397	— pringlei 23
utilis 397	- scabra 23
Villarsia lumboldtiana 229	 tricarpellata 23
Vinca minor 213	Withania? coronopus 250
_ rosea 213	 melanocystis 251
Vincetoxicum mexicanum 219	Wyethia mexicana 160
Viola barroetana 12	Xalocotl
flagelliformis 12	Xaltomatl
_ grahami 12	Xanthocephalum alamani 137
- hookeriana 12	_ bonplan-
- reptans 12	dianum 137
VIOLARIEÆ 12	- centan-
VIOLEÆ 12	·roides, 137
Violeta del pais	— dentatnm 137
Virgilia secundiflora 68	- humile 137
VISCEÆ 311	- tomente-
Visco cuercino 311	llnm 138
Viscum bolleanum	Xanthocoma humilis 137
- falcatum	XILOPIEÆ 4
- kunthiamm 311	Xilosma pringlei 13
— rubrum 311	- velutinum 13
- schiedcanum 311	Ximenia parviflora 40
- tomentosum 311	Ximenesia cor data
Vitex lasiophylla 281	- encelioides 165
— mollis	Xiquite
- piramidata 281	Xochilcorona
Viticie.e	Xocoyolli
Vitis caribæa	Xolotzin
— quinquefolia	Xonequitl
- tiliæfolia 43	Xoxoco
Waltheria americana 28	Xoxonitzal124
- indica 28	Xumetl
- maica	Yedra 243 y 244
- cordata	Yedrita del llano
corania150	1 carna dei nano
	Вот.—122.

Pág	Pág-
Yerba amargosa 151	Yucca acroticha 35.
— amarilla 158	3 — aloifolia 35
— azul 275	- arcuata 25
— cabezona 185	- baccata35
— dulce 277	- conspicua
— mora 247	rm cranulata
- santa 308	- draconis 353
- del ángel 130 y 131	— filifera 355
der cancer 264	- schottii
— del coyote	- serrulata 353
— del cura	1
- del espanto 284	Zacate de agua 57
- del golpe 91 - del indio 306	- de manati 387
	— de la muela 340
- del nome	Zacatlaxcalli
- del pollo 360 y 361	Zaluzania angusta 155
- del S. Corazón de Jesús 272	anthemifolia 154
- del sapo	asperrima 153
del tabardillo 194	Courter1 155
del venado 95 y 190	globosa 153
uel zorrillo 107	megacephala, 155
de la barranca 107	monissing 155
— de la cucaracha 211	- myriophylla 155
de la golondrina 315 v 316	1 CSIHOBA 153
de la mula	— squarrosa 156 Zanthoxyleæ 37
de la paloma	7
de la Puebla	Zanthoxylum limoncillo 37
- de la pulga 128	- pringlei 37
ue la punzada 233 v 234	- pterota 37
- de la rabia	Zapania mexicana279
- de la vibora	ZAPOTACEÆ211
de las almorranas 20	Zapote
ac las ammas 185	- blanco 37
ac las escobas	Zapotillo 101
— de Sta María 132 y 186	Zephyranthes akermaunia 347
Yerbabuena aromática 278	- aurea 347
Cimarrona 277	- concolor 316
Yesgos	— grahamiana 347
Yolochichic	- grandiflora 347
Yololique	— lilacina 347
Vovotli	— lindleyana 347
Yoyotli 213	 longifolia 347

Págs	Págs.
-	Zinnia maritima 152
Zephyranthes nervosa 347	Zilillice interiorite
_ pallida 347	— palmeri 152
_ sessilis 347	- pauciflora 152
striata 347	- verticillata 152
verecunda 347	Zizүрнеж 41
Zeugites americana 412	Zizyphus obtusifolius 41
- latifolia	Zornia diphylla 60
- mexicana 412	_ lævis 60
	— pubescens 60
Zexmenia aurea 159	= reticulata 60
- brevifolia 159	- /6//6//////////////////////////
— ceanothifolia 159	= insmigoria
— fasciculata 159	ZO13/EZE
- greggii 160	Znapatli
- lantanifolia 160	Zumaque 46
ZINGIBERACE.E341	Zygadenus mexicanus 357
Zinnia acerosa 151	- volcanicus 358
- angustifolia 152	_ volcanicus 357
	ZYGOPHYLLEÆ 34
	Zygophyllum trideutatum 34
- elegans 152	Lygophyttim
- linearis 152	









